

**ANAIS DO II CONGRESSO
DE SAÚDE E BEM-ESTAR**

Chanceler
Ana Elizabeth Fecury Braga

Reitor
Marcos Barros

Vice-Reitora de Relações Institucionais
Luciana Fecury Tavares

Vice-Reitor Administrativo e Financeiro
Sérgio de Carvalho Tavares

Pró-Reitor de Graduação das Áreas das Ciências Humanas, Biológicas, Sociais, Exatas e das Engenharias
Saulo Henrique Martins

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Valério Monteiro Neto

Pró-Reitor Financeiro
Sérgio de Carvalho Tavares

Pró-Reitor Administrativo
Fábio Antônio Brito Matos Martins

Presidente da Comissão Própria de Avaliação
Fabiana Mendes Lobato

Ouvidoria
Nadja Fonseca da Silva Cutrim

Chefe da Assessoria Jurídica
Gustavo Coutinho Nogueira Mendes

Chefe da Assessoria de Qualidade, Controle, Avaliação e Estatística
Nadja Fonseca Da Silva Cutrim

Gestor do NTI
Rodrigo Aparecido Justino

Coordenador Geral Unidade COHAMA
Sylvio Rogério Araújo Santos

Coordenadora Geral Unidade Anil
Claudina Maria Reis Ferreira

Coordenador Geral do Campus Imperatriz
Ricardo Teodoro Martins

Coordenador Geral do Campus Bacabal
Maxima Regina Santos De Carvalho

Coordenador de Extensão
Tonigil Guimarães Cunha

Coordenadora do Programa de Educação a Distância – EAD
Cristiane Florinda Monteiro de Oliveira

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
Vinícius José da Silva Nina

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Docente e Discente
Mekaele Frota do Vale

U58c Universidade Ceuma.

Anais do II Congresso de Saúde e Bem Estar. / Ana Eugenia Araujo Furtado
(Editor) São Luís: UNICEUMA, 2014.

236 p.

ISSN 2319-0914

Anais (II Congresso de Saúde e Bem Estar). UNIVERSIDADE CEUMA, 2014

1.Saúde 2. Bem Estar. 3. Qualidade de Vida I. Furtado, Ana Eugenia Araujo
(Editor). II. Título.

CDU: 61(063)

Presidente da Comissão Científica
Ana Eugenia Ribeiro de Araujo Furtado Almeida

Revisor
Marco Aurélio Benini Paschoal

Comissão Científica Docente
Marco Aurélio Benini Paschoal
Andrezza Maciel
Adriana Mara Araújo Leal
Patrícia Rodrigues Ferreira
Joelma Ximenes Prado Teixeira Nascimento.
Marcus Vinicius Viegas Lima
Michelle Villas Boas Mualem
Rosangela Maria Lopes de Sousa
Adriana Malheiros
Marla Raquel Pontes da Rocha
Luiz Alexandre de M. Nunes
Fabiano de Jesus Furtado Almeida
Candida Helena Lopes Alves

Comissão Científica Discente
Jairton Costa Filho
Thaiane Caroline Sousa Nascimento
Bruno Rodrigo Amorim Castro
Hildenesa Gassmann
Anna Paula da Silva Lima
Valderlane Lopes Pinheiro Colares
Marcelle Luanna Oliveira Brito
Maria Giulliane Silva Rodrigues
Fabiola Ayane
Paloma Brasil

Avaliador de trabalhos científicos
Edna Lucia Coutinho da Silva
Adriana Mara Araújo Leal
Rosangela Maria Lopes de Sousa
Patrícia Rodrigues Ferreira.
Joelma Ximenes Prado Teixeira Nascimento.
Marcus Vinicius Viegas Lima
Michelle Villas Boas Mualem.
Vinicius Teles Saga.
Aline sharlon maciel batista ramos.
Joana Katya veras rodrigues Sampaio Nunes.
Gilvan Alves Aragão Junior
Francisca Maria Ferreira Noronha
Rachel Costa Façanha.
Silvan Correa
Mariana Carvalho Batista da Silva
Sandro Kussano Carvalho
Cyrene Piazero
José Carlos Elias Mouchrek Júnior
Evandro Figueiredo Portela
Marco Aurélio Benini Paschoal
Isabella Azevedo Gomes
Karoline Brusaca Guará
Leila Cristina Almeida de Sousa
Marcia Cristina Aguiar Mendes Machado.
Marla Raquel Pontes da Rocha
Adriana Malheiros
Fabiano de Jesus Furtado Almeida
Luiz Alexandre de M Nunes
Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana
Erica Martins
Clarissa Lopes Vieira
Amilcar Viana de Oliveira
Taciria Machado Bezerra

Presidente do II Congresso de Saúde e Bem-Estar
Ana Paula Fernandes Lamha

Vice Presidente do II Congresso de Saude e Bem-Estar
Melina Serra

ORGANIZAÇÃO GERAL DO II CONGRESSO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO MARANHÃO

PRÓ - REITORIA DE GRADUAÇÃO

Prof. Ms. Saulo Henrique Martins, Pró Reitor de Graduação

Editora chefe

Ana Eugenia Araujo Furtado

II CONGRESSO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO MARANHÃO - ANAIS

É uma publicação da Universidade CEUMA.

Rus Josué Montello, no 1, Renascença II CEP 65075120- São Luis/MA

Internet: www.ceuma.br/portal

Sumário

GRADUAÇÃO	23
TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA	25
REMODELAÇÃO DE INTERFACE OSSO-IMPLANTE.....	25
INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	25
O USO DE ANESTÉSICOS E VASOS CONSTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS	26
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR	26
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU): O EXAME DE URINA	26
A UROANÁLISE COMO EXAME COMPLEMENTAR NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA	27
EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC	27
ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL	27
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ESCOLARES	28
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO	28
SÍNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)	28
DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE FÍSICA	29
CANDIDOSE.....	29
ANQUILOGLOSSIA.....	29
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS.....	30
REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA.....	30
ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS	30
A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO NA IMPLANTODONTIA	31
A FITOTERAPIA DA GARCÍNIA CAMBOGIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE	31
TÉCNICA DO RECONTORNO GENGIVAL E FRENOTOMIA: RELATO DE CASO	31
PERFIL GESTACIONAL DE ADOLESCENTES ATENDIDAS EM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE DE FERRER- MARANHÃO	32
NORMAS INTERNACIONAIS DE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA.....	32
PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)	33
CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.	33
EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.	33
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.	34
EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.	34
CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	35
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.	35
ESTUDO “in vitro” DA RESISTÊNCIA ADESIVA DO ESMALTE DECÍDUO, UTILIZANDO SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES E SUBMETIDOS À APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR.	36
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS.....	36
EXAME DE URINA COMO FERRAMENTA LABORATORIAL PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA.....	36
ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES DO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E RESINA COMPOSTA E CASO CLÍNICO	37

TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS.....	37
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM NEFROLOGIA: PROMOVENDO BEM-ESTAR A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.	38
EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS	38
O PSICÓLOGO ESCOLAR E UMA PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL. PROMOVENDO A CONGRUÊNCIA, LOGO, A SAÚDE PSICOLÓGICA	38
FACETAS DIRETAS	39
INCIDÊNCIA DE CÂNCER EM SÃO LUÍS – MA: ESTIMATIVA PARA 2014	39
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DO ÍNDIO	39
LAMINADOS CERÂMICOS COMO UMA OPÇÃO CONSERVADORA.....	40
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE ARDÊNCIA BUCAL	40
ENDOCARDITE INFECCIOSA: DESMISTIFICANDO TABUS	41
ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSAO DE ALUNOS SURDOS BILINGUES DO ENSINO MEDIO	41
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NOS RESULTADOS DOS EXAMES DO COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA EM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DJALMA MARQUES.....	41
REMODELAÇÃO NA INTERFACE OSSO IMPLANTE	42
CLAREAMENTO INTERNO - RISCOS E BENEFÍCIOS	42
UTILIZAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO E PLACAS E PARAFUSOS REABSORVÍVEIS EM ODONTOLOGIA.....	42
A INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DO DISCO ARTICULAR NA DINÂMICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.....	43
TERAPIA PULPAR EM DENTES DECÍDUOS: POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS E MATERIAIS OBTURADORES	43
INFLUÊNCIAS DA CULINÁRIA MARANHENSE E SEUS PRINCIPAIS PRATOS	43
PERFIL DOS INDIVÍDUOS QUE BUSCAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “AMAR”	44
REMODELAÇÃO DE INTERFACE OSSO-IMPLANTE.....	44
INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	45
O USO DE ANESTÉSICOS E VASOS CONSTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS	45
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR	45
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU): O EXAME DE URINA	46
A UROANÁLISE COMO EXAME COMPLEMENTAR NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA	46
EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC	46
ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL	47
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ESCOLARES	47
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO	47
SÌNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)	48
DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE FÍSICA	48
CANDIDOSE.....	49
ANQUILOGLOSSIA.....	49
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS.....	49
REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA.....	49
ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS	50
A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO NA IMPLANTODONTIA	50
A FITOTERAPIA DA GARCÍNIA CAMBOGIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE	50
TÉCNICA DO RECONTORNO GENGIVAL E FRENOTOMIA: RELATO DE CASO	51
PERFIL GESTACIONAL DE ADOLESCENTES ATENDIDAS EM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE DE FERRER- MARANHÃO	51

NORMAS INTERNACIONAIS DE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA.....	52
PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	52
CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.	52
EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.	53
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.	53
EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.	54
CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	54
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.	54
ESTUDO “in vitro” DA RESISTÊNCIA ADESIVA DO ESMALTE DECÍDUO, UTILIZANDO SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES E SUBMETIDOS À APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR.	55
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS.....	55
EXAME DE URINA COMO FERRAMENTA LABORATORIAL PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA	56
ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES DO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E RESINA COMPOSTA E CASO CLINICO	56
TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS.....	56
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM NEFROLOGIA: PROMOVENDO BEM-ESTAR A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.	57
EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS	57
O PSICÓLOGO ESCOLAR E UMA PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL. PROMOVENDO A CONGRUÊNCIA, LOGO, A SAÚDE PSICOLÓGICA	58
FACETAS DIRETAS	58
INCIDÊNCIA DE CÂNCER EM SÃO LUÍS – MA: ESTIMATIVA PARA 2014	58
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DO ÍNDIO	59
LAMINADOS CERÂMICOS COMO UMA OPÇÃO CONSERVADORA.....	59
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE ARDÊNCIA BUCAL	60
ENDOCARDITE INFECCIOSA: DESMISTIFICANDO TABUS	60
ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSAO DE ALUNOS SURDOS BILINGUES DO ENSINO MEDIO	60
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NOS RESULTADOS DOS EXAMES DO COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA EM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DJALMA MARQUES	61
REMODELAÇÃO NA INTERFACE OSSO IMPLANTE	61
CLAREAMENTO INTERNO - RISCOS E BENEFÍCIOS	61
UTILIZAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO E PLACAS E PARAFUSOS REABSORVÍVEIS EM ODONTOLOGIA.....	62
A INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DO DISCO ARTICULAR NA DINÂMICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	62
TERAPIA PULPAR EM DENTES DECÍDUOS: POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS E MATERIAIS OBTURADORES	62
INFLUÊNCIAS DA CULINÁRIA MARANHENSE E SEUS PRINCIPAIS PRATOS	63
PERFIL DOS INDIVÍDUOS QUE BUSCAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “AMAR”	63
PAINEL REVISÃO DE LITERATURA.....	64
CÂNCER E SEUS PRINCIPAIS FATORES	64
AVALIAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE QUANDO COMPARADA A BETAMETASONA EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES.	64
EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC	64
ACIDENTES E COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA.....	65
FORMAS FARMACÊUTICAS UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA	65
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CAUSADAS POR ANTI-INFLAMATÓRIOS.....	65
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CAUSADAS POR MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	65

RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL COM A PNEUMONIA NOSOCOMIAL	66
USO DA FITOTERAPIA DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	66
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS.....	66
BISFOSFONATOS E SUA REPERCUSSÃO NA CAVIDADE BUCAL	67
UMA INTERVENÇÃO BIOPSISSOCIAL NA ÁREA DE ONCOLOGIA COM CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES: MINIMIZANDO OS IMPACTOS DA HOSPITALIZAÇÃO SEGUNDO A PERSPECTIVA HUMANISTA.....	67
AFECÇÕES ESTOMATOLÓGICAS ORIUNDAS DE FÁRMACOS.....	68
AVALIAÇÃO DA COR DE RESINAS COMPOSTAS SUBMETIDAS À IMERSÃO DE DIFERENTES SOLUÇÕES	68
NORMAS INTERNACIONAIS	68
INFLUÊNCIA DO ACABAMENTO E POLIMENTO NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DAS RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA	69
PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)	69
NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	70
CASÉOS AMIGDALIANOS.....	70
O PAPEL DOS IMUNONUTRIENTES NO TRATAMENTO DO CÂNCER	70
ATUAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL: UMA ABORDAGEM DO ESTADO DA ARTE	71
CARDIOPATIAS E SEUS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO.	71
MANEJOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES HIV POSITIVO NA ODONTOLOGIA	72
VIOLÊNCIA NA PERSPECTIVA GÊNERO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E EMPÍRICAS	72
TERCEIRA IDADE: CONTRIBUIÇÕES DO LAZER NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO	72
MANEJO DE PACIENTES PORTADOR DE DIABETES MELLITUS.	73
LESÕES HIPERCROMICAS E HIPOCROMICAS NA FACE	73
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS.....	74
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS	74
ÉTICA NA ODONTOLOGIA: ATENDIMENTO DO PACIENTE SORO POSITIVO.....	74
USO DE ANESTÉSICOS EM CRIANÇAS	75
NEUROFIBROMATOSE E SUAS ALTERAÇÕES DE INTERESSES ODONTOLÓGICOS.....	75
USO DA DAPIRONA NO MUNDO	75
ESTABELECIMENTO DE UM SORRISO HARMÔNICO E ESTÉTICO	76
IMPORTÂNCIA DO ATESTADO LEGAL NA ODONTOLOGIA	76
O USO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA	77
FISSURAS LABIOPALATINAS: REVISÃO DE LITERATURA	77
EROSÃO DENTAL.....	77
A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE PARA O SUCESSO DO PLANEJAMENTO ODONTOLÓGICO	78
BIOCOMPATIBILIDADE DOS MATERIAS UTILIZADOS EM PRÓTESE E EM DENTÍSTICAS, CERÔMEROS/ CERÂMICAS/PORCELANA	78
HEPATITES VIRAIS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	78
CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS-MA.	79
ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM DEPENDENTES QUÍMICOS	79
USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA	80
É SEGURO REALIZAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM GESTANTES?	80
PROJETO DE EXTENSAO.....	80
UNICEUMA SEM FRONTEIRAS	80
BULLYING NA ESCOLA: AÇÕES QUE PODEM PREVINIR ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA	81
EFEITO DO TREINAMENTO RESISITIDO SOBRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DE IDOSAS	81
LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?	82

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3.....	82
VOCÊ CONHECE A GOTA?	82
PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2.....	83
BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE.....	83
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1.....	83
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	84
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 1	84
PREVINA-SE A DENGUE MATA	84
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 2	85
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 3	85
GRIPE NÃO, É TUBERCULOSE!.....	85
GONORREIA: CONHECER PARA SE PROTEGER	86
PINTINHAS? SÓ É LEGAL NA GALINHA PINTADINHA.	86
AFASTE-SE DOS POMBOS!	86
CUIDE DO SEU MAIOR PATRIMÔNIO... SEU CORPO... SUA VIDA	87
CUIDADO, OLHA O POMBO!!!	87
NÃO TEM OUTRA OPÇÃO: CAMISINHA E HIGIENIZAÇÃO. CANDIDÍASE MERECE ATENÇÃO!	87
QUAL SEU TIPO?	88
PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2.....	88
VOCÊ CONHECE A GOTA?	88
LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?	89
BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE.....	89
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3.....	89
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1.....	89
AFASTE-SE DOS POMBOS!	90
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	90
NÃO TEM OUTRA OPÇÃO: CAMISINHA E HIGIENIZAÇÃO. CANDIDÍASE MERECE ATENÇÃO!	90
PINTINHAS? SÓ É LEGAL NA GALINHA PINTADINHA.	91
PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2.....	91
PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2.....	91
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 1	92
VOCÊ CONHECE A GOTA?	92
VOCÊ CONHECE A GOTA?	92
LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?	93
LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?	93
BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE.....	93
BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE.....	94
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 3	94
PREVENÇÃO PRIMÁRIA DE IAM NO CENTRO DE SAÚDE AMAR.....	94
GRIPE NÃO, É TUBERCULOSE!.....	95
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3.....	95
CUIDE DO SEU MAIOR PATRIMÔNIO... SEU CORPO... SUA VIDA	95
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3.....	96
BULLYING NA ESCOLA: AÇÕES QUE PODEM PREVINIR ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA	96

PROJETO AMIGOS DA ESCOLA: AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO	96
PREVINA-SE A DENGUE MATA	97
GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 2	97
GONORREIA: CONHECER PARA SE PROTEGER	97
CUIDADO, OLHA O POMBO!!!	98
UNICEUMA SEM FRONTEIRAS	98
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1.....	98
QUAL SEU TIPO?	99
PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1.....	99
EFEITO DO TREINAMENTO RESISITIDO SOBRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DE IDOSAS	99
MESA CLÍNICA.....	100
CÁLCULO DE TUBETES: UM APLICATIVO ÚTIL PARA O PLANEJAMENTO ANESTÉSICO	100
CONFECÇÃO DE SOBREMESAS PARA DIABÉTICOS	100
BIOMASSA DE BANANA VERDE: PROPRIEDADES FUNCIONAIS E GASTRONÔMICAS.....	100
AVALIAÇÕES SENSORIAIS – TESTE GUSTATIVO (SOLUÇÕES DE DIFERENTES SABORES SOBRE A LÍNGUA).	101
AROMATERAPIA EM ODONTOLOGIA	101
INSTRUMENTAIS UTILIZADOS EM CIRURGIA E TRUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL E FIXAÇÃO INTERNA RÍGIDA	102
PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL RETIDA POR IMPLANTES ZIGOMÁTICOS APÓS A RESSECÇÃO DO LÁBIO SUPERIOR E NARIZ	102
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NO DIAGNÓSTICO DE EXTENSO TUMOR ODONTOGÊNICO QUERATOCÍSTO: CASO CLÍNICO	102
RELATO DE CASO CLÍNICO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE	103
EXÉSERE DE TÓRUS BILATERAL MANDIBULAR.....	103
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL NA PANCREATITE AGUDA	103
RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES FRATURADOS UTILIZANDO RESINAS COMPOSTAS – RELATO DE CASO CLÍNICO	104
RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES FRATURADOS UTILIZANDO RESINAS COMPOSTAS – RELATO DE CASO CLÍNICO	104
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	104
RESTAURAÇÕES CLASSE IV E REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVOS SUPERIORES TÉCNICA DO MOCK-UP: RELATO DE CASO CLÍNICO.	105
CÂNCER GÁSTRICO	105
AMELOBLASTOMA MULTICÍSTICO : RELATO DE CASO CLÍNICO	106
USO DE ACESSO CADWELL- LUC PARA REMOÇÃO DE RAIZ RESIDUAL NO SEIO MAXILAR – RELATO DE CASO CLÍNICO	106
AMELOBLASTOMA: ANÁLISE CLÍNICA, RADIOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA.....	106
PRESENÇA DE DENTE SUPRANUMÉRARIO RETIDO NO SEIO MAXILAR – RELATO DE CASO CLÍNICO	107
MIMETIZAÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL FIXA EM CASO DE FLUOROSE DENTÁRIA	107
REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TÓRUS PALATINO: RELATO DE CASO CLINICO	107
TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR NA DENTIÇÃO DECÍDUA: RELATO DE CASO CLÍNICO.....	108
USO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) COMO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA	108
USO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) COMO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA.....	109
FATORES QUE INTERFEREM NO SUCESSO DA OSTEINTEGRAÇÃO	109
ANSIEDADE: RELATO DE UMA INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL	109
INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?	110
AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.	110
INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.	111
PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA.....	111

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATE- RNOS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR	112
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UTILIZAÇÃO DA ASG 7 ESCALAS	112
EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS	112
NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS INICIAN- TES DO ESTÁGIO DE AUDIOLOGIA SOBRE BIOSSEGURANÇA	113
PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS DE SÃO LUÍS – MA	113
ÍNDICE DE CONICIDADE ASSOCIADO À PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS DE UM AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA	113
COMPARAÇÃO ENTRE ASG E NRS-2002 NA TRIAGEM NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO	114
IMPACTO DO TRAUMATISMO DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES E DE SUAS FAMÍLIAS	114
EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SÃO LUÍS	115
CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA	115
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PRESENTES EM DIETAS ENTERAIS DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO LUÍS-MA	115
CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL E CLÍNICA DE CRIANÇAS COM PNEUMONIA AGUDA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL	116
DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.	116
MONITORAMENTO TEMPO E TEMPERATURA DE REFEIÇÕES DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA	117
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA	117
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE PESCADOS COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA LIVRE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO	118
CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE EGRESSOS E FORMANDOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICUMAL - MA	118
CUIDANDO DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA	118
PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA	119
INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATE- RNOS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR	119
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UTILIZAÇÃO DA ASG 7 ESCALAS	120
EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS	120
DISTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SÃO LUÍS – MA	120
EQUILÍBRIO POSTURAL E PROCESSAMENTO COGNITIVO EM IDOSOS SUBMETIDOS A ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA.	121
GRUPO OPERATIVO COM GESTANTES: Uma ótica na qualidade de vida	121
USO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DO CUIDADO E ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.	122
INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO FÍSICO E COGNITIVO NO MEDO DE QUEDAS EM IDOSOS	122
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES OSTOMIZADOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SÃO LUÍS – MA NO ANO DE 2013	122
ACESSIBILIDADE ORGANIZACIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL À REABILITAÇÃO MOTORA EM SÃO LUÍS: COMO ESTAMOS?	123
COMPARAÇÃO DAS CONDUTAS DE SAÚDE ENTRE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO LUIS	123
A FLEXIBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A AUTONOMIA FUNCIONAL EM IDOSOS	124
TDAH - FIQUE ALERTA AO DIAGNÓSTICO!	124
CONTROLE DA ANSIEDADE POR MEIO DE FITOTERÁPICOS NA ODONTOLOGIA	125
INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADEÇÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS	125
A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE DUPLA TAREFA NA FLUÊNCIA VERBAL DOS IDOSOS	125
INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.	126
AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.	126
INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?	127
RISCO CARDIOVASCULAR DE IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO	127

CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO	128
AVALIAÇÃO IN VITRO DA RESISTÊNCIA ADESIVA DE NOVO SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL	128
IMPACTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES	128
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: IMPACTO NO CPO-D AOS 12 ANOS	129
DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA	129
PERFIL DE HIGIENE BUCAL DE CUIDADORES DE PNE	130
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM HIPERFOSFATEMIA EM HEMODIÁLISE	130
CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA COMPARADO AO DE OUTROS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER	130
CORRELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM INDICADORES DE ADIPOSIDADE E EM MULHERES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA.....	131
FATORES ASSOCIADOS A PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES COM RIZOGENESE IMCOMPLETA: ANÁLISE RETROSPECTIVA.....	131
CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO.....	132
EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL DE MULHERES FUMANTES	132
HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	133
MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO UTERINO EM SAO LUÍS-MA	133
PERFIL DOS PORTADORES DA TUBERCULOSE QUE ABANDONAM TRATAMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SÃO LUÍS – MA	133
PREVALÊNCIA DE LESÕES OSTEOMUSCULARES NA COLUNA VERTEBRAL EM MULHERES BENEFICIADAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 2008 A 2012	134
INTERAÇÕES FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES ANTISSOCIAIS DE COMPORTAMENTO	134
AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DOS MÉDICOS NO USO DE VASOCONSTRITORES EM PACIENTES CARDIOPATAS.	135
PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM	135
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MOTORAS EM ADULTOS PORTADORES DE HANSENÍASE ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM SÃO LUÍS – MA	135
AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA DE JOVENS ESCOLARES: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRATICANTES DE BASQUETE E NATAÇÃO ...	136
HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	136
DESCONFORTO FÍSICO EM CUIDADORES DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS	137
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS, MA	137
PREVALÊNCIA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.....	138
PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE	138
RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE AS ALTERAÇÕES POSTURAS E VISUAIS	138
CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL	139
PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA	139
PERFIL DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO BAIRRO MARACANÃ EM SÃO LUÍS – MA	140
NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DE SÃO LUÍS- MA	140
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS, MA	140
PREVALÊNCIA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.....	141
PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE	141
RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE AS ALTERAÇÕES POSTURAS E VISUAIS	141
CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL	142
PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA	142
PERFIL DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO BAIRRO MARACANÃ EM SÃO LUÍS – MA	143

NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DE SÃO LUÍS- MA	143
MORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA POR HIV-AIDS EM SÃO LUÍS-MA	143
ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL ENTRE USUÁRIAS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA	144
CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA	144
CONHECIMENTO E PRÁTICA SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA ENTRE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM	145
A ACURACIDADE DE DOIS LOCALIZADORES APICAIS ELETRÔNICOS: ESTUDO IN VITRO	145
GESTANTES HIPERTENSAS DETECTADAS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA	145
COBERTURA VACINAL DO ESQUEMA BÁSICO EM MENORES DE UM ANO EM UM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA	146
CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRAUMA EM PACIENTES DE UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA	146
AMPUTAÇÕES DE MEMBROS INFERIORES DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA.....	147
A VISÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO À INCLUSÃO DA CAPOEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR EM SÃO LUÍS- MA	147
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE MÉIS DE ABELHA COMERCIALIZADOS EM FEIRAS DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO	147
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E ASMA - ESTUDO COMPARATIVO	148
PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA	148
IMPACTO DA CÁRIE NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA	149
O CONSUMO DE FIBRAS ALIMENTARES EM POPULAÇÃO ADULTA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO	149
CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO HIPERDIA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO ESTADO DO MARANHÃO	149
PERFIL DOS GESTORES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM SÃO LUÍS-MA	150
ASPECTOS FISIOLÓGICOS E BIOMECÂNICOS EM NADADORES JOVENS: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS ESPAÇO-TEMPORAIS E LACTATO	150
PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM	151
HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA	151
AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DOS MÉDICOS NO USO DE VASOCONSTRITORES EM PACIENTES CARDIOPATAS.	151
DESCONFORTO FÍSICO EM CUIDADORES DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS	152
AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA DE JOVENS ESCOLARES: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRATICANTES DE BASQUETE E NATAÇÃO	152
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MOTORAS EM ADULTOS PORTADORES DE HANSENÍASE ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM SÃO LUÍS – MA	153
UTILIZAÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO EM DENTES DECÍDUOS: RELATO DE CASO CLÍNICO	153
USO DA TOXINA BOTULÍNICA A (BONTA) NA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL	153
CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS -MA.	154
CIRURGIA DE TOROS MANDIBULAR: RELATO DE CASO	154
USO DO EXTRATO DE CAPIM-LIMÃO COMO SUBSTÂNCIA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE ASSOCIADA À PRÓTESE: EFEITO ANTIFÚNGICO E CITOTÓXICO.	154
AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES HIPERTENSOS DE UMA UBS EM SÃO LUÍS -MA.....	155
EFEITO DO CINEMALDEÍDO NA HEMÓLISE DAS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923 E ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC19443	155
CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.	156
CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS-MA.	156
CIRURGIA DE TOROS MANDIBULAR: RELATO DE CASO	157

AÇÃO ANTIBACTERICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE A BACTÉRIA STAPHYLOCOCCUS AREUS (ATCC 6538)	157
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE FORMAÇÃO DE BIOFILME POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027	157
RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	158
EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCOS EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS	158
OSTOMIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 2006 A 2013	158
RONCO: UM SINAL DE ALERGA PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	159
OBESIDADE INFANTIL EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE SÃO LUÍS - MA	159
OSTOMIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 2006 A 2013	160
RONCO: UM SINAL DE ALERGA PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	160
ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) NA CIDADE DE BACABAL	160
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISLHAMENTO DE BRAQUETES COLADOS EM RESINA COMPOSTA COM E SEM ASPERIZAÇÃO	161
BURNOUT: PREVINA-SE.....	161
AÇÃO ANTIBACTERICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE A BACTÉRIA STAPHYLOCOCCUS AREUS (ATCC 6538)	162
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE FORMAÇÃO DE BIOFILME POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027	162
RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	163
AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA	163
GRAU DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE O MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES QUE UTILIZAM BISFOSFONATOS	164
EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCOS EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS.....	164
CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.	164
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO NOTIFICADA	165
REGISTROS DE ENFERMAGEM: ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA	165
SOROLOGIA ANTI-HIV: ACONSELHAMENTO ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DO TESTE	165
ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM A PARTIR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL	166
O CONTEXTO SOCIAL DE VIOLÊNCIA E SUA INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO ALUNO E PROFESSOR	166
O AMBIENTE DE TRABALHO DA BIBLIOTECA DE UMA UNIVERSIDADE SOB A PERCEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	167
ESTILO DE VIDA E HÁBITOS ALIMENTARES DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DO UNICEUMA: COMO ESTAMOS?	167
CUIDANDO DE QUEM CUIDA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE REPERCUSSÕES NA VIDA DO CUIDADOR FAMILIAR	167
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA DISCIPLINA SAÚDE DA MULHER.....	168
ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	168
DIFICULDADES DE LEITURA E BAIXA VISÃO ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR ALUNA DO ENSINO TÉCNICO	169
HABILIDADES SOCIAIS COM ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DE INTERVENÇÃO EM GRUPO	169
EFEITO DO EXTRATO DE MASTRIZ SOBRE BIOFILMES DE CANDIDA ALBICANS EM SUPERFÍCIE DE RESINA ACRÍLICA	170
PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE COM DOR ARTICULAR: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	170
PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE COM DOR ARTICULAR: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	170
ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) NA CIDADE DE BACABAL	171
BURNOUT: PREVINA-SE.....	171
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISLHAMENTO DE BRAQUETES COLADOS EM RESINA COMPOSTA COM E SEM ASPERIZAÇÃO	172

AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE O MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES QUE FAZEM USO DE BISFOSFONATOS	172
EXÉSERE DE TORUS BILATERAL MANDIBULAR	173
USO DE ANESTÉSICOS EM CRIANÇAS.....	173
PAINEL CASO CLÍNICO	173
EXÉSERE DE TORUS BILATERAL MANDIBULAR.....	173
PAINEL DE REVISÃO DE LITERATURA	173
USO DE ANESTÉSICOS EM CRIANÇAS.....	173
MOSTRA PET- SAÚDE	173
DERMATITE DE FRAUDAS: ORIENTAÇÕES HIGIÊNICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	173
FATORES DE RISCO PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	174
AMAMENTAÇÃO: OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DA MULHER	174
IMPACTO DA DIARRÉIA AGUDA NA SAÚDE DA CRIANÇA	174
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM SALA DE ESPERA	175
INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	175
INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES NO SURGIMENTO DE OBESIDADE INFANTIL E SUAS COMPLICAÇÕES: REVISÃO DE LITERATURA	176
RELAÇÃO DA NATALIDADE COM O GRAU DE ESCOLARIDADE DE MULHERES EM IDADE FERTIL	176
REALIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE UNICEUMA.....	176
SÍNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)	177
MILIÁRIA: ERUPÇÃO CUTÂNEA COMUM NA SAÚDE DA CRIANÇA	177
O IMPACTO DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS COM ENFOQUE NA SAÚDE DAS CRIANÇAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	178
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS	178
RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	179
ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EM QUATRO UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO LUÍS-MA	179
INFLUENCIA DO ESTADO CIVIL NO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA EM GESTANTES DE SÃO LUIS.....	179
PROPORÇÃO DE MENORES DE 4 MESES EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	180
RELATO DE EXPERIÊNCIA: PET-SAÚDE CEUMA NA PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	180
A ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PET-SAÚDE	180
CONSUMO DE DROGAS EM GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS	181
ATENÇÃO PRÉ-NATAL ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE PENITENCIÁRIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	181
FATORES DESENCADEANTES DE INFECÇÃO NO PUERPÉRIO QUE GERAM IMPACTO NA MORTALIDADE MATERNA	182
INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR	182
PREVALÊNCIA DA IDADE DE RISCO EM GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS	182
ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL SEGUNDO O ÍNDICE DE KESSNER EM GESTANTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.....	183
INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS	183
PERFIL ATITUDINAL DE SAÚDE BUCAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DE SÃO LUIS	184
COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE UM ANO NO CENTRO DE SAÚDE AMAR	184
HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS-MA	184
ALEITAMENTO MATERNO: FATORES QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE	185
PET-SAÚDE: IMPACTO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE	185
ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL DE QUALIDADE: REVISÃO DE LITERATURA	185
ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS DECORRENTES DO PERÍODO GESTACIONAL DE MULHERES ASSISTIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SÃO LUIS	186
PAINEL PESQUISA – GRADUAÇÃO	186
EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS	186

INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.	187
DISTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SÃO LUÍS – MA	187
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: IMPACTO NO CPO-D AOS 12 ANOS.....	187
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE PESCADOS COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA LIVRE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO	188
AVALIAÇÃO IN VITRO DA RESISTÊNCIA ADESIVA DE NOVO SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL	188
IMPACTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES	189
CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL E CLÍNICA DE CRIANÇAS COM PNEUMONIA AGUDA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL	189
CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO.....	190
RISCO CARDIOVASCULAR DE IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO	190
COMPARAÇÃO ENTRE ASG E NRS-2002 NA TRIAGEM NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO	190
EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SÃO LUÍS	191
DIETA PÓS-OPERATÓRIA EM ODONTOLOGIA	191
EQUILÍBRIO POSTURAL E PROCESSAMENTO COGNITIVO EM IDOSOS SUBMETIDOS A ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA.	191
DESAFIOS DOS ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS	192
AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.	192
DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.	193
DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.....	193
PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS DE SÃO LUÍS – MA	194
TDAH - FIQUE ALERTA AO DIAGNÓSTICO!	194
GRUPO OPERATIVO COM GESTANTES: Uma ótica na qualidade de vida	194
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PRESENTES EM DIETAS ENTERAIS DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO LUÍS-MA	195
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM HIPERFOSFATEMIA EM HEMODIÁLISE	195
CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA COMPARADO AO DE OUTROS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER.....	196
CORRELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM INDICADORES DE ADIPOSIDADE EM MULHERES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA.....	196
ÍNDICE DE CONICIDADE ASSOCIADO À PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS DE UM AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA	197
ACESSIBILIDADE ORGANIZACIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL À REABILITAÇÃO MOTORA EM SÃO LUÍS: COMO ESTAMOS?	197
PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA.....	197
A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE DUPLA TAREFA NA FLUÊNCIA VERBAL DOS IDOSOS.....	198
USO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DO CUIDADO E ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.	198
EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO DA DENTINA COM BIOVIDRO NIBOFOSFATO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES.....	199
INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?	199
CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA	200
EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL DE MULHERES FUMANTES	200
MONITORAMENTO TEMPO E TEMPERATURA DE REFEIÇÕES DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA	200
O USO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA	201
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES OSTOMIZADOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SÃO LUÍS – MA NO ANO DE 2013	201

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATE- RNOS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR	202
IMPACTO DO TRAUMATISMO DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES E DE SUAS FAMÍLIAS	202
INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS	202
PERFIL DE HIGIENE BUCAL DE CUIDADORES DE PNE	203
COMPARAÇÃO DAS CONDUTAS DE SAÚDE ENTRE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO LUIS	203
NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS INICIAN- TES DO ESTÁGIO DE AUDIOLOGIA SOBRE BIOSSEGURANÇA	204
FATORES ASSOCIADOS A PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES COM RIZOGENESE IMCOMPLETA: ANÁLISE RETROSPECTIVA.....	204
CUIDANDO DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA	204
CONTROLE DA ANSIEDADE POR MEIO DE FITOTERÁ- PICOS NA ODONTOLOGIA	205
A FLEXIBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A AUTONOMIA FUNCIONAL EM IDOSOS	205
CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE EGRESSOS E FORMANDOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICUMAL - MA	205
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA	206
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UTILIZAÇÃO DA ASG 7 ESCALAS	206
INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO FÍSICO E COGNITIVO NO MEDO DE QUEDAS EM IDOSOS	207
PÓS-GRADUAÇÃO	209
MESA CLÍNICA	211
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA ODONTOLOGIA: UTILIZAÇÃO DE PONTAS ULTRA-SÔNICAS CVD	211
CAUSAS BUCAIS DA HALITOSE	211
O USO DE PRÓTESES BUCO-MAXILO-FACIAIS EM PACIENTES COM DEFORMIDADES – ARTE ALIADA À PRÁTICA REABILITADORA	211
MOVIMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS COM MINI-IMPLANTES	212
INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA	212
ASPECTOS LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES	212
A UTILIZAÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) NA ODONTOLOGIA.....	213
DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPAROS PARA FACETAS DENTAIS	213
AGREGADO DE TRÍOXIDO MINERAL E USO COMO MATERIAL RETROBTURADOR EM CIRURGIA PARAENDODÔNTICA	213
O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR SOCORRISTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA	214
POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	214
TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA REVISÃO CRÍTICA.....	214
EFEITO DA IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL ULTRASSÔNICA PASSIVA NO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS	215
O PERFIL DO TRAUMATISMO BUCO-MAXILO-FACIAL NO TRÂNSITO	215
OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL ATRAVÉS DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA.....	215
RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL	216
MOVIMENTOS ORTODÔNTICOS COM MINI-IMPLANTES.....	216
ENFRENTANDO O CÂNCER EM FAMÍLIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	217
CAMINHOS DO CUIDADO: POSSIBILIDADES EM SAÚDE POR MEIO DA APROXIMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE MENTAL.	217
A SEGURANÇA DO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL NA PREVENÇÃO DE QUEDAS: AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM	218
TEMA LIVRE DE PESQUISA	218
AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA	218
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.	218
CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	219
AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA	219
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.	220

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	220
MOVIMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS COM MINI-IMPLANTES	221
PINOS INTRA-RADICULARES PRÉ-FABRICADOS	221
ASPECTOS LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES.....	221
A UTILIZAÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) NA ODONTOLOGIA.....	222
DIFERENTES TECNICAS DE PREPAROS PARA FACETAS DENTAIS	222
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	223
EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE DE UMA CLÍNICA DE SÃO LUÍS – MARANHÃO	223
CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: QUEM SÃO E O QUE FAZEM?	223
FORUNS CIENTÍFICOS REVISADOS.....	224
A SOLIDÃO ONTOLÓGICA NOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS MEDIADOS PELA INTERNET	224
SENSIBILIZANDO A RELAÇÃO DE AJUDA ATRAVÉS DA ARTE EDUCATIVA COM AFETIVIDADE.....	224
USO DO CAPIM-LIMÃO NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE ASSOCIADA À PRÓTESE: EFEITO ANTIFÚNGICO E CITOTÓXICO	224
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO PÓS-TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA OU EM DUAS SESSÕES	225
PAINEL PESQUISA – PÓS-GRADUAÇÃO/ PROFISSIONAL	225
CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	225
DETERMINANTES DA CÁRIE PRECOCE DA INFÂNCIA: ESTUDO RANSVERSAL ANINHADO À CORTE RETROSPECTIVA COM ABORDAGEM HIERARQUIZADA	226
POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO URUCUM (BIXA ORELLANA) CONTRA BACTÉRIAS PATOGÊNICAS.....	226
TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA REVISÃO CRÍTICA.....	227
OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL ATRAVÉS DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA.....	227
EFEITO DA IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL ULTRASSÔNICA PASSIVA NO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS	227
RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL	228
RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL	229
AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL E USO COMO MATERIAL RETROBTURADOR EM CIRURGIA PARAENDODÔNTICA	229
POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	229
PINOS INTRA-RADICULARES PRÉ-FABRICADOS	230
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ABSCESSO PERIAPICAL SEM FÍSTULA, COM MATERIAL OBTURADOR EXTRAVASADO PARA O LIGAMENTO PERIODONTAL	230
CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	230
DETERMINANTES DA CÁRIE PRECOCE DA INFÂNCIA: ESTUDO RANSVERSAL ANINHADO À CORTE RETROSPECTIVA COM ABORDAGEM HIERARQUIZADA.....	231
POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO URUCUM (BIXA ORELLANA) CONTRA BACTÉRIAS PATOGÊNICAS.	231
PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO ALIMENTAR DE JOGADORES DE BASQUETE DE UM TIME DE SÃO LUÍS, MARANHÃO.....	232
PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA.....	232
RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS ALIMENTARES E O ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE	233
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	233
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.	233
CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	234

Apresentação

O II Congresso da Saúde e Bem-Estar do Maranhão foi realizado no período de 20 a 24 de Outubro de 2014, com a temática *Do olhar Multidisciplinar as Especificidades*. O evento foi organizado por todos os cursos da área da saúde da Universidade CEUMA, e reuniu 1800 participantes, englobando a participação de todas as áreas da saúde.

Durante o Congresso, foram realizados mini cursos, hands-on, conferencias, mesas redondas, apresentações de trabalhos científicos, projetos de pesquisa e extensão, mesas clinicas, mesas demonstrativas, trabalhos de conclusão de curso. Além disso ocorreu o debate entre as ligas acadêmicas da saúde, no I Encontro de Ligas Acadêmicas da Saúde, em um momento único de trocas de experiências entre as mesmas.

Os resumos que compõem a presente publicação, em sua grande parte, tiveram sua origem em trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso de graduação, de especialização e de mestrado, desenvolvidos por alunos e professores dos diversos cursos da área da Saúde da Universidade CEUMA e de demais Instituições de Ensino Superior que se inscreveram com o intuito de divulgar suas pesquisas individuais e/ou coletivas.

Foi muito gratificante, e engrandecedor, participar das discussões que se desenvolveram durante o evento que manteve, ao longo dos cinco dias de atividades, a participação dos autores de 600 trabalhos provenientes tanto da Universidade CEUMA quanto de diversas outras instituições de ensino superior da região, e de demais estados. Assim é de fundamental importância a divulgação dos resumos para que o leitor possa avaliar a relevância dos assuntos apresentados.

É com imensa satisfação que agradecemos a todos aqueles que contribuíram para a realização deste II Congresso da Saúde e Bem Estar do Maranhão, e destacamos particularmente a importância dos alunos que, de diferentes formas nos acompanharam ao longo da organização e realização do Congresso.

Comissão organizadora do II Congresso da Saúde e Bem-Estar do Maranhão
São Luis, Dezembro de 2014

ANAIS DO II CONGRESSO
DE SAÚDE E BEM-ESTAR

GRADUAÇÃO

TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA

REMODELAÇÃO DE INTERFACE OSSO-IMPLANTE

ALBINO, Laíla da Veiga*; SILVA, Jessica Karla Silva; SILVA, Fabiola Ayane Costa; SILVA, Antônia Claudia Gonçalves

Orientador: RUDYS

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: laila.albino@hotmail.com

Os implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionados cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir raízes dentários.

Antes da colocação de qualquer implante é de suma importância o conhecimento do profissional em relação à estrutura óssea à qual será colocado o implante e também a sequência do processo de remodelação óssea.

O nosso organismo tem células que são específicas para o processo de formação óssea. As células mesenquimais indiferenciadas, que se diferenciam em células progenitoras ósseas que evoluem e se transformam em osteoblastos, os osteócitos que são os osteoblastos maduros e os osteoclastos, células multinucleadas responsáveis pela reabsorção óssea. A ação destas células para formação óssea se dá pelo processo conhecido como osteogênese. No decorrer de nossas vidas estamos sujeitos aos processos de modelação e remodelação óssea. Sendo a modelação resultado da alteração da forma e do tamanho do osso, tendo locais independentes de formação e reabsorção, e a remodelação refere-se às ações conjuntas e sequenciais dos osteoblastos e osteoclastos que removem osso envelhecido e substituem por um novo tecido ósseo.

Além do conhecimento sobre o tecido ósseo e seus processos, há fatores que estão intimamente relacionados à remodelação: a idade, a saúde do paciente. Quanto ao implante: biocompatibilidade, forma do implante, superfície e os princípios cirúrgicos e protéticos.

As medidas sugeridas relacionam-se à remodelação óssea após a inserção do implante, no intuito de se obter o sucesso.

INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRADE, Elaine Pereira*; ALVES, Thaís Costa; E Cordeiro, Sandra Komarsson Carvalho

Curso: medicina

Categoria: graduação

Email: thais_costalves@hotmail.com

Resumo: O PET Saúde tem como propósito a educação pelo trabalho, configurando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, tendo como enfoque o reconhecimento das necessidades dos serviços oferecidos pelo SUS como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. Este trabalho objetivou relatar a experiência de acadêmicas de Medicina da Universidade Ceuma, no desenvolvimento de atividades realizadas na atenção básica. Trata-se de um relato de experiência proporcionado pelo programa PET/Saúde, na UBS Nazaré Neiva do município de São Luís, durante o período de abril a maio de 2014. Percebeu-se através da aplicação de questionários com foco na saúde da gestante e da criança e elaboração de um portfólio contemplando informações a cerca da Superintendência de Educação em Saúde do Município de São Luís, que essas atividades possibilitaram as estudantes uma visão aprofundada a cerca da realidade de gestantes e crianças usuárias dos serviços de saúde oferecidos pela ESF, o que ampliou o conhecimento social, sanitário e epidemiológico dos envolvidos, permitindo momentos de prática e consolidação dos conteúdos adquiridos na escola de medicina, através de orientações referentes a temas comuns na obstetrícia e pediatria. Desse modo, pode-se inferir que o PET/Saúde tem se constituído como uma importante estratégia de melhoria da formação profissional de estudantes da área da saúde, promovendo futuramente, avanços na assistência aos usuários do SUS.

O USO DE ANESTÉSICOS E VASOS CONSTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS

ARAÚJO, Leanderson Cutrim *; ALMEIDA, Renata Fernanda Mendes; ROCHA, Marcio Lima; Maciel, Andrezza Bastos

Curso: odontologia

Categoria: graduação

Email: leo.cutrim@icloud.com

Resumo: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Homens e mulheres são acometidos, tais patologias são também importantes não só pela gravidade, como também pelas quantidades de pessoas que são acometidas e que estão em tratamento, por este motivo a uma grande demanda desse tipo de paciente nos consultórios odontológicos. Esses pacientes precisam de uma preocupação e atenção especial em todos os setores, e nos consultórios odontológicos não é diferente, tanto para pequenos como para grandes procedimentos odontológicos, sendo muito importante saber quais medicamentos usar em certas situações, assim como anestésicos e uso ou não de vasoconstrictor.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR

ASSUNÇÃO, Carla Maria Reis; BARROS, Valeria; KEULER, Hellen; THAYLANE, Andressa; BECKMAN, Marcia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: carllajoaquina.28@hotmail.com

O objetivo desse trabalho é apresentar uma Proposta de intervenção em Psicologia Escolar, onde foi montando um planejamento de intervenção conforme a necessidade e disponibilidade da instituição escolar Elzuila Abreu turno vespertino, baseada nas observações feitas por nós, alunos graduandos de Psicologia, na escola que atuamos. Essa Proposta de intervenção em Psicologia Escolar é um projeto que nos leva à prática do que nos é ensinado teoricamente em sala de aula, podendo nos fazer perceber o quanto é fundamental estarmos envolvidos nesse contexto escolar como profissionais dotados de preparo e dispostos a crescer e contribuir, não somente com a prática pedagógica, mas, em todas as áreas da psicologia, pois às mesmas se cruzam e se fazem presentes em toda a vida de um psicólogo.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU): O EXAME DE URINA

ASSUNÇÃO Raissa Guará*, CORDEIRO, Iasmym Aparecida Ribeiro; FERREIRA, Rayana Larissa Pinheiro Soares; NUNES, Jadna Patricia Pinheiro; MIRANDA, Ianna Lara de Paula ; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

Email: raissa_guara@hotmail.com

As infecções do trato urinário (ITU) integram o grupo de infecções que acometem frequentemente a população, sendo para o sexo feminino os maiores índices. Revisão Bibliográfica: Os agentes etiológicos da ITU mais comuns constituem a classe das enterobactérias, no qual a Escherichia coli é o patógeno mais comum (MENEZES, 2004). Na interpretação do resultado do exame de urina, é indicado fazer uma triagem sobre a procedência da amostra, com relação aos cuidados pessoais e as técnicas laboratoriais (RIBEIRO, 2005). No Brasil 80% dos casos clínicos observados, estão relacionados às ITU que pode envolver tanto o trato urinário baixo quanto o alto ou ambos (HEILBERG, 2002). Aproximadamente 50 a 70% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU em sua vida, e as cistites afetam entre 10 a 20 % da população (HEILBERG,2002). A urocultura é o exame laboratorial utilizado como ferramenta complementar ao diagnóstico das ITU, pois possibilita o crescimento isolado do agente etiológico por meio da semeadura da urina e assim permite uma melhor eficácia em relação a antibioticoterapia (FERNANDES,2003); (POLETTI,2005). Conclusão: Na maioria das vezes o tratamento das ITU é iniciado antes do resultado laboratorial, onde considera-se somente o quadro clínico do paciente. Vale ressaltar a importância do exame de urina no auxílio diagnóstico das ITU, uma vez que possibilita a identificação do agente etiológico e ainda o perfil de sensibilidade bacteriana frente aos antimicrobianos administrados.

A UROANÁLISE COMO EXAME COMPLEMENTAR NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA

BASTOS; Alice Layra Silva*; TORRES, Deiyilson Silva; GRANGEIRO, Mariana Martins Santos; GUEDES, Fabrício Silva; CHAGAS, Laércio Cutrim; Da Rocha, Marla Raquel Pontes

Curso: biomedicina

Categoria: graduação

Email: mrlpontes@gmail.com

Resumo: O exame de urina constitui como uma importante ferramenta de diagnóstico complementar frente a avaliação da função renal e associação com doenças sistêmicas. Revisão Bibliográfica: A uroanálise é a análise física, química e microscópica da urina, que pode proporcionar nas investigações do trato urinário (JOVILIANO, 2014); (STRASINGER, 1998). O controle de qualidade adequado desde a coleta até a finalização do exame permite a uroanálise como objeto de investigação clínica médica (JOVILIANO, 2014). A análise da urina é feita quanto à quantidade; densidade; pH; aspecto físico (cor, transparência, cheiro); presença ou não de elementos, sedimentos anormais de germes; composição bioquímica e pesquisa microscópica (SCOTTI; FALKENBERG, 2014). Dentro da classificação das infecções urinárias, as cistites são infecções não complicadas enquanto as pielonefrites são mais complicadas, pois em geral resultam da ascensão de microrganismos do trato urinário inferior e estão frequentemente associadas com a presença de cálculos renais. Tanto a infecção urinária baixa como a alta podem ser aguda ou crônica e sua origem pode ser comunitária ou hospitalar (HENRY, 1999). A infecção urinária pode comprometer o trato urinário baixo, o que especifica o diagnóstico de cistite, ou afetar simultaneamente o trato superior; sendo utilizada a terminologia infecção urinária alta ou pielonefrite (HENRY, 1999). Conclusão: a uroanálise é utilizada no auxílio-diagnóstico frente as infecções do trato urinário em conjunto ao quadro clínico do paciente, sendo fundamento na identificação do agente etiológico e ainda para o monitoramento da eficácia da antibioticoterapia empregada.

EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC

BARROSO, Carolina Marques*; ARAÚJO, Randerson de Sousa; VIEIRA, Clarissa Lopes; SILVA, Marcos André dos Santos da

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: randersonsa@hotmail.com

A Radiologia odontológica assim como outras áreas da odontologia passou por profunda evolução tecnológica nos últimos anos. Exames convencionais como a radiografia panorâmica e as radiografias intra-orais evoluíram para o formato digital. Os aparelhos mais recentes trazem vantagens relevantes em relação aos métodos convencionais, tais como: maior resolução e contraste, menor dose de radiação ao paciente, otimizar o tempo, evitam repetições dos exames pelos erros de processamento. O avanço mais importante para odontologia, em geral foi a chegada da tomografia computadorizada cone-beam ou feixe cônico (TCFC). Desde 1980, a Odontologia tem se beneficiado de vários tipos de tomografia como a linear, multidirecional computadorizada fan-beam. Porém foi a tomografia cone-beam que atendeu satisfatoriamente à necessidade de imagem mais detalhadas e fiéis à anatomia da região da cabeça e pescoço utilizando baixa dose de radiação. Essa maior necessidade ficou evidenciada a partir do trabalho em reabilitação oral e facial com implantes osseointegrados. Nesse intuito, nosso objetivo será apresentar as novidades da TCFC do diagnóstico por imagem na odontológica.

ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL

BONFIM, Valéria da Silva* ; CAMPO, Renata Arruda Silva; JUNIOR, George Seixas Abreu;. SANTOS, Paulo Afonso Araújo dos;. SILVA, Valéria Lima da;. MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: pauloafonsomagnata@gmail.com

A síndrome da ardência bucal - SAB (glossidínia, glossopirose, síndrome da boca ardente, estomatodinia ou síndrome dos lábios ardentes), caracteriza-se pela experiência sensitiva de queimação na mucosa oral, concomitantemente associada à xerostomia e a alteração no paladar. Em termos mais científicos, pode ser definida como uma desordem ou desarranjo psicossomático, uma entidade clínica caracterizada pela sensação de ardor na mucosa oral sem que se possa detectar qualquer alteração ou lesão fora dos padrões da normalidade. O termo síndrome é usado devido à simultaneidade de diversos sintomas subjetivos, como a sensação de boca seca (xerostomia), paladar alterado (hipogeusia/disgeusia) e ardência nos tecidos orais. É considerada uma dor crônica, na qual está associada a sinais de normalidade e achados laboratoriais

normais. A queimação ocorre, na maioria dos casos, em mais de uma área, sendo os dois terços anteriores da língua, a metade do palato duro e a mucosa do lábio superior os locais mais afetados. Faz-se ainda, correlação entre a etiologia da SAB com uso de fármacos, fatores neuropáticos e referências aos mecanismos da dor crônica associados a fatores psicológicos. Sendo na maioria das vezes o tratamento sintomatológico o mais indicado, além das orientações sobre a síndrome, explicando como ocorrem, as dificuldades relativas ao tratamento e sobre o papel fundamental da cooperação do paciente. Apesar dos protocolos terapêuticos não estarem ainda totalmente determinados, a partir da identificação da causa, o tratamento deve ser direcionado a cada paciente. Dependendo das características envolvidas, uma equipe multiprofissional faz-se necessária objetivando a melhor qualidade de vida do paciente.

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ESCOLARES

CANTANHEDE, Anderson dos Santos*; MARIANO, Eder Rodrigo

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: anderson_cantanhede@hotmail.com

A obesidade é definida como um excesso de gordura corporal relacionado à massa magra, e sobrepeso como uma proporção relativa de peso maior que a desejável para a altura (GUEDES,2010).

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO

CARVALHO, Jennifer Nayara Humbelino de; MELO, Laise Arruda de; RABÊLO, José Lucas de Araújo; SILVA, Guilherme Vidigal Fernandes da; CARVALHO, Laise Neves CARVALHO

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

Email: zelucasrabelo@hotmail.com

Segundo a United States Department of Health and Human Services, a atividade física é definida como qualquer movimento corporal voluntário que resulta em gasto energético maior que o gasto em repouso. Já o exercício físico é caracterizado como toda atividade física estruturada, planejada e repetitiva que tem por objetivo a melhoria da saúde e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Esses termos se confundem e muitas vezes são utilizados como sinônimos (CASPERSEN 1985). A literatura recente mostra a necessidade de discriminar o domínio da atividade física ao considerar seus efeitos na gestação. Atividades físicas ocupacionais que envolvem grande esforço apresentam efeitos deletérios aos desfechos da gestação (TAKITO et al., 2010), e as de lazer e exercícios físicos mostram efeitos positivos (ZAVORSKY et al., 2011). Segundo o estudo “The benefits and risks of exercise during pregnancy” (2002), a atividade física aeróbia auxilia de forma significativa no controle do peso e na manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de diabetes gestacional, condição que afeta 5% das gestantes. A prática de exercícios, também, acarreta riscos potenciais para o feto em situações em que a intensidade do exercício seja muito alta, criando um estado de hipóxia para o feto, em situações em que haja risco de trauma abdominal e em situações de hipertermia da gestante. Com isso, é importante que toda gestante seja orientada sobre a necessidade da prática de exercício, conhecendo os benefícios, mas também os seus limites

SÌNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)

CORSO, Samir Henrique; COELHO, Patrícia Magalhaes; OLIVEIRA, Elane Carvalho; PINHEIRO, Flávia Coelho Mohana; SANTOS, Livia Eloi Castro; REGO, Iolanda Margarete de Araújo

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

Email: samirhcor@hotmail.com

A capacidade do álcool em romper a barreira placentária, faz com que o feto absorva as toxinas do metanol, não havendo enzimas que metabolizem o álcool no organismo do feto, este por sua vez age diretamente no sistema nervoso central do concepto. Sabe-se que as gravidezes não planejadas, em especial em adolescente, causa resistência na gestante em abster-se de práticas de lazer que envolvam o consumo de bebidas alcóolicas, soma-se a isso a cultura de cada país em fazer algumas apologias ao consumo de bebidas alcoólicas Os mecanismos de ação seriam a imaturidade hepática e enzimática do feto, que por não metabolizarem o álcool teria uma quantidade exacerbada de ácidos graxos e seus metabólitos que se depositariam no coração, fígado e rins do feto. Outro achado seria a probabilidade de o etanol impedir a absorção de alguns aminoácidos e nutrientes pela via placentária, retardando o crescimento e a divisão celular. O fígado exigindo um

aporte maior de oxigênio para tentar metabolizar estes metabólitos fariam com que as adrenais liberassem grande quantidade de catecolaminas causando uma vasoconstricção e maior deficiência de oxigênio, além da obstrução da vasculatura umbilical. O álcool causaria ainda, produção aumentada de prostaglandinas e produção de AMP cíclico, que em níveis elevados aumentariam ainda mais os danos ao SNC. Sabe-se sobretudo, que apesar dos três primeiros meses serem os mais suscetíveis a teratogênias e danos ao feto, não há dose segura nem tempo seguro para o consumo de bebida alcoólica durante a gestação. Se uma mulher grávida, efetivamente, nunca bebe sozinha, a primeira manifestação de amor ao bebê é afastar-se da bebida alcóolica. Mulheres que estão tentando engravidar devem se abster do álcool e mulheres que são alcoolistas devem procurar ajuda médica e terapêutica, como programas de reabilitação além de acompanhamento de um médico durante toda a gravidez.

DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE FÍSICA

COSTA, Jenypher Silva*; VILANE, Wanilla; ROCHA, Gisele

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: jenny_sc1@hotmail.com

A doença de Parkinson é mais comum em idosos e é caracterizada como uma doença neurológica que afeta os neurônios causando tremores, rigidez muscular, depressão, distúrbios do sono, dificuldade na respiração entre outras diversas consequências causadas no indivíduo, ou seja, há uma perda no desempenho funcional que está diretamente ligada com a capacidade física e mental interferindo em uma boa qualidade de vida do mesmo. A atividade física vem sendo um fator importante e determinante nesta patologia, pois quanto mais graves foram os sintomas mais inatividade a pessoa vai ter, podendo gerar até uma atrofia muscular. E essa atividade física vai ajudar na capacidade física que foi perdida por causa do mal de Parkinson e conseqüentemente ajudando também em uma melhora no desempenho motor, ela vem mostrando bons resultados na melhora deste quadro e elevando o nível de vida normal ou até próximo a este, o objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios da atividade física em pessoas portadoras da doença de Parkinson.

CANDIDOSE

COSTA, Iasmim Lima*; SILVA, Antônia Claudia G*; SILVA, Fabíola Ayane Costa*; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: iasmimlima@msn.com

A candidose se trata de uma doença não tão comum na população em geral, sendo assim, para adquirir é necessário fatores predisponentes locais ou sistêmicos. A candidose apresenta vários aspectos clínicos: pseudomembranoso (agudo), eritematoso (agudo e crônico), hiperplásico ou candidose leucoplásica e mucocutânea. Para que haja o tratamento das lesões deve-se ressaltar que são diferentes tipos de abordagem terapêutica.

ANQUILOGLOSSIA

COSTA, Lucas Tadeu Magalhães*; GOMES, Letícia Lafalhetes dos Santos; PIRES, Luiza Onezi Texeira;

LEAL, Otavio Henrique da Silva; PRADO, Sarah Maria; CALVET, Clélea de Oliveira; DE CASTRO, Ana Carolina Pereira

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lucasthadeu18@hotmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal aprimorar o conhecimento sobre a anquiloglossia, o encurtamento do freio lingual, destacando os diversos conceitos dessa anomalia, que resulta em alterações como: respiração bucal, desarmonia no crescimento facial entre as partes moles e duras, dificuldades na deglutição e na fala. Nesta revisão de literatura é mostrado como a doença surge e como pode ser tratada, através de artigos, livros e sites da internet; e dessa forma evidenciar a importância do seu conhecimento para o cirurgião-dentista.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS

CUNHA, Hacemyra*.; MARAMALDO, Juheyna; MUNIZ, Paloma ;. OLIVEIRA, Rafyzza; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hacemyracunha@gmail.com

CID (Classificação Internacional de Doenças) é um programa que tem como objetivo padronizar e classificar todas as doenças do planeta, tendo como prioridade estabelecer uma ordem para codificação de doenças. Foi criada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) com o intuito de auxiliar e buscar o diagnóstico para finalidades gerais como doenças não fatais, sinais das doenças, sintomas, queixas, circunstâncias, causas para cada problema de saúde e também para codificar e classificar os dados de mortalidade de atestados de óbitos. Esses códigos foram classificados por uma letra seguida por três números compondo quatro caracteres. As primeiras revisões da classificação foram usadas para causas de morte, só a partir da sexta revisão que tiveram finalidades de incluir doenças não fatais, logo depois ocorreram algumas inovações onde foi criada a nona revisão para fins experimentais. Chegando a décima, onde houve uma inovação com uso de esquema de código alfanumérico. O aperfeiçoamento do CID-10 entre os cirurgiões dentistas e a perícia odontológica no trabalho foi extremamente necessária. Antes da sua atualização se tratava de uma classificação precária para a área de odontologia. Uma das alternativas vista, além da atualização da CID é a CID-OE (Classificação internacional de doenças em estomatologia odontológica) que é mais específica e detalhada em alguns casos para a odontologia, onde teve abrangências com relação a mais patologias.

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*.; ALBINO, Laila Da Veiga.; NETTO, Osmar Portela.; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: jessicaskarlas@gmail.com

A regeneração tecidual guiada (RTG) consiste numa modalidade de tratamento regenerativo que requer a colocação de uma barreira física sobre o defeito ósseo, de modo que a proliferação de tecidos moles adjacentes para dentro da área protegida seja evitada. As barreiras físicas devem ser biocompatíveis, permitir oclusão celular manutenção do espaço, integração tecidual e facilidade de uso. Dentre os quais falaremos dos seguintes: Hidroxiapatita, Cola gel e Membranas e suas respectivas características

ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*.; ALBINO, Laila Da Veiga.; COSTA, Anne Beatriz De Deus;.

SENA, Valéria Costa; SILVA, Natã Felício De Souza; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: jessicaskarlas@gmail.com

Pacientes oncológicos que são submetidos ao intensivo tratamento quimioterápico, merecem maior atenção em relação a cavidade oral, pois haverá alterações significativas que podem interferir no resultado da terapêutica médica. As alterações bucais são comuns em pacientes com câncer, observa-se presença de xerostomia, mucosite e reações tóxicas e inflamatórias que atingem a mucosa oral e todo o trato intestinal. Sangramento e hemorragias gengivais são bastantes frequentes nestes casos. O desconforto e as dores proporcionadas aos pacientes padecentes desta doença são de grande intensidade, deixando-os fracos e dependentes de terceiros em sua grande maioria. Necessariamente, o papel principal da odontologia não deixa de agir no controle destas alterações na cavidade oral, proporcionando conforto e alívio da dor ao paciente.

A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO NA IMPLANTODONTIA

FIGEREDO, Lays Azulay; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: laysazulay87@gmail.com

As células tronco, também conhecidos como células-mãe e células estaminais, quando em condições adequadas, podem se diferenciar e se transformar em vários tipos de células do organismo. A capacidade de formar um órgão ou regenerar um tecido lesado, conferem a essas células um enorme potencial no tratamento de diversas doenças. A odontologia tem apresentado um dos desenvolvimentos mais animadores no que se refere às células tronco. Pesquisas demonstram que culturas de células tronco mesenquimais in vitro podem sofrer osteoindução e produzir células dos diferentes estágios da linhagem osteoblástica. Para a Implantodontia, isto vem como uma surpreendente opção de evolução nos enxertos, completamente biocompatível, com a mínima manipulação dos tecidos e maior rapidez nos procedimentos reconstrutivos diminuindo a dor e evitando lesões e morbidade na área doadora. É certo que uma vez esclarecidos os mecanismos envolvendo a diferenciação de células tronco em osteoblastos e materiais mais apropriados para promover a osteocondução, osteoindução e osteogênese, os procedimentos cirúrgicos que exigem uma resposta tecidual óssea satisfatória como os casos de implantes dentários osseointegrados e enxertos ósseos, seriam favorecidos, reduzindo o tempo de cicatrização, bem como os benefícios já supracitados. Por se tratar de uma técnica ainda nova e revolucionadora, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica, mostrando a evolução, prós e contras das células tronco na implantodontia.

A FITOTERAPIA DA GARCÍNIA CAMBOGIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE

FROES, Yuri Nascimento*; CARVALHO, Gesanage Da Paz; MUBARACK, Lucas Dos Santos; MOREIRA, Watna Sales

Orientador: REIS, Waneska Ferreira Cavalcante de Albuquerque

Co-Orientador: OLIVEIRA, Paula de Lourdes Lauande

Categoria: Graduação

Curso: Farmácia

E-mail: yurifroes@outlook.com

A obesidade representa um grave problema de Saúde Pública, estando frequentemente associada à redução da expectativa de vida e aumento de risco de morbidade. O uso de fitoterápicos vem despertando o interesse científico na comprovação de suas propriedades anti-obesidade, evidenciando efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos para a manutenção da saúde. Considerando que a obesidade é uma doença multifatorial, que atinge um grande número de indivíduos, independentemente da idade e situação econômica e que a utilização de substratos naturais de origem botânica vem sendo pesquisada como uma alternativa terapêutica de redução de peso, o objetivo do estudo é descrever a eficácia da fitoterapia da Garcínia cambogia no tratamento do aumento excessivo de peso e o acúmulo de gordura corporal acima dos padrões de normalidade. Trata-se de um estudo observacional descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas publicações nacionais e internacionais, com texto completo, escritas no idioma português ou inglês. A literatura pesquisada evidencia que o princípio ativo encontrado na Garcínia cambogia atua na redução da massa corpórea, dos níveis plasmáticos de colesterol total, LDL e triglicérides e, dentre as diversas plantas medicinais estudadas e utilizadas com o objetivo de redução de peso, apresenta maior potencial para geração de futuros fármacos, além de não causar efeitos colaterais e não ter contraindicação. O tratamento de estados patológicos através da utilização de produtos fitoterápicos em doses aceitáveis pode representar uma alternativa viável, eficaz e segura para prevenir dislipidemias e promover perda de peso.

TÉCNICA DO RECONTORNO GENGIVAL E FRENOTOMIA: RELATO DE CASO

GUARÁ, Tayanne Christine Gomes*; E COSTA, Hugo Costa; JÚNIOR, José Carlos Elias Mouchrek;

NUNES, Livia Helena de Araújo Castro

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hugocostaecosta@hotmail.com

Os valores estéticos são influenciados por fatores psicossociais, culturais e econômicos assim sendo o plano de tratamento deve sempre se ajustar na expectativa estética de cada paciente. Entretanto sorrisos equilibrados e em harmonia com as estruturas faciais e dento facial são considerados mais estéticos. A literatura odontológica mostra alguns pontos a serem

observados para podermos classificar o tipo de sorriso do paciente. Durante o sorriso, normalmente um indivíduo expõe de 1 a 3mm de gengiva, ressaltando o tecido gengival interdental e ainda a margem gengival. A gengivectomia por bisel interno é uma cirurgia ressectiva estética, que tem por objetivo o restabelecimento fisiológico do espaço biológico, permitindo que procedimentos restauradores sejam compatíveis com a saúde periodontal, sendo necessários a existência de larga faixa de gengiva queratinizada, ausência de deformidades ósseas, natureza fibrótica e motivação pelo paciente no controle do biofilme dentário. O objetivo desse trabalho foi relatar o caso de uma paciente que apresentou relação desarmônica entre o comprimento do dente (curto) e a linha do sorriso.

PERFIL GESTACIONAL DE ADOLESCENTES ATENDIDAS EM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE DE FERRER- MARANHÃO

GOMES, Rosangela Alves Moraes Gereissat*; AQUINO, Tiago da Conceição; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; SANTOS, Glauciane Lima dos; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e; SANTIAGO, Lilian Cassia Piedade

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: rosangela_gereissat@hotmail.com

A temática da gravidez na adolescência tem preocupado profissionais da saúde, assim como diferentes segmentos sociais. Entretanto, a maior parte dos estudos abordam as questões relacionadas ao sexo feminino, possivelmente, resultado na influência sociocultural, no qual a mulher é considerada a principal responsável pela gestação e cuidado com a criança. O presente estudo analisou o perfil gestacional de adolescentes atendidas em um Centro de Saúde do município de São Vicente Férrer - Maranhão. O grupo caso, composto por 43 adolescentes grávidas que procuraram o Centro de Saúde no período de janeiro a novembro de 2011. O estudo atual foi realizado pareado em pesquisa através de prontuários baseado em dados socioeconômicos, idade que começou a ter relação sexual, primeira gestação, motivação para a vida ativa sexual, dentre outros. Constatou-se que 58% eram solteiras com idade prevalente de 19 anos (32%), com iniciação sexual com 12 anos (9%). A gravidez foi planejada entre 28% das pesquisadas, no entanto, 72% não se sentem preparadas para serem mães. Daí a preocupação a saúde pública, visando a gravidez como um acidente em suas vidas e que a gravidez acontece principalmente por falta de conhecimento em educação sexual.

NORMAS INTERNACIONAIS DE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

JANSEN, Paulo Ricardo de Aguiar*; MOURA, Amanda Bezerra de Oliveira de; NETO, Osmar Araújo Portela; VIEIRA, Stefanny de Almeida; MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: amandynha_olyver@hotmail.com

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos (tabela I e II do Decreto- Lei n 15/93, e n. 1 do artigo 86,) tem de ser feita no modelo de receita médica aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro.

As receitas eletrônicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo ser impressa a indicação da respectiva via (1 via, 2 via e 3 via). Apenas podem ser prescritos em receitas renováveis, pôs medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração, ou seja, os medicamentos que constem da tabela 2 da Portaria n.1471/2004, de 21 de dezembro, na sua atual redação (Deliberação n.173/CD/2011, de 27 de outubro) Para que o processo de desmaterialização da receita seja possível, é obrigatório que a prescrição seja realizada On-line, ou seja, no momento da prescrição, os softwares têm de validar e registrar a receita de medicamentos no sistema central de prescrições, antes da sua emissão em papel. Só receitas validadas pelo sistema e registradas centralmente são consideradas receitas eletrônicas. A quando da desmaterialização, estas receitas ficam imediatamente visíveis para as farmácias. (INFRAMED, 2012) farmacêutico poderá prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo: medicamentos industrializados e preparações magistrais alopáticas ou dinamizadas; - plantas medicinais; drogas vegetais; - outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico.

PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)

LIMA, Leylanne Ribeiro Barros*; E COSTA, Hugo Costa; PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar; PASSOS, Thays Sousa Vasconcelos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: leylannebarros@hotmail.com

O Cirurgião Dentista tem como ofício a manutenção e o restabelecimento da saúde nos seres humanos, atuando no alívio e/ou remoção da dor, restabelecimento da estética, função e fonação. Para que possa intervir, seja com procedimentos preventivos ou curativos, deve ser capaz de identificar um estado de saúde e doença. A saúde tem sido definida como o perfeito e harmonioso bem-estar físico, mental social e espiritual, e não simplesmente a ausência de doenças. Em Odontologia existem diversas situações que podem referir dor ao paciente. Dentre as mais comuns estão as disfunções temporomandibulares (DTM) (VAROLI, et al., 2006). O tratamento de casos de DTM exige um conhecimento profundo da etiologia do problema. Fatores estruturais, funcionais e psicológicos parecem estar reunidos, determinando uma origem multifatorial (MELO, et al., 2011). O cirurgião-dentista deve possuir conhecimentos sobre farmacologia e terapêutica para uma prescrição adequada e racional. Desta forma este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre as principais classes de drogas utilizadas no controle da dor na DTM que incluem os analgésicos não opióides, analgésicos opióides, corticosteroides, ansiolíticos, antidepressivos, anestésicos locais, relaxantes musculares (SILVA, et al., 2011).

CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.

LIMA, Valéria*; OLIVEIRA, Rafaelle Caroline da Silva; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; FILHO, Etevaldo Matos Maia; AZEVEDO, Talita de Oliveira.; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: valerialima.fono@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a resistência adesiva entre cimento ortodôntico tradicional para colagem de bráquetes e cimento autoadesivo, avaliando em adição a influência da asperização na melhora da resistência adesiva, verificando o índice de adesivo remanescente com uso do cimento autoadesivo e sem ele. Trata-se de um estudo final realizado com 72 corpos de provas, divididos em (G1 e G2) e estes subdivididos em outros 4 (G1A, G1B, G2A e G2B). Utilizando cilindros rígidos de PVC para o preenchimento com resina acrílica, onde foi inserida resina composta nanoparticulada fotopolimerizável Filtek Z350 XT em incremento único, onde receberam profilaxia com pedra-pomes fina, água destilada e taça de borracha, antes da colagem dos acessórios ortodônticos. Realizados os testes de cisalhamento na máquina de ensaio universal EMIC, onde foi operada a uma velocidade de 0,5mm/min, utilizando célula de carga de 50Kg/f, logo após foi utilizada lupa Estereoscópica com aumento de 10 vezes para determinar o IAR, através dos escores preconizados que variaram de 1 a 5, para medir o grau de concordância entre os avaliadores para os valores de IAR. O resultado de 0.954 foi altamente significativo. Os resultados mostraram que o efeito do fator tratamento de superfície foi significativo na resistência de união, enquanto que, não houve diferença para os tipos de resinas, e para a interação resina X tratamento de superfície. Isso sugere que a resistência de união foi maior no grupo em não foi utilizada a asperização.

EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.

MENDES, Antoniel Matos*; ALMEIDA, Geandeson Oliveira; AMORIM, Wesley Wallace de Alcantara Araujo; COSTA, Ingrid Layane Paula da; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges, SAUAIA, Bismarck Ascar

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: grupodepesquisa2014@hotmail.com

O estudo das neoplasias vem despertando no campo acadêmico, pesquisas que possam minimizar agravos do paciente oncológico. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de células. (INCA, 2012). Para o tratamento com radioterapia, utilizam-se radiações para destruir um tumor

ou impedir a sua proliferação (INCA, 2012). Para o tratamento com quimioterapia, utiliza-se fármacos no combate ao crescimento celular desordenado. No transplante de medula óssea, para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue, consiste na substituição de uma medula óssea doente. (INCA, 2012). A partir da década de 70, a utilização de terapias alternativas, como o uso de fitoterápicos, popularizou, tendo sua adesão aumentada para aproximadamente 2 a 3% ao ano (SOUZA, 2004). As plantas *Annona muricata* L. e *Euphorbia tirucali* L, têm sido espécies utilizadas no Brasil frente ao tratamento de cânceres. A *A. muricata* possui dentro dos seus constituintes químicos, a acetogenina, esta capaz de provocar citotoxicidade em linhagens celulares de tumores humanos com seletividade para o adenocarcinoma do útero e ovário (KIM et al, 1998). Já a *E. tirucali* é uma espécie que apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante por conta das moléculas de flavonóides presentes em sua composição (SILVA; VARRICHIO, 2009). A associação dessas substâncias pode desencadear uma resposta imunoterápica, o que proporciona um efeito anti-tumoral. A importância desse tipo de abordagem leva em consideração o efeito de um tratamento menos agressivo, mas não diminuindo a sua eficácia.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.

SILVA, Tyara Dwan Silva*; MORAES, Laura dos Santos; VIANA, Tainara;
SANTOS, Vilianne; OLIVEIRA, Danielle; Coelho, Meire

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: waneskareis@yahoo.com.br

Resumo:

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), desde sua implantação contribuiu para a redução das desigualdades em saúde, e, representa o marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal e fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, favorecendo o acesso e atenção às demandas em saúde bucal da população brasileira. Considerando que a Política Nacional de Saúde Bucal constitui uma Estratégia Nacional para impactar a qualidade de vida, mediante mudanças na condição de saúde bucal da população, o presente estudo tem por objetivo descrever as contribuições e avanços advindos da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal. Trata-se de um estudo descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas somente publicações nacionais, com texto completo, escritas no idioma português. A literatura pesquisada evidencia que a reorganização da prática assistencial possibilitou a ampliação do acesso, a qualidade dos serviços, humanização das práticas em saúde, além de efetivar a integralidade dos serviços em saúde bucal, explicitando avanços significativos quando comparados ao contexto anterior das práticas assistenciais embasadas no modelo hegemônico de baixa complexidade e ações em saúde bucal voltadas em sua maioria para atenção curativa com forte tendência à mutilação e à exclusão social. A implantação da Política Nacional de Saúde Bucal reconhece a saúde bucal como um direito à cidadania e à qualidade de vida, integrando um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.

MENDES, Antoniel Matos*; ALMEIDA, Geandeson Oliveira; AMORIM, Wesley Wallace de Alcantara Araujo;
COSTA, Ingrid Layane Paula da; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges, SAUAIA, Bismarck Ascar

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: grupodepesquisa2014@hotmail.com

O estudo das neoplasias vem despertando no campo acadêmico, pesquisas que possam minimizar agravos do paciente oncológico. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de células. (INCA, 2012). Para o tratamento com radioterapia, utilizam-se radiações para destruir um tumor ou impedir a sua proliferação (INCA, 2012). Para o tratamento com quimioterapia, utiliza-se fármacos no combate ao crescimento celular desordenado. No transplante de medula óssea, para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue, consiste na substituição de uma medula óssea doente. (INCA, 2012). A partir da década de 70, a utilização de terapias alternativas, como o uso de fitoterápicos, popularizou, tendo sua adesão aumentada para aproximadamente 2 a 3% ao ano (SOUZA, 2004). As plantas *Annona muricata* L. e *Euphorbia tirucali* L, têm sido espécies utilizadas no Brasil frente ao tratamento de cânceres. A *A. muricata* possui dentro dos seus constituintes químicos, a

acetogenina, esta capaz de provocar citotoxicidade em linhagens celulares de tumores humanos com seletividade para o adenocarcinoma do útero e ovário (KIM et al, 1998). Já a E. tirucali é uma espécie que apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante por conta das moléculas de flavonóides presentes em sua composição (SILVA; VARRICHIO, 2009). A associação dessas substâncias pode desencadear uma resposta imunoterápica, o que proporciona um efeito anti-tumoral. A importância desse tipo de abordagem leva em consideração o efeito de um tratamento menos agressivo, mas não diminuindo a sua eficácia.

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

MORAES, Joelma da Cruz Paz*; MATOS, Mayane Machado¹; VIANA, Amanda²

*^{1,2}Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: joelmadacruz1992@hotmail.com

Nas últimas décadas foram realizados diversos levantamentos sobre incidência de cárie e doença periodontal na população brasileira, a fim de avaliar os principais grupos socioeconômicos afetados por essa epidemiologia para que fossem estabelecidos programas de promoção de saúde bucal. Com o intuito de analisar os pensamentos de diferentes autores sobre incidência de cárie e problemas periodontais em indivíduos de escolas públicas e sua relação com os níveis socioeconômicos, foi realizado um levantamento bibliográfico a partir de estudos publicados em forma de artigos e revistas. Este trabalho avalia qual a ligação das condições de saúde bucal com a situação social e econômica dos alunos com relação a incidência da doença cárie e problemas periodontais, buscando conhecer os efeitos das desigualdades para o acometimento dessas doenças. Observou-se, conforme a literatura, que os escolares com maior número de superfícies com experiência de cárie e problemas periodontais pertencem a famílias de grau de instrução e renda per capita baixa, caracterizando assim a ligação direta da má higiene bucal com as condições financeiras, falta de conhecimento e instruções à que certos grupos populacionais estão sujeitos. Conclui-se que é necessário um aprimoramento das políticas e programas de prevenção e promoção à saúde bucal baseando-se nos princípios de igualdade e equidade para que assim todos os grupos sociais tenham acesso às informações e serviços de higiene bucal e dessa forma os efeitos das desigualdades sociais sejam minimizadas.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.

MORAES, Laura dos Santos*; SILVA, Tyara Dwan Silva; VIANA, Tainara;

SANTOS, Vilianne ; OLIVEIRA, Danielle; Coelho, Meire

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: waneskareis@yahoo.com.br

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), desde sua implantação contribuiu para a redução das desigualdades em saúde, e, representa o marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal e fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, favorecendo o acesso e atenção às demandas em saúde bucal da população brasileira. Considerando que a Política Nacional de Saúde Bucal constitui uma Estratégia Nacional para impactar a qualidade de vida, mediante mudanças na condição de saúde bucal da população, o presente estudo tem por objetivo descrever as contribuições e avanços advindos da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal. Trata-se de um estudo descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas somente publicações nacionais, com texto completo, escritas no idioma português. A literatura pesquisada evidencia que a reorganização da prática assistencial possibilitou a ampliação do acesso, a qualidade dos serviços, humanização das práticas em saúde, além de efetivar a integralidade dos serviços em saúde bucal, explicitando avanços significativos quando comparados ao contexto anterior das práticas assistenciais embasadas no modelo hegemônico de baixa complexidade e ações em saúde bucal voltadas em sua maioria para atenção curativa com forte tendência à mutilação e à exclusão social. A implantação da Política Nacional de Saúde Bucal reconhece a saúde bucal como um direito à cidadania e à qualidade de vida, integrando um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

ESTUDO “in vitro” DA RESISTÊNCIA ADESIVA DO ESMALTE DECÍDUO, UTILIZANDO SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES E SUBMETIDOS À APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR.

NOLETO, Lawanne Ellen Carvalho*; FIROOZMAND, Leily Macedo ; GOMES, Isabella Azevedo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: lawannecarvalho@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência adesiva dos sistemas autocondicionantes sobre o esmalte decíduo após a aplicação tópica de flúor. Foram empregados 40 molares e 40 incisivos decíduos. Cada grupo de dentes foi dividido em quatro grupos experimentais: SAC-C: (controle) sistema autocondicionante Clearfil SE Bond (Kuraray) sem tratamento do esmalte; SAC-F: sistema autocondicionante Clearfil SE Bond (Kuraray) com prévio tratamento do esmalte (FFA 1,23%, 1 min); SC-C: sistema adesivo convencional Adper Single Bond 2 (3M) sem tratamento do esmalte; SC-F: sistema adesivo convencional AdperSingle Bond 2 (3M) com prévio tratamento do esmalte (FFA1,23%,1 min). Os corpos-de-prova foram confeccionados utilizando a resina composta Filtek Z250(3M), e armazenados em água destilada ($37\pm 1^{\circ}\text{C}$), por 24h. O teste de microcisalhamento foi realizado utilizando a máquina de ensaio universal EMIC DL 2000. Os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney foram empregados para comparar os valores de resistência adesiva e índice de adesivo remanescente, revelando que a prévia aplicação do FFA 1,23% promoveu redução estatisticamente significativa da resistência adesiva, tanto quando utilizado o SC bem como SAC. Analisando apenas o SAC e SC não foi observada diferença estatística significativa quando utilizado sobre o mesmo grupo de dentes decíduos. Porém, avaliando o tipo de dente, observou-se que para SAC o esmalte de incisivos decíduos apresentou valores reduzidos de resistência adesiva em relação aos molares, para SC esta diferença não foi observada. Concluiu-se que a aplicação prévia do FFA 1,23%, o tipo de dente (molar/incisivo) interfere na resistência adesiva quando empregados sistemas adesivos convencionais e autocondicionantes.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS

PRAZERES, Raissa Silva*; SANTOS, Aline Adelaide Rodrigues dos; COSTA, Cyrene Piazero Silva

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: ramom.m.aguiar@hotmail.com

O autismo é caracterizado por comportamentos persistentes nas interações sociais recíprocas, desvios na comunicação e padrões comportamentais restritos e estereotipados, de etiologia desconhecida. Os pacientes autistas apresentam níveis de higiene oral insatisfatória, devido as dificuldades na execução, pois apresentam alterações de coordenação e pouca cooperação para realizações de tarefas, a mesma também é influenciada pela dieta cariogênica e uso de medicamentos xerostomogênicos. A higiene oral de um autista é geralmente negligenciada devido a preocupação da família relacionada diretamente a doença. A incidência dessa desordem é relativamente alta e isso faz importante o conhecimento do cirurgião-dentista das suas características, limitações e possíveis implicações no tratamento odontológico, pois as alterações comportamentais é um importante complicador no atendimento pela dificuldade da realização de exames e tratamento. Por esses motivos, o cirurgião-dentista tem que utilizar estratégias que facilite a abordagem e atendimento desse paciente, dentre eles, o Programa Son Rise, tornando esse momento mais prazeroso e inovador. O Programa Son Rise é centrado na pessoa com autismo, isto significa que o tratamento parte do desenvolvimento inicial de uma profunda compreensão e genuína apreciação da pessoa, de como ela se comporta, interage e se comunica, assim como de seus interesses. Este é um método lúdico, de abordagem relacional, que incentiva os pais e terapeutas a observar as preferências dos autistas e usá-las como recursos de aprendizagem, favorecendo, conseqüentemente o desenvolvimento social, emocional e cognitivo desses indivíduos. Para que haja sucesso no atendimento de pacientes autistas é necessário conhecimento da técnica por parte do cirurgião-dentista.

EXAME DE URINA COMO FERRAMENTA LABORATORIAL PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA

RAMOS, Gabriela Cateb*; DE ARRUDA, Bárbara Gomes Alencar; LOBATO, Luís Felipe Lima; OLIVEIRA, Jéssica Jansen; PACHÉCO, Wallace Borges; DA ROCHA, Marla Raquel Pontes

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: gabrielacateb3@gmail.com

As infecções do trato urinário (ITU) possuem um aspecto clínico amplo, ou seja, atingem ambos os sexos e as mais variadas faixas etárias, no qual se situam entre as infecções bacterianas mais recorrentes. Dentre os principais agentes etiológicos estão incluídas as espécies: *Escherichia coli*, *Staphylococcus saprophyticus* e *Enterococcus faecalis* (STAMM, 2006). Para a elaboração de um diagnóstico preciso de ITU, é necessária a associação entre as manifestações clínicas e os testes laboratoriais (LOPES; TAVARES, 2005). Considerando os exames laboratoriais, os exames de urina, tipo I e II são os comumente realizados como auxílio diagnóstico frente as ITU (KOCK; ZUCCOLOTTI, 2003). A urinálise (tipo I) consiste na análise física, química e microscópica da urina, que proporciona por meio destas características uma associação com as manifestações clínicas do paciente, como também em casos de pacientes assintomáticos (SROUGI, 2005). A urocultura (tipo II) baseia-se na cultura da urina, identificando o agente etiológico (análise qualitativa) e a proporção da bactéria presente (análise quantitativa), capaz de fornecer um direcionamento diante da terapêutica aplicada (HEILBERG; SCHOR, 2003). O fator limitante da importância do exame de urina refere-se ao tipo II (urocultura), em virtude da demora habitual para obtenção do resultado, contudo de grande relevância para o monitoramento da eficácia frente a antibioticoterapia aplicada.

ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES DO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E RESINA COMPOSTA E CASO CLÍNICO

RÊGO, Camilla Bringel*; LEITE, Hadda Lizandra Austríaco*; RODRIGUES, Maria Giuliane Silva*; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: camillabringel@live.com

Neste trabalho mostraremos a comparação do ionômero de vidro restaurador com a resina composta, assim como o uso associado dos mesmos, visando agrupar suas propriedades positivas diante de um caso clínico de restauração classe V que exige menos sensibilidade e maior longevidade. É de suma importância que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento científico das propriedades dos materiais odontológicos, assim como o desempenho e a interação dos mesmos com os tecidos biológicos, tornando-os aptos a discernir o material específico para cada circunstância e a possibilidade do uso combinado dos materiais.

TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS

ROCHA, Adrícylla Teixeira; BANDECA, Matheus Coelho; BARRETO, Samuel Benson Lima; GONÇALVES, Letícia Machado; LAHMA, Ana Paula Soares Fernandes; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: adricyla.tr@outlook.com

A toxina botulínica tem sua ação mais ampla e divulgada na dermatologia/estética, apesar de sua principal aplicação ser voltada ao uso terapêutico. É amplamente conhecida por seu uso cosmético ser feito em injeções intramusculares para redução defeitos faciais. O histórico de sua utilização foi iniciado por Scott e cols. em 1973 com seu uso terapêutico em primatas, a partir daí a toxina foi introduzida como um agente terapêutico no tratamento de estrabismo, em meados de 1980. Desde então, sua atuação foi ampliada para diversos campos. Na Odontologia, a toxina botulínica pode ser usada em várias situações para a melhoria de tratamentos como disfunções e dores na articulação têmporo-mandibular, apertamento dental, Bruxismo (ranger de dentes), dores de cabeça de origem dentária, sorriso gengival, paralisia do nervo facial, entre outras, sem consequências indesejáveis, desde que manuseada de forma correta. Deve-se ressaltar que o uso dessa toxina depende do seu correto conhecimento sobre sua utilização, treinamento específico e que não extrapole suas funções. Destaca-se que devido a toxicidade da toxina botulínica ser alta, sempre deve ser utilizada por profissionais capacitados. Este estudo tem como objetivo, revisar a literatura e descrever por meio desta, como o profissional odontológico poderá incluir a toxina botulínica em sua rotina clínica, por este possuir conhecimento sobre as estruturas da cabeça e pescoço.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM NEFROLOGIA: PROMOVENDO BEM-ESTAR A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.

ROCHA, Jeffther Felipe Lima*; AMORIM, Carla Pereira; MARTINS, Ana Carla Privado; SILVA, Jéssica Cecília Costa da; MACHADO, Patrícia Maria Abreu; FARIA, Simony de Sousa

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: jeffther.felipe@yahoo.com.br

O presente trabalho visa discutir a atuação do psicólogo hospitalar na área de Nefrologia. Seja pela irreversibilidade das patologias nefrológicas, seja pelas implicações psicossociais, a atuação do profissional da Psicologia se faz imprescindível. O trabalho foca especialmente em pacientes com insuficiência renal crônica (principal doença com que os nefrologistas se deparam), e paciente em processo de hemodiálise (tratamento comum aos que possuem IRC). Constata-se, pela revisão teórica, que o paciente com insuficiência renal crônica, submetido ao processo de hemodiálise, enfrenta várias perdas, não apenas no que tange ao orgânico, mas nos âmbitos social, econômico e emocional. Assim, a atuação do psicólogo visa à reestruturação psíquica do paciente, à manutenção e adaptabilidade ao tratamento bem como, ao trabalho com os familiares e a equipe de saúde, preparando-os também para o processo de hospitalização e cronicidade da doença.

EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS

SANTOS, Sara Freitas*; COSTA, Luzia Mayanne Oliveira; COELHO, Matheus Bandeca; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramjln@hotmail.com

As limas de níquel-titânio são, atualmente, objeto de vários estudos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa Protaper quanto capacidade de modelar, de preservação da curvatura original e o transporte apical em canais radiculares curvos simulados. Trinta canais radiculares simulados em blocos de resina foram selecionados e divididos aleatoriamente em três grupos (n=10) e preparados utilizando os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa do sistema Protaper. Fotografias padronizadas foram realizadas antes e após a instrumentação dos canais. Após a superposição das imagens, a quantidade de resina removida, tanto da parede interna como da parede externa, assim como, os ângulos de máxima curvatura do canal, antes e após a instrumentação e o transporte do canal radicular foram medidos. Foi aplicado o teste Anova One-way para avaliar se havia diferença das áreas desgastadas internas, externas, total e do transporte do forame entre os grupos. O grupo Reciproc obteve maiores valores de desgaste da parte interna, a UnicOne desgastou de forma semelhante as áreas interna e externa. A Protaper atingiu os maiores valores em relação ao transporte do canal radicular. Todos os instrumentos foram seguros e capazes de manter a curvatura original do canal radicular, no entanto, os instrumentos UnicOne produziram formas mais conservadoras.

O PSICÓLOGO ESCOLAR E UMA PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL. PROMOVENDO A CONGRUÊNCIA, LOGO, A SAÚDE PSICOLÓGICA

SANTOS, Carla*; LEAL, Carlos Santos

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: c-leal1@hotmail.com

O conceito de vocação que se propõe, trata-se do conceito citado por Marinho-Araújo (2013): a vocação de encontrar ou criar sentidos de vida. Declara que por trás da busca de uma profissão, está a busca do sentido. Todos são chamados a fazer algo da existência. Todos têm vocação! Entende-se por vocação o chamado a ser pessoa. Há muitos caminhos e a profissão é um deles. A vocação de caráter amplo adotada neste trabalho, se identifica com a perspectiva de Andrade, Meira e Vasconcelos (2002) para os quais para a OV cumprir com sua real finalidade, deve ser operacionalizada de maneira coerente, informando sobre as carreiras profissionais e promovendo o autoconhecimento. Na facilitação da escolha profissional, a OV deve ajudar a formar cidadão em seu sentido pleno, pois ajuda a encontrar uma identidade profissional, auxilia a estruturar uma identidade pessoal, possibilitando a elaboração de um projeto de vida de responsável e consciente. Nesse

sentido, mais do que escolher uma profissão, a OV auxiliaria a adaptar-se à vida. Encontrando ressonância da importância desse aspecto no CFP (2000 apud CARVALHO, 2008), pois para ele a escolha profissional não é um momento estático no desenvolvimento de um indivíduo, pelo contrário, é um comportamento que se inclui num processo contínuo de mudança da personalidade. Afirmando quão importantes é que se trabalhe para que o jovem compreenda-se como um ser em movimento que pode mudar seus interesses e possibilidades no decorrer da vida.

FACETAS DIRETAS

SANTOS, Sara Freitas*; ALMEIDA, Karoline Guará Brusaca

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramjln@hotmail.com

Tendo em vista a evolução da odontologia adesiva e dos materiais restauradores diretos, tornou-se possível desenvolver técnicas reabilitadoras mais eficientes, de rápida resolutividade, baixo custo e de boa longevidade, como soluções estéticas para corrigir anomalias dentárias de cor, textura, forma, tamanho e posição. Por requerer pouco ou até mesmo nenhum desgaste de tecido dentário, esse tipo de procedimento representa uma alternativa restauradora mais conservadora. O trabalho tem por objetivo demonstrar a eficácia dessa técnica, bem como evidenciar que o resultado final é satisfatório, natural e harmonioso. Para a confecção das facetas diretas, o profissional, além de estabelecer um correto diagnóstico e traçar um plano de tratamento, deve também possuir conhecimento teórico, experiência clínica, habilidade manual e sensibilidade na escolha de resinas que criem o policromatismo da estrutura dental. Ao realizar restaurações estéticas, o profissional deve sempre levar em consideração a preservação da estrutura dental sadia, primar pela odontologia restauradora atual, pela obtenção da harmonia do sorriso e pela plena satisfação do paciente.

INCIDÊNCIA DE CÂNCER EM SÃO LUÍS – MA: ESTIMATIVA PARA 2014

SANTOS, Mayara Gomes*; SANTOS, Gedyanne Máylla Aguiar; CÂMARA, Thalita de Albuquerque Vêras

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: mayaragomessantos@hotmail.com

No mundo, ainda são relativamente poucos os estudos sobre a incidência e mortalidade por câncer em adultos. Foi realizado pelo Instituto Nacional de Câncer um estudo descritivo da incidência da morbidade e da mortalidade do câncer no Brasil para 2014. O objetivo principal do presente estudo é destacar os dados referentes ao estado do Maranhão e na capital São Luís, onde observou-se o câncer de próstata como predominante em homens e o câncer de mama nas mulheres. No Brasil, estima-se um total de 68.800 casos novos de câncer de próstata, no Maranhão 80 novos casos para 100 mil habitantes e 57.120 casos novos de câncer de mama, no Maranhão estima-se um total de 40 novos casos de câncer de mama feminino para cada 100 mil habitantes, sendo 30 casos na capital São Luís. Em conjunto, os resultados apresentados retratam um padrão epidemiológico de câncer no Brasil, evidenciando o estado do Maranhão e sua capital São Luís que apresentam características regionais de distribuição semelhantes ao restante do país. As estimativas apresentadas são mais uma ferramenta importante para o desenvolvimento do sistema de vigilância do câncer, que tem como grande desafio colocar em prática o uso dessas informações e o conhecimento da realidade do país, para que as necessidades da população sejam priorizadas e atendidas pela política pública de saúde, conforme preconizado no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil pelo Ministério da Saúde.

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DO ÍNDIO

SENA, Pacitta R. A. de*; KERBER, Giselle Dutra; OLIVEIRA, Abrahão Limeira de.

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: cittapa@gmail.com

O presente trabalho se fundamenta nos estudos de Alimentação e Nutrição Indígena Brasileira. A OMS preconiza indicadores de estado nutricional de grupos populacionais, o crescimento físico, as transições epidemiológicas, a renda para aquisição de alimentos e a salubridade ambiente. O atendimento à saúde na forma de prevenção e tratamento de suas enfermidades e a redistribuição de renda são fatores que auxiliam na identificação do perfil nutricional de grupos específicos

que se inserem na população brasileira e que durante as últimas décadas, são avaliados de forma incompleta dentro de suas especificidades. Foi realizado levantamento bibliográfico com o objetivo de fundamentação teórica. Encontraram-se publicações de avaliações antropométricas, antropológicas e socioeconômicas de populações indígenas de Rondônia- etnia Suruí, de Pernambuco-etnia Yorubá, Rio Grande do Sul-Kaingang e Guarani e Paraná-etnia Kaingang em formas de artigos, tese e documentos de estudos em saúde do índio. Os documentos mais abrangentes ainda assim limitados ao tempo de realização: transversais e as poucas etnias analisadas. As amostras de indivíduos variavam entre 48 e 146 e o detalhamento do ponto de vista demográfico com respeito a morbidade e epidemias. Conclui-se que o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil é muito pouco conhecido, decorrente da escassez de investigações, ausência de censos, de outros inquéritos regulares e da falta de precisão do sistema de registro de informações sobre morbidade, mortalidade e cobertura vacinal (Coimbra Jr & Santos, 2000).

LAMINADOS CERÂMICOS COMO UMA OPÇÃO CONSERVADORA

SILVA, Mônica Barros*; BARROS, Laysa da Cunha1; MARIZ, Dêbora2; MOUCHREK, Adriana3; Sâmara4

*1,2,3,4 Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: nicabs_@hotmail.com

A Odontologia estética tem tomado proporções maiores com a disseminação desenfreada de um novo paradigma de beleza nos meios de comunicação, que se traduz em dentes claros e alinhados. Isso tem ocorrido graças às novas tecnologias embutidas aos materiais, mais precisamente às cerâmicas e aos materiais resinosos, garantindo maior resistência ao material e forte união do laminado ao dente. Essas características possibilitam a adoção de técnicas mais conservadoras, que exigem uma menor espessura de cerâmica para uma mesma resistência requerida e permitem formação de uma estrutura extremamente resistente. Porém, diante de todas essas vantagens, os laminados cerâmicos não são indicados para todos os casos, sendo necessário prévio planejamento do caso e averiguação da possibilidade de uso da técnica. Se verificada viabilidade, o importante para que haja sucesso no tratamento é dar o valor merecido a todas as etapas do planejamento, pois o bom resultado sucede disso. O objetivo desse estudo foi discutir através de revisão de literatura aspectos cruciais da técnica, como a quantidade de desgaste necessário e o tipo deste, a eficiência da união cerâmica-substrato, os tipos de cerâmicas utilizados e as indicações e contraindicações da técnica. Concluiu-se que ainda não existe um protocolo a ser seguido relacionado à quantidade de desgaste dentário, mas sabe-se que deve estar restrito ao esmalte, objetivando a união forte e duradoura; a cerâmica possui alta resistência, porém está contraindicada em alguns casos específicos; as cerâmicas utilizadas com muito bons resultados estéticos são as feldspáticas e as compostas por dissilicato de lítio.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE ARDÊNCIA BUCAL

SILVA, Glahudson Henrique de Lucena*; COSTA, Victor Gomes; MAIA, Livia Maria Pereira; CALDAS, Bruno Oliveira;

LEMOS, Marcony Araújo; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: victorgomes.vgc@hotmail.com

A Síndrome da ardência bucal é caracterizada como uma queimação bucal que conseqüentemente vem acompanhado de outros sintomas como: dor, sensação de boca seca, irritação e entre outros. Acomete frequentemente pessoas idosas, e de meia idade, principalmente mulheres no período pós-menopausa. Por não apresentar sinais aparentes como lesões na mucosa bucal associados aos sintomas, encontra-se a dificuldade de um diagnóstico mais preciso de acordo com a presença dos demais fatores, assim sendo, a presença de lesões seria um dos sinais para a exclusão do diagnóstico da síndrome, sendo necessário também traçar um perfil psicológico do paciente. Existem diagnósticos diferenciais que podem ser confundidos com SAB, como: fatores nutricionais, falta de vitaminas A, C, B12, hipossalivação e síndrome da seca, além da candidíase, que esta relacionada a síndrome desta, por que invade a mucosa oral e induz no processo inflamatório chegando uma sensação de queimação. Pode-se citar que a área mais afetada da síndrome é a língua. Contudo é de responsabilidade do cirurgião dentista saber identificar, avaliar disfunções sistêmicas e psicológicas, para poder orientar seu paciente na escolha do melhor tratamento, pois deverá analisa-lo como um todo e não somente pela alteração bucal.

ENDOCARDITE INFECCIOSA: DESMISTIFICANDO TABUS

SILVA, Fabiola Ayanne Costa*; CARVALHO, Ceci; STANLEY, Reidson; MEDEIROS, João; PINZAN, Célia; ROCHA, Adrícylla Teixeira; GURGEL, Julio

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: adricylla.tr@outlook.com

A Endocardite infecciosa é uma patologia que se instala no tecido de revestimento interno do coração, abrangendo as válvulas cardíacas, pulmonares e a aórtica. É causada por uma bacteremia transitória associada a uma lesão prévia das válvulas ou do tecido cardíaco e acarreta risco de vida ao paciente. Embora seja incomum, pode resultar em alta morbidade e mortalidade. Pode ser causada por vários microrganismos que estão presentes na cavidade bucal compondo a microbiota complementar. A prevenção desta entidade patológica deve ser considerada de extrema importância pela classe odontológica. Todos os pacientes que sejam de risco para a endocardite infecciosa devem manter a saúde bucal no mais alto nível, com atenção aos portadores de doenças inflamatórias que possam dar origem a bacteremias. A partir de uma revisão da literatura, o presente trabalho busca trazer informações sobre a etiologia microbiana, fatores e condições de risco, assim como a antibioticoterapia profilática relacionada aos procedimentos odontológicos. O conhecimento da referida patologia e a aptidão em intervir de maneira correta é essencial para a atuação segura do Cirurgião-dentista.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSAO DE ALUNOS SURDOS BILINGUES DO ENSINO MEDIO

SILVA, Joadson Matias da*; MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro; LIMA, Michele de Fátima Ferreira; FAÇANHA, Rachel Costa
Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: jofono2014@outlook.com

Este estudo teve por objetivo analisar a competência de palavras de alunos surdos da 1ª a 2ª série do ensino médio, bem como descrever as estratégias de mediação utilizadas nestas tarefas, por profissionais falantes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada no Atendimento Educacional Especializado (AEE) da escola que utiliza o Bilinguismo como referencial filosófico. Participaram onze alunos, estudantes do ensino médio. A coleta de dados foi realizada com os alunos, na presença de dois mediadores, uma fonoaudióloga e um tradutor intérprete de Libras. A análise dos dados mostra que 8 (oito) alunos realizaram a leitura através da rota lexical e 3 (três) através da rota fonológica. Todas tiveram mais dificuldade na compreensão de palavras de baixa frequência. As oito crianças que leem através da rota lexical alcançaram uma compreensão apenas parcial do livro e, por meio da mediação, conseguiram alcançar os conteúdos explícito e implícito do texto. A mediação em Língua Portuguesa não foi suficiente para este propósito, sendo essencial a mediação em LIBRAS. Os três alunos que ainda leem através da rota fonológica apresentaram mais dificuldades na compreensão do livro e, mesmo com mediação nos dois idiomas, alcançaram apenas parcialmente o significado da história. Todas as estratégias de mediação analisadas foram utilizadas pelos dois profissionais, sendo estas: perguntas eliciadoras de clarificação, perguntas eliciadoras de orientação, pergunta provocativa, intervenção através de estratégia ascendente/ descendente, pergunta reformulada, regulação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e ativação de conhecimento de mundo.

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NOS RESULTADOS DOS EXAMES DO COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA EM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DJALMA MARQUES

SILVA, Ícaro Morais de Oliveira*; NUNES, Joana Katya Vêras Rodrigues Sampaio; SILVA, Flor de Maria Araújo Mendonça

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: icarotes@hotmail.com

A neoplasia maligna do colo do útero é um grave problema de saúde pública para mulheres de países em desenvolvimento, sendo o primeiro ou segundo câncer ginecológico mais comum (INCA, 2012). Atualmente, existem grandes dificuldades encontradas pelas pacientes para realização do exame e acompanhamento do seu diagnóstico na rede pública, que estão relacionados diretamente ao baixo nível sócio-econômico. O objetivo geral foi implementar estratégias no processo diagnóstico da Colpocitologia Oncótica no Centro de Saúde Djalma Marques.

REMODELAÇÃO NA INTERFACE OSSO IMPLANTE

SILVA, Fabíola Ayane Costa*; ALBINO, Laila da Veíga.; ARAUJO, Osmar Neto; GONÇALVES, Antonia Cláudia; SILVA, Jéssica Karla Silva.; TAVARES, Rudys Rodolfo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: fafa_ayane@hotmail.com

Os implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionados cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir raízes dentárias. Antes da colocação de qualquer implante é de suma importância o conhecimento do profissional em relação à estrutura óssea à qual será colocado o implante e também a sequência do processo de remodelação óssea.

CLAREAMENTO INTERNO - RISCOS E BENEFÍCIOS

SOARES, Felipe Simões*; FILHO, José Reinaldo Pereira Reis; SOUSA, Waltonne Silva; GOMES, Isabella Azevedo; MAIA, Marina de Figueiredo Lopes

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: felipe_simoes17@hotmail.com

Atualmente o valor estético tem se tornado um dos principais fatores motivadores para uma busca por tratamento odontológico. Levando em consideração a importância de um sorriso dentro de uma estética facial, é justificável a preocupação acerca da pigmentação de dentes, principalmente os dentes anteriores e algumas vezes os pré-molares. Isso motivou o desenvolvimento de técnicas e materiais que proporcionem um resultado satisfatório na busca por um sorriso harmonioso pelo paciente. No passado os dentes que tinham alguma alteração de cor sofriam desgastes, para que em seguida, fossem restaurados através de procedimentos restauradores diretos ou indiretos. Não raramente os dentes não vitais sofrem algum tipo de alteração na coloração, geralmente devido a: materiais restauradores, hemorragia intracoronária, decomposição de detritos intrapulpare, medicamentos intracanal e materiais obturadores. Os resíduos formados nesses processos podem penetrar através dos túbulos dentinários, resultando na descoloração dental. As substâncias utilizadas para o clareamento são: peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida e o perborato de sódio. Estes agentes clareadores atuam na mancha através de reações de oxidação. Quando observado a indicação para este tipo de tratamento e tomado os cuidados básicos para a sua realização, o clareamento dental interno é um passo da terapia odontológica simples e de resultados controlados, possibilitando confiança e conforto para o paciente que busca um perfil estético capaz de alterar significativamente a sua autoestima. Este trabalho visa esclarecer, através de uma revisão de literatura, este tipo de tratamento, bem como as substâncias utilizadas, os cuidados necessários e os riscos decorrentes de sua realização.

UTILIZAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO E PLACAS E PARAFUSOS REABSORVÍVEIS EM ODONTOLOGIA

SOUSA, Albert Alexandre Costa de*; COSTA, Iasmin Lima*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: Albertalexandre@hotmail.com

Nos últimos anos, o tratamento de fraturas do complexo bucomaxilofacial evoluiu bastante, principalmente após o advento de técnicas de fixação interna rígida e desenvolvimento de novos materiais. Destaca-se nesse contexto, a utilização de matérias reabsorvíveis, os quais apresentam algumas vantagens sobre os dispositivos metálicos, especialmente quando utilizados em população pediátrica. O titânio, muito difundido nos últimos 25 anos é, todavia, mais viável financeiramente e apresenta características físicas e biológicas que ainda o mantém como principal escolha na fixação de segmentos fraturados ou osteomizados. Neste contexto, o nosso trabalho apresenta uma revisão de literatura trazendo uma comparação entre as características de cada material, tais quais se traduzem em vantagens e desvantagens dos materiais reabsorvíveis ou metálicos, tal como as indicações de forma específica e pontual para as placas de titânio.

A INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DO DISCO ARTICULAR NA DINÂMICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

SOUZA, Wenny Karolliny Moreira*; FERREIRA, João Thalison Aire; FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros; SILVEIRA, Luiza Carneiro; CORREA, Silvan

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: wenny.moreira@hotmail.com

A articulação temporomandibular (ATM) pode ser considerada uma das mais complexas do organismo humano, pois é a única que executa onze tipos de movimentos e ainda é rica em células mesenquimatosas, que garantem seu poder regenerativo. O disco articular compõe a ATM juntamente com a cápsula, a cabeça da mandíbula, fossa mandibular e eminência articular, que ainda possui em seu interior o líquido sinovial ou sinóvia, que é essencial para lubrificação e nutrição da articulação. O posicionamento adequado do disco é de grande importância para a morfofisiologia apropriada da ATM, visto que as alterações do mesmo são consideradas uma importante causa da disfunção temporomandibular (DTM), que pode ser caracterizada por dor facial, estalidos, crepitações, disfunções e etc. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo realizar estudo através de uma revisão literária especializada nacional e internacional, utilizando artigos e periódicos para avaliar a morfologia e as possíveis desordens do disco articular, sua localização e importância na articulação temporomandibular.

TERAPIA PULPAR EM DENTES DECÍDUOS: POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS E MATERIAIS OBTURADORES

TORRES, Mirna Karolline Lima*; LIMA, Ana Carolina Costa de; DANTAS, Rossana Vanessa

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: mirna.lima@hotmail.com

A terapia pulpar em dentes é uma das especializações de odontopediatria que aborda aspectos referentes ao diagnóstico e tratamento desses dentes, dando ênfase aos materiais obturadores utilizados e aos tipos de procedimentos utilizados por cirurgiões dentistas em Imperatriz. Objetivo: Identificamos as principais terapias eficazes e duradouras em dentes decíduos. Metodologia: As pesquisas de campo foram realizadas na cidade de Imperatriz, de forma conveniente, com o objetivo de selecionar profissionais conhecedores em tratamentos pulpares. Uma das formas utilizadas foram os questionários quantitativos (percentuais), tanto na rede pública quanto na privada, como forma de avaliar a frequência dessas terapias e das pastas obturadoras e realizou-se um teste piloto com 10% da amostra, para ajuste do questionário e os procedimentos as terapias pulpares em dentes decíduos. Os dados obtidos foram tabulados e analisados estatisticamente através do software Excel. Conclusão: Os CD's entrevistados utilizam várias técnicas de terapia pulpar em dentes decíduos, destacando-se o hidróxido de cálcio como a pasta obturada mais utilizada, porém o sucesso deste tratamento se mostrou insatisfatório, reforçando a necessidade de métodos adicionais no tratamento desta alteração.

INFLUÊNCIAS DA CULINÁRIA MARANHENSE E SEUS PRINCIPAIS PRATOS

XEREZ, Nayana de Paiva Fontenelle*; HORTEGAL, Elane Viana; MOURA, Daniela Alves; SOARES, Bárbara Costa; TEIXEIRA, Joelma Ximenes Prado; ROCHA, Marina Souza

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: nayana.fontenelle@bol.com.br

A culinária maranhense sofreu influência de demasiadas culturas: francesa, holandesa, portuguesa, indígena e africana. A gastronomia francesa marcou muito o local, mas a portuguesa e indígena são as mais predominantes. Os costumes indígenas deixaram marcas indelévels na nossa população cabocla que ainda hoje usa técnicas de seus antepassados silvícolas, como, no tratamento das comidas assadas e moqueadas. A colonização portuguesa deu-nos a tradição de sua opulenta cozinha, o gosto pelas carnes, ovos, cebola, alho, os cheiros, o cominho, as conservas, os caldos, banha de porco, a manteiga e os famosos doces conventuais. O objetivo do estudo foi identificar pratos típicos

Maranhenses mais servidos e descobrir suas principais influências históricas. Tratou-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de revisão literária e com aspectos quantitativos, dividido em três etapas: levantamento bibliográfico, coleta de dados e análise de preparações mais servidas. As preparações foram catalogadas em livros de culinária regional, selecionando os pratos típicos mais comuns entre as preparações salgadas e doces, que apresentaram modo de preparo. As preparações que não apareceram em mais de três referências não foram incluídas na pesquisa. Como resultados, foram verificadas 48 preparações, desses 12 pratos doces, equivalentes de sobremesa, 2 preparações equivalentes de pão, 8 preparações equivalentes de arroz, 6 equivalentes de guarnição, 18 equivalentes de carne e 1 equivalente de legumes e hortaliças. Conclui-se que a mistura de elementos afro-indígenas e portugueses tornou a culinária maranhense eclética e saborosa e o conhecimento da cultura alimentar de um povo possibilita o entendimento da construção de sua história.

PERFIL DOS INDIVÍDUOS QUE BUSCAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “AMAR”.

VERAS, Nicole Paiva*; FERREIRA, Ana Cláudia Meire Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: npaivaveras@gmail.com

A Diabetes Mellitus é um sério problema de saúde na atualidade, pois interfere no modo de vida do indivíduo acometido. Esta doença pode ser associada com outras condições sistêmicas e locais que fazem dela uma prioridade no programa de atenção básica no Brasil. Existem basicamente 10 tipos de diabetes. As mais comuns são a Diabetes Mellitus tipo 1 (autoimune), Diabetes Mellitus Tipo 2 (geralmente hereditária), Diabetes Gestacional (desenvolve-se durante a gravidez) e a Diabetes Insipidus (não provoca mudanças na quantidade de açúcar no sangue). O Protocolo de Diagnóstico e Acompanhamento de Pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 2 em Serviços de Atenção Primária à Saúde, do Serviço de Saúde Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) relata que em uma equipe de Atenção Primária à Saúde, todos os profissionais deverão estar aptos a identificar a DM e também devem conhecer o protocolo da doença. Dentre estes, cita-se o dentista, que pode atuar em equipes de saúde multidisciplinares, desenvolvendo atividades de promoção e educação em saúde que contemplem simultaneamente a saúde integral de indivíduos e coletividades, proporcionará uma elevação dos níveis de saúde da população. O atendimento interdisciplinar envolvendo profissionais da mesma unidade de saúde e a atenção em todos os níveis do sistema são fatores essenciais para a integralidade das ações em saúde no atendimento ao indivíduo com Diabetes Mellitus.

REMODELAÇÃO DE INTERFACE OSSO-IMPLANTE

ALBINO, Laíla da Veiga*; SILVA, Jessica Karla Silva; SILVA, Fabiola Ayane Costa; SILVA, Antônia Claudia Gonçalves

Orientador: RUDYS

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: laila.albino@hotmail.com

Os implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionados cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir raízes dentárias.

Antes da colocação de qualquer implante é de suma importância o conhecimento do profissional em relação à estrutura óssea à qual será colocado o implante e também a sequência do processo de remodelação óssea.

O nosso organismo tem células que são específicas para o processo de formação óssea. As células mesenquimais indiferenciadas, que se diferenciam em células progenitoras ósseas que evoluem e se transformam em osteoblastos, os osteócitos que são os osteoblastos maduros e os osteoclastos, células multinucleadas responsáveis pela reabsorção óssea. A ação destas células para formação óssea se dá pelo processo conhecido como osteogênese. No decorrer de nossas vidas estamos sujeitos aos processos de modelação e remodelação óssea. Sendo a modelação resultado da alteração da forma e do tamanho do osso, tendo locais independentes de formação e reabsorção, e a remodelação refere-se as ações conjuntas e sequenciais dos osteoblastos e osteoclastos que removem osso envelhecido e substituem por um novo tecido ósseo.

Além do conhecimento sobre o tecido ósseo e seus processos, há fatores que estão intimamente relacionados à remodelação: a idade, a saúde do paciente. Quanto ao implante: biocompatibilidade, forma do implante, superfície e os princípios cirúrgicos e protéticos.

As medidas sugeridas relacionam-se à remodelação óssea após a inserção do implante, no intuito de se obter o sucesso.

INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRADE, Elaine Pereira*; ALVES, Thaís Costa; E Cordeiro, Sandra Komarsson Carvalho

Curso: medicina

Categoria: graduação

Email: thais_costalves@hotmail.com

Resumo: O PET Saúde tem como propósito a educação pelo trabalho, configurando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, tendo como enfoque o reconhecimento das necessidades dos serviços oferecidos pelo SUS como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. Este trabalho objetivou relatar a experiência de acadêmicas de Medicina da Universidade Ceuma, no desenvolvimento de atividades realizadas na atenção básica. Trata-se de um relato de experiência proporcionado pelo programa PET/Saúde, na UBS Nazaré Neiva do município de São Luís, durante o período de abril a maio de 2014. Percebeu-se através da aplicação de questionários com foco na saúde da gestante e da criança e elaboração de um portfólio contemplando informações a cerca da Superintendência de Educação em Saúde do Município de São Luís, que essas atividades possibilitaram as estudantes uma visão aprofundada a cerca da realidade de gestantes e crianças usuárias dos serviços de saúde oferecidos pela ESF, o que ampliou o conhecimento social, sanitário e epidemiológico dos envolvidos, permitindo momentos de prática e consolidação dos conteúdos adquiridos na escola de medicina, através de orientações referentes a temas comuns na obstetrícia e pediatria. Desse modo, pode-se inferir que o PET/Saúde tem se constituído como uma importante estratégia de melhoria da formação profissional de estudantes da área da saúde, promovendo futuramente, avanços na assistência aos usuários do SUS.

O USO DE ANESTÉSICOS E VASOS CONSTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS

ARAÚJO, Leanderson Cutrim *; ALMEIDA, Renata Fernanda Mendes; ROCHA, Marcio Lima; Maciel, Andrezza Bastos

Curso: odontologia

Categoria: graduação

Email: leo.cutrim@icloud.com

Resumo: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Homens e mulheres são acometidos, tais patologias são também importantes não só pela gravidade, como também pelas quantidades de pessoas que são acometidas e que estão em tratamento, por este motivo a uma grande demanda desse tipo de paciente nos consultórios odontológicos. Esses pacientes precisam de uma preocupação e atenção especial em todos os setores, e nos consultórios odontológicos não é diferente, tanto para pequenos como para grandes procedimentos odontológicos, sendo muito importante saber quais medicamentos usar em certas situações, assim como anestésicos e uso ou não de vasoconstrictor.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR

ASSUNÇÃO, Carla Maria Reis; BARROS, Valeria; KEULER, Hellen; THAYLANE, Andressa; BECKMAN, Marcia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: carllajoaquina.28@hotmail.com

O objetivo desse trabalho é apresentar uma Proposta de intervenção em Psicologia Escolar, onde foi montando um planejamento de intervenção conforme a necessidade e disponibilidade da instituição escolar Elzuila Abreu turno vespertino, baseada nas observações feitas por nós, alunos graduandos de Psicologia, na escola que atuamos. Essa Proposta de intervenção em Psicologia Escolar é um projeto que nos leva à prática do que nos é ensinado teoricamente em sala de aula, podendo nos fazer perceber o quanto é fundamental estarmos envolvidos nesse contexto escolar como profissionais dotados de preparo e dispostos a crescer e contribuir, não somente com a prática pedagógica, mas, em todas as áreas da psicologia, pois às mesmas se cruzam e se fazem presentes em toda a vida de um psicólogo.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU): O EXAME DE URINA

ASSUNÇÃO Raissa Guará*, CORDEIRO, Iasmym Aparecida Ribeiro; FERREIRA, Rayana Larissa Pinheiro Soares; NUNES, Jadna Patricia Pinheiro; MIRANDA, Ianna Lara de Paula ; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

Email: raissa_guara@hotmail.com

As infecções do trato urinário (ITU) integram o grupo de infecções que acometem frequentemente a população, sendo para o sexo feminino os maiores índices. Revisão Bibliográfica: Os agentes etiológicos da ITU mais comuns constituem a classe das enterobactérias, no qual a *Escherichia coli* é o patógeno mais comum (MENEZES, 2004). Na interpretação do resultado do exame de urina, é indicado fazer uma triagem sobre a procedência da amostra, com relação aos cuidados pessoais e as técnicas laboratoriais (RIBEIRO, 2005). No Brasil 80% dos casos clínicos observados, estão relacionados às ITU que pode envolver tanto o trato urinário baixo quanto o alto ou ambos (HEILBERG, 2002). Aproximadamente 50 a 70% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU em sua vida, e as cistites afetam entre 10 a 20 % da população (HEILBERG, 2002). A urocultura é o exame laboratorial utilizado como ferramenta complementar ao diagnóstico das ITU, pois possibilita o crescimento isolado do agente etiológico por meio da semeadura da urina e assim permite uma melhor eficácia em relação a antibioticoterapia (FERNANDES, 2003); (POLETTI, 2005). Conclusão: Na maioria das vezes o tratamento das ITU é iniciado antes do resultado laboratorial, onde considera-se somente o quadro clínico do paciente. Vale ressaltar a importância do exame de urina no auxílio diagnóstico das ITU, uma vez que possibilita a identificação do agente etiológico e ainda o perfil de sensibilidade bacteriana frente aos antimicrobianos administrados.

A UROANÁLISE COMO EXAME COMPLEMENTAR NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA

BASTOS; Alice Layra Silva*; TORRES, Deiyilson Silva; GRANGEIRO, Mariana Martins Santos; GUEDES, Fabrício Silva; CHAGAS, Laércio Cutrim; Da Rocha, Marla Raquel Pontes

Curso: biomedicina

Categoria: graduação

Email: mrlpontes@gmail.com

Resumo: O exame de urina constitui como uma importante ferramenta de diagnóstico complementar frente a avaliação da função renal e associação com doenças sistêmicas. Revisão Bibliográfica: A uroanálise é a análise física, química e microscópica da urina, que pode proporcionar nas investigações do trato urinário (JOVILIANO, 2014); (STRASINGER, 1998). O controle de qualidade adequado desde a coleta até a finalização do exame permite a uroanálise como objeto de investigação clínica médica (JOVILIANO, 2014). A análise da urina é feita quanto à quantidade; densidade; pH; aspecto físico (cor, transparência, cheiro); presença ou não de elementos, sedimentos anormais de germes; composição bioquímica e pesquisa microscópica (SCOTTI; FALKENBERG, 2014). Dentro da classificação das infecções urinárias, as cistites são infecções não complicadas enquanto as pielonefrites são mais complicadas, pois em geral resultam da ascensão de microrganismos do trato urinário inferior e estão frequentemente associadas com a presença de cálculos renais. Tanto a infecção urinária baixa como a alta podem ser aguda ou crônica e sua origem pode ser comunitária ou hospitalar (HENRY, 1999). A infecção urinária pode comprometer o trato urinário baixo, o que especifica o diagnóstico de cistite, ou afetar simultaneamente o trato superior; sendo utilizada a terminologia infecção urinária alta ou pielonefrite (HENRY, 1999). Conclusão: a uroanálise é utilizada no auxílio-diagnóstico frente as infecções do trato urinário em conjunto ao quadro clínico do paciente, sendo fundamento na identificação do agente etiológico e ainda para o monitoramento da eficácia da antibioticoterapia empregada.

EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC

BARROSO, Carolina Marques*; ARAÚJO, Randerson de Sousa; VIEIRA, Clarissa Lopes; SILVA, Marcos André dos Santos da

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: randersonsa@hotmail.com

A Radiologia odontológica assim como outras áreas da odontologia passou por profunda evolução tecnológica nos últimos anos. Exames convencionais como a radiografia panorâmica e as radiografias intra-orais evoluíram para o formato digital. Os aparelhos mais recentes trazem vantagens relevantes em relação aos métodos convencionais, tais

como: maior resolução e contraste, menor dose de radiação ao paciente, otimizar o tempo, evitam repetições dos exames pelos erros de processamento. O avanço mais importante para odontologia, em geral foi a chegada da tomografia computadorizada cone-beam ou feixe cônico (TCFC). Desde 1980, a Odontologia tem se beneficiado de vários tipos de tomografia como a linear, multidirecional computadorizada fan-beam. Porém foi a tomografia cone-beam que atendeu satisfatoriamente à necessidade de imagem mais detalhadas e fiéis à anatomia da região da cabeça e pescoço utilizando baixa dose de radiação. Essa maior necessidade ficou evidenciada a partir do trabalho em reabilitação oral e facial com implantes osseointegrados. Nesse intuito, nosso objetivo será apresentar as novidades da TCFC do diagnóstico por imagem na odontológica.

ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL

BONFIM, Valéria da Silva* ; CAMPO, Renata Arruda Silva; JUNIOR, George Seixas Abreu;
SANTOS, Paulo Afonso Araújo dos ; SILVA, Valéria Lima da; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: pauloafonsomagnata@gmail.com

A síndrome da ardência bucal - SAB (glossidínia, glossopirose, síndrome da boca ardente, estomatodinia ou síndrome dos lábios ardentes), caracteriza-se pela experiência sensitiva de queimação na mucosa oral, concomitantemente associada à xerostomia e a alteração no paladar. Em termos mais científicos, pode ser definida como uma desordem ou desarranjo psicossomático, uma entidade clínica caracterizada pela sensação de ardor na mucosa oral sem que se possa detectar qualquer alteração ou lesão fora dos padrões da normalidade. O termo síndrome é usado devido à simultaneidade de diversos sintomas subjetivos, como a sensação de boca seca (xerostomia), paladar alterado (hipogeusia/disgeusia) e ardência nos tecidos orais. É considerada uma dor crônica, na qual está associada a sinais de normalidade e achados laboratoriais normais. A queimação ocorre, na maioria dos casos, em mais de uma área, sendo os dois terços anteriores da língua, a metade do palato duro e a mucosa do lábio superior os locais mais afetados. Faz-se ainda, correlação entre a etiologia da SAB com uso de fármacos, fatores neuropáticos e referências aos mecanismos da dor crônica associados a fatores psicológicos. Sendo na maioria das vezes o tratamento sintomático o mais indicado, além das orientações sobre a síndrome, explicando como ocorrem, as dificuldades relativas ao tratamento e sobre o papel fundamental da cooperação do paciente. Apesar dos protocolos terapêuticos não estarem ainda totalmente determinados, a partir da identificação da causa, o tratamento deve ser direcionado a cada paciente. Dependendo das características envolvidas, uma equipe multiprofissional faz-se necessária objetivando a melhor qualidade de vida do paciente.

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ESCOLARES

CANTANHEDE, Anderson dos Santos*; MARIANO, Eder Rodrigo

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: anderson_cantanhede@hotmail.com

A obesidade é definida como um excesso de gordura corporal relacionado à massa magra, e sobrepeso como uma proporção relativa de peso maior que a desejável para a altura (GUEDES,2010).

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO

CARVALHO, Jennifer Nayara Humbelino de; MELO, Laise Arruda de; RABÊLO, José Lucas de Araújo;
SILVA, Guilherme Vidigal Fernandes da; CARVALHO, Laise Neves CARVALHO

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

Email: zelucasrabelo@hotmail.com

Segundo a United States Department of Health and Human Services, a atividade física é definida como qualquer movimento corporal voluntário que resulta em gasto energético maior que o gasto em repouso. Já o exercício físico é caracterizado como toda atividade física estruturada, planejada e repetitiva que tem por objetivo a melhoria da saúde e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Esses termos se confundem e muitas vezes são utilizados como sinônimos

(CASPERSEN 1985). A literatura recente mostra a necessidade de discriminar o domínio da atividade física ao considerar seus efeitos na gestação. Atividades físicas ocupacionais que envolvem grande esforço apresentam efeitos deletérios aos desfechos da gestação (TAKITO et al., 2010), e as de lazer e exercícios físicos mostram efeitos positivos (ZAVORSKY et al., 2011). Segundo o estudo “The benefits and risks of exercise during pregnancy” (2002), a atividade física aeróbia auxilia de forma significativa no controle do peso e na manutenção do condicionamento, além de reduzir riscos de diabetes gestacional, condição que afeta 5% das gestantes. A prática de exercícios, também, acarreta riscos potenciais para o feto em situações em que a intensidade do exercício seja muito alta, criando um estado de hipóxia para o feto, em situações em que haja risco de trauma abdominal e em situações de hipertermia da gestante. Com isso, é importante que toda gestante seja orientada sobre a necessidade da prática de exercício, conhecendo os benefícios, mas também os seus limites

SÍNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)

CORSO, Samir Henrique; COELHO, Patrícia Magalhaes; OLIVEIRA, Elane Carvalho;
PINHEIRO, Flávia Coelho Mohana; SANTOS, Livia Eloi Castro; REGO, Iolanda Margarete de Araújo

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

Email: samirhcor@hotmail.com

A capacidade do álcool em romper a barreira placentária, faz com que o feto absorva as toxinas do metanol, não havendo enzimas que metabolizem o álcool no organismo do feto, este por sua vez age diretamente no sistema nervoso central do concepto. Sabe-se que as gravidezes não planejadas, em especial em adolescente, causa resistência na gestante em abster-se de práticas de lazer que envolvam o consumo de bebidas alcólicas, soma-se a isso a cultura de cada país em fazer algumas apologias ao consumo de bebidas alcólicas. Os mecanismos de ação seriam a imaturidade hepática e enzimática do feto, que por não metabolizarem o álcool teria uma quantidade exacerbada de ácidos graxos e seus metabólitos que se depositariam no coração, fígado e rins do feto. Outro achado seria a probabilidade de o etanol impedir a absorção de alguns aminoácidos e nutrientes pela via placentária, retardando o crescimento e a divisão celular. O fígado exigindo um aporte maior de oxigênio para tentar metabolizar estes metabólitos fariam com que as adrenais liberassem grande quantidade de catecolaminas causando uma vasoconstrição e maior deficiência de oxigênio, além da obstrução da vasculatura umbilical. O álcool causaria ainda, produção aumentada de prostaglandinas e produção de AMP cíclico, que em níveis elevados aumentariam ainda mais os danos ao SNC. Sabe-se sobretudo, que apesar dos três primeiros meses serem os mais suscetíveis a teratogênias e danos ao feto, não há dose segura nem tempo seguro para o consumo de bebida alcóolica durante a gestação. Se uma mulher grávida, efetivamente, nunca bebe sozinha, a primeira manifestação de amor ao bebê é afastar-se da bebida alcóolica. Mulheres que estão tentando engravidar devem se abster do álcool e mulheres que são alcoolistas devem procurar ajuda médica e terapêutica, como programas de reabilitação além de acompanhamento de um médico durante toda a gravidez.

DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE FÍSICA

COSTA, Jenypher Silva*; VILANE, Wanilla; ROCHA, Gisele

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: jenny_sc1@hotmail.com

A doença de Parkinson é mais comum em idosos e é caracterizada como uma doença neurológica que afeta os neurônios causando tremores, rigidez muscular, depressão, distúrbios do sono, dificuldade na respiração entre outras diversas consequências causadas no indivíduo, ou seja, há uma perda no desempenho funcional que está diretamente ligada com a capacidade física e mental interferindo em uma boa qualidade de vida do mesmo. A atividade física vem sendo um fator importante e determinante nesta patologia, pois quanto mais graves foram os sintomas mais inatividade a pessoa vai ter, podendo gerar até uma atrofia muscular. E essa atividade física vai ajudar na capacidade física que foi perdida por causa do mal de Parkinson e conseqüentemente ajudando também em uma melhora no desempenho motor, ela vem mostrando bons resultados na melhora deste quadro e elevando o nível de vida normal ou até próximo a este, o objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios da atividade física em pessoas portadoras da doença de Parkinson.

CANDIDOSE

COSTA, Iasmim Lima*; SILVA, Antônia Claudia G*; SILVA, Fabíola Ayane Costa*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: iasmimlima@msn.com

A candidose se trata de uma doença não tão comum na população em geral, sendo assim, para adquirir é necessário fatores predisponentes locais ou sistêmicos. A candidose apresenta vários aspectos clínicos: pseudomembranoso (agudo), eritematoso (agudo e crônico), hiperplásico ou candidose leucoplásica e mucocutânea. Para que haja o tratamento das lesões deve-se ressaltar que são diferentes tipos de abordagem terapêutica.

ANQUILOGLOSSIA

COSTA, Lucas Tadeu Magalhães*; GOMES, Letícia Lafalhetes dos Santos; PIRES, Luiza Onezi Texeira; LEAL, Otavio Henrique da Silva; PRADO, Sarah Maria; CALVET, Clélea de Oliveira; DE CASTRO, Ana Carolina Pereira

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lucasthadeu18@hotmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal aprimorar o conhecimento sobre a anquiloglossia, o encurtamento do freio lingual, destacando os diversos conceitos dessa anomalia, que resulta em alterações como: respiração bucal, desarmonia no crescimento facial entre as partes moles e duras, dificuldades na deglutição e na fala. Nesta revisão de literatura é mostrado como a doença surge e como pode ser tratada, através de artigos, livros e sites da internet; e dessa forma evidenciar a importância do seu conhecimento para o cirurgião-dentista.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS

CUNHA, Hacemyra* ; MARAMALDO, Juheyra; MUNIZ, Paloma ; OLIVEIRA, Rafyza; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hacemyracunha@gmail.com

CID (Classificação Internacional de Doenças) é um programa que tem como objetivo padronizar e classificar todas as doenças do planeta, tendo como prioridade estabelecer uma ordem para codificação de doenças. Foi criada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) com o intuito de auxiliar e buscar o diagnóstico para finalidades gerais como doenças não fatais, sinais das doenças, sintomas, queixas, circunstâncias, causas para cada problema de saúde e também para codificar e classificar os dados de mortalidade de atestados de óbitos. Esses códigos foram classificados por uma letra seguida por três números compondo quatro caracteres. As primeiras revisões da classificação foram usadas para causas de morte, só a partir da sexta revisão que tiveram finalidades de incluir doenças não fatais, logo depois ocorreram algumas inovações onde foi criada a nona revisão para fins experimentais. Chegando a décima, onde houve uma inovação com uso de esquema de código alfanumérico. O aperfeiçoamento do CID-10 entre os cirurgiões dentistas e a perícia odontológica no trabalho foi extremamente necessária. Antes da sua atualização se tratava de uma classificação precária para a área de odontologia. Uma das alternativas vista, além da atualização da CID é a CID-OE (Classificação internacional de doenças em estomatologia odontológica) que é mais específica e detalhada em alguns casos para a odontologia, onde teve abrangências com relação a mais patologias.

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*; ALBINO, Laila Da Veiga;. NETTO, Osmar Portela;. MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: jessicaskarlas@gmail.com

A regeneração tecidual guiada (RTG) consiste numa modalidade de tratamento regenerativo que requer a colocação de uma barreira física sobre o defeito ósseo, de modo que a proliferação de tecidos moles adjacentes para dentro da área protegida seja evitada. As barreiras físicas devem ser biocompatíveis, permitir oclusão celular, manutenção do espaço, integração tecidual e facilidade de uso. Dentre os quais falaremos dos seguintes: Hidroxiapatita, Cola gel e Membranas e suas respectivas características

ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*; ALBINO, Laila Da Veiga; COSTA, Anne Beatriz De Deus; SENA, Valéria Costa; SILVA, Natã Felício De Souza; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: jessicaskarlas@gmail.com

Pacientes oncológicos que são submetidos ao intensivo tratamento quimioterápico, merecem maior atenção em relação a cavidade oral, pois haverá alterações significativas que podem interferir no resultado da terapêutica médica. As alterações bucais são comuns em pacientes com câncer, observa-se presença de xerostomia, mucosite e reações tóxicas e inflamatórias que atingem a mucosa oral e todo o trato intestinal. Sangramento e hemorragias gengivais são bastantes frequentes nestes casos. O desconforto e as dores proporcionadas aos pacientes padecentes desta doença são de grande intensidade, deixando-os fracos e dependentes de terceiros em sua grande maioria. Necessariamente, o papel principal da odontologia não deixa de agir no controle destas alterações na cavidade oral, proporcionando conforto e alívio da dor ao paciente.

A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO NA IMPLANTODONTIA

FIGEREDO, Lays Azulay; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: laysazulay87@gmail.com

As células tronco, também conhecidos como células-mãe e células estaminais, quando em condições adequadas, podem se diferenciar e se transformar em vários tipos de células do organismo. A capacidade de formar um órgão ou regenerar um tecido lesado, conferem a essas células um enorme potencial no tratamento de diversas doenças. A odontologia tem apresentado um dos desenvolvimentos mais animadores no que se refere às células tronco. Pesquisas demonstram que culturas de células tronco mesenquimais in vitro podem sofrer osteoindução e produzir células dos diferentes estágios da linhagem osteoblástica. Para a Implantodontia, isto vem como uma surpreendente opção de evolução nos enxertos, completamente biocompatível, com a mínima manipulação dos tecidos e maior rapidez nos procedimentos reconstrutivos diminuindo a dor e evitando lesões e morbidade na área doadora. É certo que uma vez esclarecidos os mecanismos envolvendo a diferenciação de células tronco em osteoblastos e materiais mais apropriados para promover a osteocondução, osteoindução e osteogênese, os procedimentos cirúrgicos que exigem uma resposta tecidual óssea satisfatória como os casos de implantes dentários osseointegrados e enxertos ósseos, seriam favorecidos, reduzindo o tempo de cicatrização, bem como os benefícios já supracitados. Por se tratar de uma técnica ainda nova e revolucionadora, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica, mostrando a evolução, prós e contras das células tronco na implantodontia.

A FITOTERAPIA DA GARCÍNIA CAMBOGIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE

FROES, Yuri Nascimento*; CARVALHO, Gesanage Da Paz; MUBARACK, Lucas Dos Santos; MOREIRA, Watna Sales

Orientador: REIS, Waneska Ferreira Cavalcante de Albuquerque

Co-Orientador: OLIVEIRA, Paula de Lourdes Lauande

Categoria: Graduação

Curso: Farmácia

E-mail: yurifroes@outlook.com

A obesidade representa um grave problema de Saúde Pública, estando frequentemente associada à redução da expectativa de vida e aumento de risco de morbidade. O uso de fitoterápicos vem despertando o interesse científico na

comprovação de suas propriedades anti-obesidade, evidenciando efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos para a manutenção da saúde. Considerando que a obesidade é uma doença multifatorial, que atinge um grande número de indivíduos, independentemente da idade e situação econômica e que a utilização de substratos naturais de origem botânica vem sendo pesquisada como uma alternativa terapêutica de redução de peso, o objetivo do estudo é descrever a eficácia da fitoterapia da *Garcinia cambogia* no tratamento do aumento excessivo de peso e o acúmulo de gordura corporal acima dos padrões de normalidade. Trata-se de um estudo observacional descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas publicações nacionais e internacionais, com texto completo, escritas no idioma português ou inglês. A literatura pesquisada evidencia que o princípio ativo encontrado na *Garcinia cambogia* atua na redução da massa corpórea, dos níveis plasmáticos de colesterol total, LDL e triglicérides e, dentre as diversas plantas medicinais estudadas e utilizadas com o objetivo de redução de peso, apresenta maior potencial para geração de futuros fármacos, além de não causar efeitos colaterais e não ter contraindicação. O tratamento de estados patológicos através da utilização de produtos fitoterápicos em doses aceitáveis pode representar uma alternativa viável, eficaz e segura para prevenir dislipidemias e promover perda de peso.

TÉCNICA DO RECONTORNO GENGIVAL E FRENOTOMIA: RELATO DE CASO

GUARÁ, Tayanne Christine Gomes*; E COSTA, Hugo Costa; JÚNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hugocostaecosta@hotmail.com

Os valores estéticos são influenciados por fatores psicossociais, culturais e econômicos assim sendo o plano de tratamento deve sempre se ajustar na expectativa estética de cada paciente. Entretanto sorrisos equilibrados e em harmonia com as estruturas faciais e dento facial são considerados mais estéticos. A literatura odontológica mostra alguns pontos a serem observados para podermos classificar o tipo de sorriso do paciente. Durante o sorriso, normalmente um indivíduo expõe de 1 a 3mm de gengiva, ressaltando o tecido gengival interdental e ainda a margem gengival. A gengivectomia por bisel interno é uma cirurgia ressectiva estética, que tem por objetivo o restabelecimento fisiológico do espaço biológico, permitindo que procedimentos restauradores sejam compatíveis com a saúde periodontal, sendo necessários a existência de larga faixa de gengiva queratinizada, ausência de deformidades ósseas, natureza fibrótica e motivação pelo paciente no controle do biofilme dentário. O objetivo desse trabalho foi relatar o caso de uma paciente que apresentou relação desarmônica entre o comprimento do dente (curto) e a linha do sorriso.

PERFIL GESTACIONAL DE ADOLESCENTES ATENDIDAS EM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE DE FERRER- MARANHÃO

GOMES, Rosangela Alves Moraes Gereissat*; AQUINO, Tiago da Conceição; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; SANTOS, Glauciane Lima dos; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e; SANTIAGO, Lilian Cassia Piedade

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: rosangela_gereissat@hotmail.com

A temática da gravidez na adolescência tem preocupado profissionais da saúde, assim como diferentes segmentos sociais. Entretanto, a maior parte dos estudos abordam as questões relacionadas ao sexo feminino, possivelmente, resultado na influência sociocultural, no qual a mulher é considerada a principal responsável pela gestação e cuidado com a criança. O presente estudo analisou o perfil gestacional de adolescentes atendidas em um Centro de Saúde do município de São Vicente Férrer - Maranhão. O grupo caso, composto por 43 adolescentes grávidas que procuraram o Centro de Saúde no período de janeiro a novembro de 2011. O estudo atual foi realizado pareado em pesquisa através de prontuários baseado em dados socioeconômicos, idade que começou a ter relação sexual, primeira gestação, motivação para a vida ativa sexual, dentre outros. Constatou-se que 58% eram solteiras com idade prevalente de 19 anos (32%), com iniciação sexual com 12 anos (9%). A gravidez foi planejada entre 28% das pesquisadas, no entanto, 72% não se sentem preparadas para serem mães. Daí a preocupação a saúde pública, visando a gravidez como um acidente em suas vidas e que a gravidez acontece principalmente por falta de conhecimento em educação sexual.

NORMAS INTERNACIONAIS DE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

JANSEN, Paulo Ricardo de Aguiar*; MOURA, Amanda Bezerra de Oliveira de;
NETO, Osmar Araújo Portela; VIEIRA, Stefanny de Almeida; MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: amandynha_olyver@hotmail.com

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos (tabela I e II do Decreto- Lei n 15/93, e n. 1 do artigo 86,) tem de ser feita no modelo de receita medica aprovado pelo Despacho n. 15700/2012, de 30 de novembro.

As receitas eletrônicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo ser impressa a indicação da respectiva via (1 via, 2 via e 3 via). Apenas podem ser prescritos em receitas renováveis, pôs medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração, ou seja, os medicamentos que constem da tabela 2 da Portaria n.1471/2004, de 21 de dezembro, na sua atual redação (Deliberação n.173/CD/2011, de 27 de outubro) Para que o processo de desmaterialização da receita seja possível, é obrigatório que a prescrição seja realizada On-line, ou seja, no momento da prescrição, os softwares tem de validar e registrar a receita de medicamentos no sistema central de prescrições, antes da sua emissão em papel. Só receitas validadas pelo sistema e registradas centralmente são consideradas receitas eletrônicas. A quando da desmaterialização, estas receitas ficam imediatamente visíveis para as farmácias. (INFRAMED, 2012) farmacêutico poderá prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo: medicamentos industrializados e preparações magistrais alopatícas ou dinamizadas; -plantas medicinais; drogas vegetais; -outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico.

PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)

LIMA, Leylanne Ribeiro Barros*; E COSTA, Hugo Costa; PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar; PASSOS, Thays Sousa Vasconcelos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: leylannebarros@hotmail.com

O Cirurgião Dentista tem como ofício a manutenção e o restabelecimento da saúde nos seres humanos, atuando no alívio e/ou remoção da dor, restabelecimento da estética, função e fonação. Para que possa intervir, seja com procedimentos preventivos ou curativos, deve ser capaz de identificar um estado de saúde e doença. A saúde tem sido definida como o perfeito e harmonioso bem-estar físico, mental social e espiritual, e não simplesmente a ausência de doenças. Em Odontologia existem diversas situações que podem referir dor ao paciente. Dentre as mais comuns estão as disfunções temporomandibulares (DTM) (VAROLI, et al., 2006). O tratamento de casos de DTM exige um conhecimento profundo da etiologia do problema. Fatores estruturais, funcionais e psicológicos parecem estar reunidos, determinando uma origem multifatorial (MELO, et al., 2011). O cirurgião-dentista deve possuir conhecimentos sobre farmacologia e terapêutica para uma prescrição adequada e racional. Desta forma este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre as principais classes de drogas utilizadas no controle da dor na DTM que incluem os analgésicos não opióides, analgésicos opióides, corticosteroides, ansiolíticos, antidepressivos, anestésicos locais, relaxantes musculares (SILVA, et al., 2011).

CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.

LIMA, Valéria*; OLIVEIRA, Rafaelle Caroline da Silva; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; FILHO, Etevaldo Matos Maia; AZEVEDO, Talita de Oliveira.; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: valerialima.fono@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a resistência adesiva entre cimento ortodôntico tradicional para colagem de bráquetes e cimento autoadesivo, avaliando em adição a influência da asperização na melhora da resistência adesiva, verificando o índice de adesivo remanescente com uso do cimento autoadesivo e sem ele. Trata-se de um estudo final realizado com 72

corpos de provas, divididos em (G1 e G2) e estes subdivididos em outros 4 (G1A, G1B, G2A e G2B). Utilizando cilindros rígidos de PVC para o preenchimento com resina acrílica, onde foi inserida resina composta nanoparticulada fotopolimerizável Filtek Z350 XT em incremento único, onde receberam profilaxia com pedra-pomes fina, água destilada e taça de borracha, antes da colagem dos acessórios ortodônticos. Realizados os testes de cisalhamento na máquina de ensaio universal EMIC, onde foi operada a uma velocidade de 0,5mm/min, utilizando célula de carga de 50Kg/f, logo após foi utilizada lupa Estereoscópica com aumento de 10 vezes para determinar o IAR, através dos escores preconizados que variaram de 1 a 5, para medir o grau de concordância entre os avaliadores para os valores de IAR. O resultado de 0.954 foi altamente significativo. Os resultados mostraram que o efeito do fator tratamento de superfície foi significativo na resistência de união, enquanto que, não houve diferença para os tipos de resinas, e para a interação resina X tratamento de superfície. Isso sugere que a resistência de união foi maior no grupo em não foi utilizada a asperização.

EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.

MENDES, Antoniel Matos*; ALMEIDA, Geanderson Oliveira; AMORIM, Wesley Wallace de Alcantara Araujo; COSTA, Ingrid Layane Paula da; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges, SAUAIA, Bismarck Ascar

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: grupodepesquisa2014@hotmail.com

O estudo das neoplasias vem despertando no campo acadêmico, pesquisas que possam minimizar agravos do paciente oncológico. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de células. (INCA, 2012). Para o tratamento com radioterapia, utilizam-se radiações para destruir um tumor ou impedir a sua proliferação (INCA, 2012). Para o tratamento com quimioterapia, utiliza-se fármacos no combate ao crescimento celular desordenado. No transplante de medula óssea, para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue, consiste na substituição de uma medula óssea doente. (INCA, 2012). A partir da década de 70, a utilização de terapias alternativas, como o uso de fitoterápicos, popularizou, tendo sua adesão aumentada para aproximadamente 2 a 3% ao ano (SOUZA, 2004). As plantas *Annona muricata* L. e *Euphorbia tirucalli* L, têm sido espécies utilizadas no Brasil frente ao tratamento de cânceres. A *A. muricata* possui dentro dos seus constituintes químicos, a acetogenina, esta capaz de provocar citotoxicidade em linhagens celulares de tumores humanos com seletividade para o adenocarcinoma do útero e ovário (KIM et al, 1998). Já a *E. tirucalli* é uma espécie que apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante por conta das moléculas de flavonóides presentes em sua composição (SILVA; VARRICHIO, 2009). A associação dessas substâncias pode desencadear uma resposta imunoterápica, o que proporciona um efeito antitumoral. A importância desse tipo de abordagem leva em consideração o efeito de um tratamento menos agressivo, mas não diminuindo a sua eficácia.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL:

O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.

SILVA, Tyara Dwan Silva *; MORAES, Laura dos Santos; VIANA, Tainara ; SANTOS, Vilianne; OLIVEIRA, Danielle; Coelho, Meire

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: waneskareis@yahoo.com.br

Resumo: A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), desde sua implantação contribuiu para a redução das desigualdades em saúde, e, representa o marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal e fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, favorecendo o acesso e atenção às demandas em saúde bucal da população brasileira. Considerando que a Política Nacional de Saúde Bucal constitui uma Estratégia Nacional para impactar a qualidade de vida, mediante mudanças na condição de saúde bucal da população, o presente estudo tem por objetivo descrever as contribuições e avanços advindos da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal. Trata-se de um estudo descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas somente publicações nacionais, com texto completo, escritas no idioma português. A literatura pesquisada evidencia que a reorganização da prática assistencial possibilitou a ampliação do acesso, a qualidade dos serviços, humanização das práticas em saúde, além de efetivar a integralidade dos serviços em saúde bucal, explicitando avanços significativos quando comparados ao contexto anterior das práticas assistenciais embasadas no modelo hegemônico de baixa complexidade e ações em saúde bucal voltadas em sua maioria para atenção curativa com forte tendência à mutilação e à exclusão social. A implantação da Política Nacional de Saúde Bucal reconhece a saúde bucal como um direito à cidadania e à qualidade de vida, integrando um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

EFEITO ANTICANCERÍGENO DA ANNONA MURICATA L. E. EUPHORBIA TIRUCALLI L.

MENDES, Antoniel Matos*; ALMEIDA, Geanderson Oliveira; AMORIM, Wesley Wallace de Alcantara Araujo; COSTA, Ingrid Layane Paula da; ROCHA, Marla Raquel Pontes da; PACHÊCO, Wallace Borges, SAUAIA, Bismarck Ascar

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: grupodepesquisa2014@hotmail.com

O estudo das neoplasias vem despertando no campo acadêmico, pesquisas que possam minimizar agravos do paciente oncológico. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de células. (INCA, 2012). Para o tratamento com radioterapia, utilizam-se radiações para destruir um tumor ou impedir a sua proliferação (INCA, 2012). Para o tratamento com quimioterapia, utiliza-se fármacos no combate ao crescimento celular desordenado. No transplante de medula óssea, para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue, consiste na substituição de uma medula óssea doente. (INCA, 2012). A partir da década de 70, a utilização de terapias alternativas, como o uso de fitoterápicos, popularizou, tendo sua adesão aumentada para aproximadamente 2 a 3% ao ano (SOUZA, 2004). As plantas *Annona muricata* L. e *Euphorbia tirucalli* L, têm sido espécies utilizadas no Brasil frente ao tratamento de cânceres. A *A. muricata* possui dentro dos seus constituintes químicos, a acetogenina, esta capaz de provocar citotoxicidade em linhagens celulares de tumores humanos com seletividade para o adenocarcinoma do útero e ovário (KIM et al, 1998). Já a *E. tirucalli* é uma espécie que apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante por conta das moléculas de flavonóides presentes em sua composição (SILVA; VARRICHIO, 2009). A associação dessas substâncias pode desencadear uma resposta imunoterápica, o que proporciona um efeito anti-tumoral. A importância desse tipo de abordagem leva em consideração o efeito de um tratamento menos agressivo, mas não diminuindo a sua eficácia.

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES DE ESCOLAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

MORAES, Joelma da Cruz Paz*; MATOS, Mayane Machado¹; VIANA, Amanda²

*^{1,2}Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: joelmadacruz1992@hotmail.com

Nas últimas décadas foram realizados diversos levantamentos sobre incidência de cárie e doença periodontal na população brasileira, a fim de avaliar os principais grupos socioeconômicos afetados por essa epidemiologia para que fossem estabelecidos programas de promoção de saúde bucal. Com o intuito de analisar os pensamentos de diferentes autores sobre incidência de cárie e problemas periodontais em indivíduos de escolas públicas e sua relação com os níveis socioeconômicos, foi realizado um levantamento bibliográfico a partir de estudos publicados em forma de artigos e revistas. Este trabalho avalia qual a ligação das condições de saúde bucal com a situação social e econômica dos alunos com relação a incidência da doença cárie e problemas periodontais, buscando conhecer os efeitos das desigualdades para o acometimento dessas doenças. Observou-se, conforme a literatura, que os escolares com maior número de superfícies com experiência de cárie e problemas periodontais pertencem a famílias de grau de instrução e renda per capita baixa, caracterizando assim a ligação direta da má higiene bucal com as condições financeiras, falta de conhecimento e instruções à que certos grupos populacionais estão sujeitos. Conclui-se que é necessário um aprimoramento das políticas e programas de prevenção e promoção à saúde bucal baseando-se nos princípios de igualdade e equidade para que assim todos os grupos sociais tenham acesso às informações e serviços de higiene bucal e dessa forma os efeitos das desigualdades sociais sejam minimizadas.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: O DIREITO À SAÚDE BUCAL COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.

MORAES, Laura dos Santos*; SILVA, Tyara Dwan Silva; VIANA, Tainara; SANTOS, Vilianne; OLIVEIRA, Danielle; Coelho, Meire

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: waneskareis@yahoo.com.br

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), desde sua implantação contribuiu para a redução das desigualdades em saúde, e, representa o marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal e fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, favorecendo o acesso e atenção às demandas em saúde bucal da população brasileira. Considerando que a Política Nacional de Saúde Bucal constitui uma Estratégia Nacional para impactar a qualidade de vida, mediante mudanças na condição de saúde bucal da população, o presente estudo tem por objetivo descrever as contribuições e avanços advindos da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal. Trata-se de um estudo descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas somente publicações nacionais, com texto completo, escritas no idioma português. A literatura pesquisada evidencia que a reorganização da prática assistencial possibilitou a ampliação do acesso, a qualidade dos serviços, humanização das práticas em saúde, além de efetivar a integralidade dos serviços em saúde bucal, explicitando avanços significativos quando comparados ao contexto anterior das práticas assistenciais embasadas no modelo hegemônico de baixa complexidade e ações em saúde bucal voltadas em sua maioria para atenção curativa com forte tendência à mutilação e à exclusão social. A implantação da Política Nacional de Saúde Bucal reconhece a saúde bucal como um direito à cidadania e à qualidade de vida, integrando um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.

ESTUDO “in vitro” DA RESISTÊNCIA ADESIVA DO ESMALTE DECÍDUO, UTILIZANDO SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES E SUBMETIDOS À APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR.

NOLETO, Lawanne Ellen Carvalho*; FIROOZMAND, Leily Macedo ; GOMES, Isabella Azevedo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: lawannecarvalho@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência adesiva dos sistemas autocondicionantes sobre o esmalte decíduo após a aplicação tópica de flúor. Foram empregados 40 molares e 40 incisivos decíduos. Cada grupo de dentes foi dividido em quatro grupos experimentais: SAC-C: (controle) sistema autocondicionante Clearfil SE Bond (Kuraray) sem tratamento do esmalte; SAC-F: sistema autocondicionante Clearfil SE Bond (Kuraray) com prévio tratamento do esmalte (FFA 1,23%, 1 min); SC-C: sistema adesivo convencional Adper Single Bond 2 (3M) sem tratamento do esmalte; SC-F: sistema adesivo convencional AdperSingle Bond 2 (3M) com prévio tratamento do esmalte (FFA1,23%,1 min). Os corpos-de-prova foram confeccionados utilizando a resina composta Filtek Z250(3M), e armazenados em água destilada ($37\pm 1^\circ\text{C}$), por 24h. O teste de microcisalhamento foi realizado utilizando a máquina de ensaio universal EMIC DL 2000. Os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney foram empregados para comparar os valores de resistência adesiva e índice de adesivo remanescente, revelando que a prévia aplicação do FFA 1,23% promoveu redução estatisticamente significativa da resistência adesiva, tanto quando utilizado o SC bem como SAC. Analisando apenas o SAC e SC não foi observada diferença estatística significativa quando utilizado sobre o mesmo grupo de dentes decíduos. Porém, avaliando o tipo de dente, observou-se que para SAC o esmalte de incisivos decíduos apresentou valores reduzidos de resistência adesiva em relação aos molares, para SC esta diferença não foi observada. Concluiu-se que a aplicação prévia do FFA 1,23%, o tipo de dente (molar/incisivo) interfere na resistência adesiva quando empregados sistemas adesivos convencionais e autocondicionantes.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS

PRAZERES, Raissa Silva*; SANTOS, Aline Adelaide Rodrigues dos; COSTA, Cyrene Piazeria Silva

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: ramom.m.aguiar@hotmail.com

O autismo é caracterizado por comportamentos persistentes nas interações sociais recíprocas, desvios na comunicação e padrões comportamentais restritos e estereotipados, de etiologia desconhecida. Os pacientes autistas apresentam níveis de higiene oral insatisfatória, devido as dificuldades na execução, pois apresentam alterações de coordenação e pouca cooperação para realizações de tarefas, a mesma também é influenciada pela dieta cariogênica e uso de medicamentos xerostomogênicos. A higiene oral de um autista é geralmente negligenciada devido a preocupação da família relacionada diretamente a doença. A incidência dessa desordem é relativamente alta e isso faz importante o conhecimento do cirurgião-dentista das suas características, limitações e possíveis implicações no tratamento odontológico, pois as alterações comportamentais é um importante complicador no atendimento pela dificuldade da realização de exames e tratamento. Por esses motivos, o cirurgião-dentista tem que utilizar estratégias que facilite a abordagem e atendimento desse paciente,

dentre eles, o Programa Son Rise, tornando esse momento mais prazeroso e inovador. O Programa Son Rise é centrado na pessoa com autismo, isto significa que o tratamento parte do desenvolvimento inicial de uma profunda compreensão e genuína apreciação da pessoa, de como ela se comporta, interage e se comunica, assim como de seus interesses. Este é um método lúdico, de abordagem relacional, que incentiva os pais e terapeutas a observar as preferências dos autistas e usá-las como recursos de aprendizagem, favorecendo, conseqüentemente o desenvolvimento social, emocional e cognitivo desses indivíduos. Para que haja sucesso no atendimento de pacientes autistas é necessário conhecimento da técnica por parte do cirurgião-dentista.

EXAME DE URINA COMO FERRAMENTA LABORATORIAL PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA

RAMOS, Gabriela Cateb*; DE ARRUDA, Bárbara Gomes Alencar; LOBATO, Luís Felipe Lima; OLIVEIRA, Jéssica Jansen; PACHÉCO, Wallace Borges; DA ROCHA, Marla Raquel Pontes

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

E-mail: gabrielacateb3@gmail.com

As infecções do trato urinário (ITU) possuem um aspecto clínico amplo, ou seja, atingem ambos os sexos e as mais variadas faixas etárias, no qual se situam entre as infecções bacterianas mais recorrentes. Dentre os principais agentes etiológicos estão incluídas as espécies: *Escherichia coli*, *Staphylococcus saprophyticus* e *Enterococcus faecalis* (STAMM, 2006). Para a elaboração de um diagnóstico preciso de ITU, é necessária a associação entre as manifestações clínicas e os testes laboratoriais (LOPES; TAVARES, 2005). Considerando os exames laboratoriais, os exames de urina, tipo I e II são os comumente realizados como auxílio diagnóstico frente as ITU (KOCK; ZUCCOLOTTI, 2003). A urinálise (tipo I) consiste na análise física, química e microscópica da urina, que proporciona por meio destas características uma associação com as manifestações clínicas do paciente, como também em casos de pacientes assintomáticos (SROUGI, 2005). A urocultura (tipo II) baseia-se na cultura da urina, identificando o agente etiológico (análise qualitativa) e a proporção da bactéria presente (análise quantitativa), capaz de fornecer um direcionamento diante da terapêutica aplicada (HEILBERG; SCHOR, 2003). O fator limitante da importância do exame de urina refere-se ao tipo II (urocultura), em virtude da demora habitual para obtenção do resultado, contudo de grande relevância para o monitoramento da eficácia frente a antibioticoterapia aplicada.

ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES DO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E RESINA COMPOSTA E CASO CLÍNICO

RÊGO, Camilla Bringel*; LEITE, Hadda Lizandra Austríaco*; RODRIGUES, Maria Giuliane Silva*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: camillabringel@live.com

Neste trabalho mostraremos a comparação do ionômero de vidro restaurador com a resina composta, assim como o uso associado dos mesmos, visando agrupar suas propriedades positivas diante de um caso clínico de restauração classe V que exige menos sensibilidade e maior longevidade. É de suma importância que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento científico das propriedades dos materiais odontológicos, assim como o desempenho e a interação dos mesmos com os tecidos biológicos, tornando-os aptos a discernir o material específico para cada circunstância e a possibilidade do uso combinado dos materiais.

TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS

ROCHA, Adrícylla Teixeira; BANDECA, Matheus Coelho; BARRETO, Samuel Benson Lima; GONÇALVES, Leticia Machado; LAHMA, Ana Paula Soares Fernandes; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: adricylla.tr@outlook.com

A toxina botulínica tem sua ação mais ampla e divulgada na dermatologia/estética, apesar de sua principal aplicação ser voltada ao uso terapêutico. É amplamente conhecida por seu uso cosmético ser feito em injeções intramusculares para redução defeitos faciais. O histórico de sua utilização foi iniciado por Scott e cols. em 1973 com seu uso terapêutico em primatas, a partir daí a toxina foi introduzida como um agente terapêutico no tratamento de estrabismo, em meados de 1980. Desde então, sua atuação foi ampliada para diversos campos. Na Odontologia, a toxina botulínica pode ser usada em várias situações para a melhoria de tratamentos como disfunções e dores na articulação têmporo-mandibular, apertamento dental, Bruxismo (ranger de dentes), dores de cabeça de origem dentária, sorriso gengival, paralisia do nervo facial, entre outras, sem consequências indesejáveis, desde que manuseada de forma correta. Deve-se ressaltar que o uso dessa toxina depende do seu correto conhecimento sobre sua utilização, treinamento específico e que não extrapole suas funções. Destaca-se que devido a toxicidade da toxina botulínica ser alta, sempre deve ser utilizada por profissionais capacitados. Este estudo tem como objetivo, revisar a literatura e descrever por meio desta, como o profissional odontológico poderá incluir a toxina botulínica em sua rotina clínica, por este possuir conhecimento sobre as estruturas da cabeça e pescoço.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM NEFROLOGIA: PROMOVENDO BEM-ESTAR A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.

ROCHA, Jeffther Felipe Lima*; AMORIM, Carla Pereira; MARTINS, Ana Carla Privado;
SILVA, Jéssica Cecília Costa da; MACHADO, Patrícia Maria Abreu; FARIA, Simony de Sousa

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: jeffther.felipe@yahoo.com.br

O presente trabalho visa discutir a atuação do psicólogo hospitalar na área de Nefrologia. Seja pela irreversibilidade das patologias nefrológicas, seja pelas implicações psicossociais, a atuação do profissional da Psicologia se faz imprescindível. O trabalho foca especialmente em pacientes com insuficiência renal crônica (principal doença com que os nefrologistas se deparam), e paciente em processo de hemodiálise (tratamento comum aos que possuem IRC). Constata-se, pela revisão teórica, que o paciente com insuficiência renal crônica, submetido ao processo de hemodiálise, enfrenta várias perdas, não apenas no que tange ao orgânico, mas nos âmbitos social, econômico e emocional. Assim, a atuação do psicólogo visa à reestruturação psíquica do paciente, à manutenção e adaptabilidade ao tratamento bem como, ao trabalho com os familiares e a equipe de saúde, preparando-os também para o processo de hospitalização e cronicidade da doença.

EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS

SANTOS, Sara Freitas*; COSTA, Luzia Mayanne Oliveira; COELHO, Matheus Bandeca; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramjln@hotmail.com

As limas de níquel-titânio são, atualmente, objeto de vários estudos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa Protaper quanto capacidade de modelar, de preservação da curvatura original e o transporte apical em canais radiculares curvos simulados. Trinta canais radiculares simulados em blocos de resina foram selecionados e divididos aleatoriamente em três grupos (n=10) e preparados utilizando os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa do sistema Protaper. Fotografias padronizadas foram realizadas antes e após a instrumentação dos canais. Após a superposição das imagens, a quantidade de resina removida, tanto da parede interna como da parede externa, assim como, os ângulos de máxima curvatura do canal, antes e após a instrumentação e o transporte do canal radicular foram medidos. Foi aplicado o teste Anova One-way para avaliar se havia diferença das áreas desgastadas internas, externas, total e do transporte do forame entre os grupos. O grupo Reciproc obteve maiores valores de desgaste da parte interna, a UnicOne desgastou de forma semelhante as áreas interna e externa. A Protaper atingiu os maiores valores em relação ao transporte do canal radicular. Todos os instrumentos foram seguros e capazes de manter a curvatura original do canal radicular, no entanto, os instrumentos UnicOne produziram formas mais conservadoras.

O PSICÓLOGO ESCOLAR E UMA PROPOSTA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL. PROMOVENDO A CONGRUÊNCIA, LOGO, A SAÚDE PSICOLÓGICA

SANTOS, Carla*; LEAL, Carlos Santos

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: c-leal1@hotmail.com

O conceito de vocação que se propõe, trata-se do conceito citado por Marinho-Araújo (2013): a vocação de encontrar ou criar sentidos de vida. Declara que por trás da busca de uma profissão, está a busca do sentido. Todos são chamados a fazer algo da existência. Todos têm vocação! Entende-se por vocação o chamado a ser pessoa. Há muitos caminhos e a profissão é um deles. A vocação de caráter amplo adotada neste trabalho, se identifica com a perspectiva de Andrade, Meira e Vasconcelos (2002) para os quais para a OV cumprir com sua real finalidade, deve ser operacionalizada de maneira coerente, informando sobre as carreiras profissionais e promovendo o autoconhecimento. Na facilitação da escolha profissional, a OV deve ajudar a formar cidadão em seu sentido pleno, pois ajuda a encontrar uma identidade profissional, auxilia a estruturar uma identidade pessoal, possibilitando a elaboração de um projeto de vida de responsável e consciente. Nesse sentido, mais do que escolher uma profissão, a OV auxiliaria a adaptar-se à vida. Encontrando ressonância da importância desse aspecto no CFP (2000 apud CARVALHO, 2008), pois para ele a escolha profissional não é um momento estático no desenvolvimento de um indivíduo, pelo contrário, é um comportamento que se inclui num processo contínuo de mudança da personalidade. Afirmam quão importantes é que se trabalhe para que o jovem compreenda-se como um ser em movimento que pode mudar seus interesses e possibilidades no decorrer da vida.

FACETAS DIRETAS

SANTOS, Sara Freitas*; ALMEIDA, Karoline Guará Brusaca

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramijn@hotmail.com

Tendo em vista a evolução da odontologia adesiva e dos materiais restauradores diretos, tornou-se possível desenvolver técnicas reabilitadoras mais eficientes, de rápida resolutividade, baixo custo e de boa longevidade, como soluções estéticas para corrigir anomalias dentárias de cor, textura, forma, tamanho e posição. Por requerer pouco ou até mesmo nenhum desgaste de tecido dentário, esse tipo de procedimento representa uma alternativa restauradora mais conservadora. O trabalho tem por objetivo demonstrar a eficácia dessa técnica, bem como evidenciar que o resultado final é satisfatório, natural e harmonioso. Para a confecção das facetas diretas, o profissional, além de estabelecer um correto diagnóstico e traçar um plano de tratamento, deve também possuir conhecimento teórico, experiência clínica, habilidade manual e sensibilidade na escolha de resinas que criem o policromatismo da estrutura dental. Ao realizar restaurações estéticas, o profissional deve sempre levar em consideração a preservação da estrutura dental sadia, primar pela odontologia restauradora atual, pela obtenção da harmonia do sorriso e pela plena satisfação do paciente.

INCIDÊNCIA DE CÂNCER EM SÃO LUÍS – MA: ESTIMATIVA PARA 2014

SANTOS, Mayara Gomes*; SANTOS, Gedyanne Máylla Aguiar; CÂMARA, Thalita de Albuquerque Vêras

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: mayaragomessantos@hotmail.com

No mundo, ainda são relativamente poucos os estudos sobre a incidência e mortalidade por câncer em adultos. Foi realizado pelo Instituto Nacional de Câncer um estudo descritivo da incidência da morbidade e da mortalidade do câncer no Brasil para 2014. O objetivo principal do presente estudo é destacar os dados referentes ao estado do Maranhão e na capital São Luís, onde observou-se o câncer de próstata como predominante em homens e o câncer de mama nas mulheres. No Brasil, estima-se um total de 68.800 casos novos de câncer de próstata, no Maranhão 80 novos casos para 100 mil habitantes e 57.120 casos novos de câncer de mama, no Maranhão estima-se um total de 40 novos casos de câncer de mama feminino para cada 100 mil habitantes, sendo 30 casos na capital São Luís.

Em conjunto, os resultados apresentados retratam um padrão epidemiológico de câncer no Brasil, evidenciando o estado do Maranhão e sua capital São Luís que apresentam características regionais de distribuição semelhantes ao restante do país. As estimativas apresentadas são mais uma ferramenta importante para o desenvolvimento do sistema de vigilância do câncer, que tem como grande desafio colocar em prática o uso dessas informações e o conhecimento da realidade do país, para que as necessidades da população sejam priorizadas e atendidas pela política pública de saúde, conforme preconizado no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil pelo Ministério da Saúde.

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DO ÍNDIO

SENA, Pacitta R. A. de*; KERBER, Giselle Dutra; OLIVEIRA, Abrahão Limeira de.

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: cittapa@gmail.com

O presente trabalho se fundamenta nos estudos de Alimentação e Nutrição Indígena Brasileira. A OMS preconiza indicadores de estado nutricional de grupos populacionais, o crescimento físico, as transições epidemiológicas, a renda para aquisição de alimentos e a salubridade ambiente. O atendimento à saúde na forma de prevenção e tratamento de suas enfermidades e a redistribuição de renda são fatores que auxiliam na identificação do perfil nutricional de grupos específicos que se inserem na população brasileira e que durante as últimas décadas, são avaliados de forma incompleta dentro de suas especificidades. Foi realizado levantamento bibliográfico com o objetivo de fundamentação teórica. Encontraram-se publicações de avaliações antropométricas, antropológicas e socioeconômicas de populações indígenas de Rondônia- etnia Suruí, de Pernambuco-etnia Yorubá, Rio Grande do Sul-Kaingang e Guarani e Paraná-etnia Kaingang em formas de artigos, tese e documentos de estudos em saúde do índio. Os documentos mais abrangentes ainda assim limitados ao tempo de realização: transversais e as poucas etnias analisadas. As amostras de indivíduos variavam entre 48 e 146 e o detalhamento do ponto de vista demográfico com respeito a morbidade e epidemias. Conclui-se que o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil é muito pouco conhecido, decorrente da escassez de investigações, ausência de censos, de outros inquéritos regulares e da falta de precisão do sistema de registro de informações sobre morbidade, mortalidade e cobertura vacinal (Coimbra Jr & Santos, 2000).

LAMINADOS CERÂMICOS COMO UMA OPÇÃO CONSERVADORA

SILVA, Mônica Barros*; BARROS, Laysa da Cunha1; MARIZ, Débora2; MOUCHREK, Adriana3 ; Sâmará4

*1,2,3,4 Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: nicabs_@hotmail.com

A Odontologia estética tem tomado proporções maiores com a disseminação desenfreada de um novo paradigma de beleza nos meios de comunicação, que se traduz em dentes claros e alinhados. Isso tem ocorrido graças às novas tecnologias embutidas aos materiais, mais precisamente às cerâmicas e aos materiais resinosos, garantindo maior resistência ao material e forte união do laminado ao dente. Essas características possibilitam a adoção de técnicas mais conservadoras, que exigem uma menor espessura de cerâmica para uma mesma resistência requerida e permitem formação de uma estrutura extremamente resistente. Porém, diante de todas essas vantagens, os laminados cerâmicos não são indicados para todos os casos, sendo necessário prévio planejamento do caso e averiguação da possibilidade de uso da técnica. Se verificada viabilidade, o importante para que haja sucesso no tratamento é dar o valor merecido a todas as etapas do planejamento, pois o bom resultado sucede disso. O objetivo desse estudo foi discutir através de revisão de literatura aspectos cruciais da técnica, como a quantidade de desgaste necessário e o tipo deste, a eficiência da união cerâmica-substrato, os tipos de cerâmicas utilizados e as indicações e contra-indicações da técnica. Concluiu-se que ainda não existe um protocolo a ser seguido relacionado à quantidade de desgaste dentário, mas sabe-se que deve estar restrito ao esmalte, objetivando a união forte e duradoura; a cerâmica possui alta resistência, porém está contraindicada em alguns casos específicos; as cerâmicas utilizadas com muito bons resultados estéticos são as feldspáticas e as compostas por dissilicato de lítio.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE ARDÊNCIA BUCAL

SILVA, Glahudson Henrique de Lucena*; COSTA, Victor Gomes; MAIA, Livia Maria Pereira; CALDAS, Bruno Oliveira; LEMOS, Marcony Araújo; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: victorgomes.vgc@hotmail.com

A Síndrome da ardência bucal é caracterizada como uma queimação bucal que conseqüentemente vem acompanhado de outros sintomas como: dor, sensação de boca seca, irritação e entre outros. Acomete frequentemente pessoas idosas, e de meia idade, principalmente mulheres no período pós-menopausa. Por não apresentar sinais aparentes como lesões na mucosa bucal associados aos sintomas, encontra-se a dificuldade de um diagnóstico mais preciso de acordo com a presença dos demais fatores, assim sendo, a presença de leões seria um dos sinais para a exclusão do diagnóstico da síndrome, sendo necessário também traçar um perfil psicológico do paciente. Existem diagnósticos diferenciais que podem ser confundidos com SAB, como: fatores nutricionais, falta de vitaminas A, C, B12, hipossalivação e síndrome da seca, além da candidíase, que esta relacionada a síndrome desta, por que invade a mucosa oral e induz no processo inflamatório chegando uma sensação de queimação. Pode-se citar que a área mais afetada da síndrome é a língua. Contudo é de responsabilidade do cirurgião dentista saber identificar, avaliar disfunções sistêmicas e psicológicas, para poder orientar seu paciente na escolha do melhor tratamento, pois deverá analisa-lo como um todo e não somente pela alteração bucal.

ENDOCARDITE INFECCIOSA: DESMISTIFICANDO TABUS

SILVA, Fabiola Ayanne Costa*; CARVALHO, Ceci; STANLEY, Reidson; MEDEIROS, João; PINZAN, Célia; ROCHA, Adrícylla Teixeira; GURGEL, Julio

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: adricyla.tr@outlook.com

A Endocardite infecciosa é uma patologia que se instala no tecido de revestimento interno do coração, abrangendo as válvulas cardíacas, pulmonares e a aórtica. É causada por uma bacteremia transitória associada a uma lesão prévia das válvulas ou do tecido cardíaco e acarreta risco de vida ao paciente. Embora seja incomum, pode resultar em alta morbidade e mortalidade. Pode ser causada por vários microrganismos que estão presentes na cavidade bucal compondo a microbiota complementar. A prevenção desta entidade patológica deve ser considerada de extrema importância pela classe odontológica. Todos os pacientes que sejam de risco para a endocardite infecciosa devem manter a saúde bucal no mais alto nível, com atenção aos portadores de doenças inflamatórias que possam dar origem a bacteremias. A partir de uma revisão da literatura, o presente trabalho busca trazer informações sobre a etiologia microbiana, fatores e condições de risco, assim como a antibioticoterapia profilática relacionada aos procedimentos odontológicos. O conhecimento da referida patologia e a aptidão em intervir de maneira correta é essencial para a atuação segura do Cirurgião-dentista.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSÃO DE ALUNOS SURDOS BILÍNGUES DO ENSINO MÉDIO

SILVA, Joadson Matias da*; MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro; LIMA, Michele de Fátima Ferreira; FAÇANHA, Rachel Costa

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: jofono2014@outlook.com

Este estudo teve por objetivo analisar a competência de palavras de alunos surdos da 1ª a 2ª série do ensino médio, bem como descrever as estratégias de mediação utilizadas nestas tarefas, por profissionais falantes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada no Atendimento Educacional Especializado (AEE) da escola que utiliza o Bilinguismo como referencial filosófico. Participaram onze alunos, estudantes do ensino médio. A coleta de dados foi realizada com os alunos, na presença de dois mediadores, uma fonoaudióloga e um tradutor intérprete de Libras. A análise dos dados mostra que 8 (oito) alunos realizaram a leitura através da rota lexical e 3 (três) através da rota fonológica. Todas tiveram mais dificuldade na compreensão de palavras de baixa frequência. As oito crianças que leem através da rota lexical alcançaram uma compreensão apenas parcial do livro e, por meio da mediação, conseguiram alcançar os conteúdos explícito e implícito do texto. A mediação em Língua Portuguesa não foi suficiente para este propósito, sendo essencial a mediação em LIBRAS. Os três alunos que ainda leem através da rota fonológica apre-

sentaram mais dificuldades na compreensão do livro e, mesmo com mediação nos dois idiomas, alcançaram apenas parcialmente o significado da história. Todas as estratégias de mediação analisadas foram utilizadas pelos dois profissionais, sendo estas: perguntas eliciadoras de clarificação, perguntas eliciadoras de orientação, pergunta provocativa, intervenção através de estratégia ascendente/ descendente, pergunta reformulada, regulação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e ativação de conhecimento de mundo.

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NOS RESULTADOS DOS EXAMES DO COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA EM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DJALMA MARQUES

SILVA, Ícaro Morais de Oliveira*; NUNES, Joana Katya Vêras Rodrigues Sampaio; SILVA, Flor de Maria Araújo Mendonça

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: icarotes@hotmail.com

A neoplasia maligna do colo do útero é um grave problema de saúde pública para mulheres de países em desenvolvimento, sendo o primeiro ou segundo câncer ginecológico mais comum (INCA, 2012). Atualmente, existem grandes dificuldades encontradas pelas pacientes para realização do exame e acompanhamento do seu diagnóstico na rede pública, que estão relacionados diretamente ao baixo nível sócio-econômico. O objetivo geral foi implementar estratégias no processo diagnóstico da Colpocitologia Oncótica no Centro de Saúde Djalma Marques.

REMODELAÇÃO NA INTERFACE OSSO IMPLANTE

SILVA, Fabíola Ayane Costa*; ALBINO, Laíla da Veiga;. ARAUJO, Osmar Neto; GONÇALVES, Antonia Cláudia; SILVA, Jéssica Karla Silva;. TAVARES, Rudys Rodolfo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: fafa_ayane@hotmail.com

Os implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionados cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir raízes dentárias. Antes da colocação de qualquer implante é de suma importância o conhecimento do profissional em relação à estrutura óssea à qual será colocado o implante e também a sequência do processo de remodelação óssea.

CLAREAMENTO INTERNO - RISCOS E BENEFÍCIOS

SOARES, Felipe Simões*; FILHO, José Reinaldo Pereira Reis; SOUSA, Waltonne Silva; GOMES, Isabella Azevedo; MAIA, Marina de Figueiredo Lopes

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: felipe_simoes17@hotmail.com

Atualmente o valor estético tem se tornado um dos principais fatores motivadores para uma busca por tratamento odontológico. Levando em consideração a importância de um sorriso dentro de uma estética facial, é justificável a preocupação acerca da pigmentação de dentes, principalmente os dentes anteriores e algumas vezes os pré-molares. Isso motivou o desenvolvimento de técnicas e materiais que proporcionem um resultado satisfatório na busca por um sorriso harmonioso pelo paciente. No passado os dentes que tinham alguma alteração de cor sofriam desgastes, para que em seguida, fossem restaurados através de procedimentos restauradores diretos ou indiretos. Não raramente os dentes não vitais sofrem algum tipo de alteração na coloração, geralmente devido a: materiais restauradores, hemorragia intracoronária, decomposição de detritos intrapulpares, medicamentos intracanal e materiais obturadores. Os resíduos formados nesses processos podem penetrar através dos túbulos dentinários, resultando na descoloração dental. As substâncias utilizadas para o clareamento são: peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida e o perborato de sódio. Estes agentes clareadores atuam na mancha através de reações de oxidação. Quando observado a indicação para este tipo de tratamento e tomado os cuidados básicos para a sua realização, o clareamento dental interno é um passo da terapia odontológica simples e de resultados controlados, possibilitando confiança e conforto para o paciente que busca um perfil estético capaz de alterar significativamente a sua autoestima. Este trabalho visa esclarecer, através de uma revisão de literatura, este tipo de tratamento, bem como as substâncias utilizadas, os cuidados necessários e os riscos decorrentes de sua realização.

UTILIZAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO E PLACAS E PARAFUSOS REABSORVÍVEIS EM ODONTOLOGIA

SOUSA, Albert Alexandre Costa de*; COSTA, Iasmin Lima*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos*

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

E-mail: Albertalexandre@hotmail.com

Nos últimos anos, o tratamento de fraturas do complexo bucomaxilofacial evoluiu bastante, principalmente após o advento de técnicas de fixação interna rígida e desenvolvimento de novos materiais. Destaca-se nesse contexto, a utilização de matérias reabsorvíveis, os quais apresentam algumas vantagens sobre os dispositivos metálicos, especialmente quando utilizados em população pediátrica. O titânio, muito difundido nos últimos 25 anos é, todavia, mais viável financeiramente e apresenta características físicas e biológicas que ainda o mantém como principal escolha na fixação de segmentos fraturados ou osteomizados. Neste contexto, o nosso trabalho apresenta uma revisão de literatura trazendo uma comparação entre as características de cada material, tais quais se traduzem em vantagens e desvantagens dos materiais reabsorvíveis ou metálicos, tal como as indicações de forma específica e pontual para as placas de titânio.

A INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DO DISCO ARTICULAR NA DINÂMICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

SOUZA, Wenny Karolliny Moreira*; FERREIRA, João Thalison Aire;. FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros;. SILVEIRA, Luiza Carneiro;. CORREA, Silvan

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: wenny.moreira@hotmail.com

A articulação temporomandibular (ATM) pode ser considerada uma das mais complexas do organismo humano, pois é a única que executa onze tipos de movimentos e ainda é rica em células mesenquimatosas, que garantem seu poder regenerativo. O disco articular compõe a ATM juntamente com a cápsula, a cabeça da mandíbula, fossa mandibular e eminência articular, que ainda possui em seu interior o líquido sinovial ou sinóvia, que é essencial para lubrificação e nutrição da articulação. O posicionamento adequado do disco é de grande importância para a morfofisiologia apropriada da ATM, visto que as alterações do mesmo são consideradas uma importante causa da disfunção temporomandibular (DTM), que pode ser caracterizada por dor facial, estalidos, crepitações, disfunções e etc. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo realizar estudo através de uma revisão literária especializada nacional e internacional, utilizando artigos e periódicos para avaliar a morfologia e as possíveis desordens do disco articular, sua localização e importância na articulação temporomandibular.

TERAPIA PULPAR EM DENTES DECÍDUOS: POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS E MATERIAIS OBTURADORES

TORRES, Mirna Karolline Lima*; LIMA, Ana Carolina Costa de; DANTAS, Rossana Vanessa

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: mirna.lima@hotmail.com

A terapia pulpar em dentes é uma das especializações de odontopediatria que aborda aspectos referentes ao diagnóstico e tratamento desses dentes, dando ênfase aos materiais obturadores utilizados e aos tipos de procedimentos utilizados por cirurgiões dentistas em Imperatriz. Objetivo: Identificamos as principais terapias eficazes e duradouras em dentes decíduos. Metodologia: As pesquisas de campo foram realizadas na cidade de Imperatriz, de forma conveniente, com o objetivo de selecionar profissionais conhecedores em tratamentos pulpares. Uma das formas utilizadas foram os questionários quantitativos (percentuais), tanto na rede pública quanto na privada, como forma de avaliar a frequência dessas terapias e das pastas obturadoras e realizou-se um teste piloto com

10% da amostra, para ajuste do questionário e os procedimentos as terapias pulpares em dentes decíduos. Os dados obtidos foram tabulados e analisados estatisticamente através do software Excel. Conclusão: Os CD's entrevistados utilizam várias técnicas de terapia pulpar em dentes decíduos, destacando-se o hidróxido de cálcio como a pasta obturada mais utilizada, porém o sucesso deste tratamento se mostrou insatisfatório, reforçando a necessidade de métodos adicionais no tratamento desta alteração.

INFLUÊNCIAS DA CULINÁRIA MARANHENSE E SEUS PRINCIPAIS PRATOS

XEREZ, Nayana de Paiva Fontenelle*; HORTEGAL, Elane Viana; MOURA, Daniela Alves; SOARES, Bárbara Costa; TEIXEIRA, Joelma Ximenes Prado; ROCHA, Marina Souza

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: nayana.fontenelle@bol.com.br

A culinária maranhense sofreu influência de demasiadas culturas: francesa, holandesa, portuguesa, indígena e africana. A gastronomia francesa marcou muito o local, mas a portuguesa e indígena são as mais predominantes. Os costumes indígenas deixaram marcas indeléveis na nossa população cabocla que ainda hoje usa técnicas de seus antepassados silvícolas, como, no tratamento das comidas assadas e moqueadas. A colonização portuguesa deu-nos a tradição de sua opulenta cozinha, o gosto pelas carnes, ovos, cebola, alho, os cheiros, o cominho, as conservas, os caldos, banha de porco, a manteiga e os famosos doces conventuais. O objetivo do estudo foi identificar pratos típicos Maranhenses mais servidos e descobrir suas principais influências históricas. Tratou-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de revisão literária e com aspectos quantitativos, dividido em três etapas: levantamento bibliográfico, coleta de dados e análise de preparações mais servidas. As preparações foram catalogadas em livros de culinária regional, selecionando os pratos típicos mais comuns entre as preparações salgadas e doces, que apresentaram modo de preparo. As preparações que não apareceram em mais de três referências não foram incluídas na pesquisa. Como resultados, foram verificadas 48 preparações, desses 12 pratos doces, equivalentes de sobremesa, 2 preparações equivalentes de pão, 8 preparações equivalentes de arroz, 6 equivalentes de guarnição, 18 equivalentes de carne e 1 equivalente de legumes e hortaliças. Conclui-se que a mistura de elementos afro-indígenas e portugueses tornou a culinária maranhense eclética e saborosa e o conhecimento da cultura alimentar de um povo possibilita o entendimento da construção de sua história.

PERFIL DOS INDIVÍDUOS QUE BUSCAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “AMAR”.

VERAS, Nicole Paiva*; FERREIRA, Ana Cláudia Meire Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: npaivaveras@gmail.com

A Diabetes Mellitus é um sério problema de saúde na atualidade, pois interfere no modo de vida do indivíduo acometido. Esta doença pode ser associada com outras condições sistêmicas e locais que fazem dela uma prioridade no programa de atenção básica no Brasil. Existem basicamente 10 tipos de diabetes. As mais comuns são a Diabetes Mellitus tipo 1 (autoimune), Diabetes Mellitus Tipo 2 (geralmente hereditária), Diabetes Gestacional (desenvolve-se durante a gravidez) e a Diabetes Insipidus (não provoca mudanças na quantidade de açúcar no sangue). O Protocolo de Diagnóstico e Acompanhamento de Pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 2 em Serviços de Atenção Primária à Saúde, do Serviço de Saúde Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) relata que em uma equipe de Atenção Primária à Saúde, todos os profissionais deverão estar aptos a identificar a DM e também devem conhecer o protocolo da doença. Dentre estes, cita-se o dentista, que pode atuar em equipes de saúde multidisciplinares, desenvolvendo atividades de promoção e educação em saúde que contemplem simultaneamente a saúde integral de indivíduos e coletividades, proporcionará uma elevação dos níveis de saúde da população. O atendimento interdisciplinar envolvendo profissionais da mesma unidade de saúde e a atenção em todos os níveis do sistema são fatores essenciais para a integralidade das ações em saúde no atendimento ao indivíduo com Diabetes Mellitus.

PAINEL REVISÃO DE LITERATURA

CÂNCER E SEUS PRINCIPAIS FATORES

ALMEIDA, Steffanny de*; FREITAS, Tayane; CRISTINA, Yara; ARAÚJO, TEIXEIRA, Leysa; TEIXEIRA, Luenna; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: tayane_freitas_@hotmail.com

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo.

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. Os fatores de risco de câncer podem ser encontrados no meio ambiente ou podem ser herdados. A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias químicas e afins) o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida). As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os 'hábitos' e o 'estilo de vida' adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos de câncer.

AVALIAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE QUANDO COMPARADA A BETAMETASONA EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES.

ARAÚJO, Mariana Tavares*

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: marit.araujoo@gmail.com

A remoção cirúrgica de terceiros molares inclusos é uma das cirurgias mais rotineiramente realizadas nos consultórios dos cirurgiões bucomaxilofaciais. Ainda que seja um procedimento que, na maioria das vezes, decorre sem grandes complicações, dor e edema pós-operatório, são consequências frequentes e indesejáveis, resultantes do processo inflamatório, que tem começo no trauma cirúrgico. O laser de baixa intensidade (low level laser therapy – LLLT) é um aparelho que emite radiações de baixas potências, sem potencial destrutivo. É benéfico e, dependendo da dose aplicada no comprimento de onda, irradiação, tempo de aplicação e as condições do tecido tratado, podem ser atingidas diferentes respostas biológicas, provocando um aumento do metabolismo celular, aumentando o potencial regenerativo e promovendo um efeito anti-inflamatório, como analgesia e vasodilatação. Objetiva comparar a eficácia do laser de baixa intensidade com a betametasona por via oral uma hora antes do procedimento

EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM A TCFC

BARROSO, Carolina Marques*; ARAÚJO, Randerson de Sousa; VIEIRA, Clarissa Lopes; DA SILVA, Marcos André dos Santos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: randersonsa@hotmail.com

A Radiologia odontológica assim como outras áreas da odontologia passou por profunda evolução tecnológica nos últimos anos. Exames convencionais como a radiografia panorâmica e as radiografias intra-orais evoluíram para o formato digital. Os aparelhos mais recentes trazem vantagens relevantes em relação aos métodos convencionais, tais como: maior resolução e contraste, menor dose de radiação ao paciente, otimizar o tempo, evitam repetições dos exames pelos erros de processamento. O avanço mais importante para odontologia, em geral foi a chegada da tomografia computadorizada cone-beam ou feixe cônico (TCFC). Desde 1980, a Odontologia tem se beneficiado de vários tipos de tomografia como a linear, multidirecional computadorizada fan-beam. Porém foi a tomografia cone-beam que atendeu satisfatoriamente à ne-

cessidade de imagem mais detalhadas e fiéis à anatomia da região da cabeça e pescoço utilizando baixa dose de radiação. Essa maior necessidade ficou evidenciada a partir do trabalho em reabilitação oral e facial com implantes osseointegrados. Nesse intuito, nosso objetivo será apresentar as novidades da TCFC do diagnóstico por imagem na odontológica.

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES EM ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA

BRASIL, Paloma Dourado*; GASSMANN, Hildenesa; CORREA, Silvan

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: palomabrasil07@gmail.com

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo através de revisão de literatura especializada com periódicos nacionais e internacionais dos últimos cinco anos acerca de acidentes e complicações em anestesia local na odontologia. Portanto, destacando-se as metodologias utilizadas para evitarmos tais condições, através da utilização de técnicas anestésicas adequadas, tendo como primícia uma anamnese criteriosa. Espera-se que desta forma a realização de técnicas obedecendo aos princípios que as normatizam de acordo com a literatura especializada, portanto contribuindo de maneira favorável na clínica diária do cirurgião-dentista.

FORMAS FARMACÊUTICAS UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA

BRASIL, Paloma Dourado*; GASSMANN, Hildenesa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: palomabrasil07@gmail.com

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise através da revisão de literatura acerca das formas farmacêuticas utilizadas em odontologia. As formas farmacêuticas agrupam as substâncias que constituem os medicamentos para facilitar a sua utilização pelo paciente, e podem ser divididas em: sólidas e líquidas. As sólidas são divididas em: granulados, comprimidos, drágeas e cápsulas. Já as líquidas são divididas em: emulsões, suspensões, aerossóis e soluções. Cada forma farmacêutica possui uma via de administração adequada para suas características. Portanto, destaca-se a observação de tais formas, de como elas são empregadas na odontologia e do benefício para as mesmas na clínica diária do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CAUSADAS POR ANTI-INFLAMATÓRIOS

BRASIL, Paloma Dourado*; GASSMANN, Hildenesa; SARTÓRIO, Raianne Coelho; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: palomabrasil07@gmail.com

As interações medicamentosas ocorrem quando o paciente administra dois ou mais fármacos, ou princípios ativos. Essas interações podem ser benéficas ou malélicas ao resultado esperado no organismo do paciente. Portanto, o profissional da saúde, deve atentar-se para os medicamentos que o paciente possa estar utilizando, para que assim o tratamento medicamentoso prescrito por ele não seja prejudicado pelas interações que possam surgir. No presente trabalho iremos abordar uma revisão de literatura que trata sobre as interações medicamentosas relacionadas ao uso de anti-inflamatórios hormonais e anti-inflamatórios não esteroidais. É de suma importância que o profissional da saúde esteja apto a fazer o diagnóstico dessas interações indesejáveis, e tentar preveni-las ao máximo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CAUSADAS POR MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

BRASIL, Paloma Dourado*; GASSMANN, Hildenesa; SARTÓRIO, Raianne Coelho; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: palomabrasil07@gmail.com

Os medicamentos que atuam no Sistema Nervoso Central do paciente, ou seja, as fórmulas farmacêuticas psicoativas, podem influenciar diretamente no tratamento do cirurgião-dentista, pois podem causar interações medicamentosas rele-

vantes para o paciente. É extremamente comum na clínica odontológica a anamnese de pacientes que fazem uso desses medicamentos, então é necessário que o cirurgião-dentista esteja apto para reconhecer e prevenir as interações medicamentosas indesejáveis, e que da mesma forma esteja apto para conduzir o seu tratamento da melhor maneira, fazendo com que se houver uma interação medicamentosa, essa não atrapalhe a desenvoltura do tratamento odontológico. O presente trabalho abordará uma revisão de literatura sobre as interações medicamentosas das fórmulas farmacêuticas psicoativas e as drogas utilizadas na odontologia.

RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL COM A PNEUMONIA NOSOCOMIAL

CARVALHO, Caroline Gomes*; GOMES, Isadora Carvalho; COSTA, Kamila Nogueira Borges; MUNIZ, Naylla Mouzinho, NUNES, Livia Helena Castro

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: carolinegomes@hotmail.com

A doença periodontal tem caráter infecto-inflamatório com presença de bactérias gram-negativas, e está diretamente ligada ao acúmulo de biofilme nas faces dentárias, em que os microrganismos presentes atuam como foco de disseminação de maneira metastática no ser humano. Os pacientes críticos que possuem uma baixa no sistema imunológico são mais suscetíveis, destacando-se aqueles internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) devido à deficiência na higiene bucal pela mínima atenção depositada nesse aspecto pelos profissionais responsáveis paralelamente as características como boca xerostômica e pH ácido, assim, favorecendo um aumento do biofilme e a disseminação das bactérias a partir da orofaringe contaminando as vias respiratórias inferiores, resultando em altas taxas de morbidade e mortalidade. O objetivo desse estudo foi verificar através de uma revisão de literatura por um levantamento bibliográfico a relação entre os pacientes portadores de alterações periodontais e presença de biofilme com as alterações do sistema respiratório. Na bibliografia coletada enfatiza-se o controle da higiene bucal nos pacientes internados na UTI pelos cirurgiões-dentistas e o desenvolvimento de pneumonias, comumente a pneumonia nosocomial. Ressalta-se a suma importância da presença de uma equipe multidisciplinar, visando um tratamento do paciente em seu aspecto global, onde a participação da equipe odontológica tem papel de destaque, contribuindo assim para a manutenção da homeostase da cavidade bucal.

USO DA FITOTERAPIA DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

CASTRO, Bruno Rodrigo Amorim*; ARAÚJO, Randerson de Sousa; ARAÚJO, Randerson de Sousa; COSTA, Cyrene Piazero Silva

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: bruno_castro7@hotmail.com

A Fitoterapia é definida como o ramo da ciência médica que emprega plantas medicinais, drogas ou extratos vegetais, para tratamento de enfermidades, não incluindo qualquer substância de outra origem. O emprego dos fitoterápicos tem como objetivo a prevenção, cura ou diminuição dos sintomas das doenças, com um custo mais baixo e bastante acessível à população e aos serviços públicos de saúde. O uso da Fitoterapia na Odontologia foi reconhecida e regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, no dia 19 de novembro de 2008, através da Resolução nº 082/2008-CFO. Hoje o Ministério da Saúde classificou o fitoterápico como um medicamento. Por isso, ele só deve ser vendido sob prescrição profissional, onde as normas para seu registro e apresentação são semelhantes às dos medicamentos de síntese.

O uso de plantas medicinais na Odontologia é ainda muito recente o que torna a procura pelo assunto escasso. Alguns profissionais da saúde, em geral, são ainda pouco informados sobre o uso correto da Fitoterapia, o que os torna duvidosos em relação a sua eficácia. É importante que tais informações estejam ao seu alcance, por meio de artigos e cursos de atualização, para que o seu uso seja incentivado, resguardando a saúde do paciente e consolidando tão importante vertente terapêutica.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS

CUNHA, Hacemyra* ; MARAMALDO, Juheyna; MUNIZ, Paloma ; OLIVEIRA, Rafyza; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hacemyracunha@gmail.com

CID (Classificação Internacional de Doenças) é um programa que tem como objetivo padronizar e classificar todas as doenças do planeta, tendo como prioridade estabelecer uma ordem para codificação de doenças. Foi criada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) com o intuito de auxiliar e buscar o diagnóstico para finalidades gerais como doenças não fatais, sinais das doenças, sintomas, queixas, circunstâncias, causas para cada problema de saúde e também para codificar e classificar os dados de mortalidade de atestados de óbitos. Esses códigos foram classificados por uma letra seguida por três números compondo quatro caracteres. As primeiras revisões da classificação foram usadas para causas de morte, só a partir da sexta revisão que tiveram finalidades de incluir doenças não fatais, logo depois ocorreram algumas inovações onde foi criada a nona revisão para fins experimentais. Chegando a décima, onde houve uma inovação com uso de esquema de código alfanumérico. O aperfeiçoamento do CID-10 entre os cirurgiões dentistas e a perícia odontológica no trabalho foi extremamente necessária. Antes da sua atualização se tratava de uma classificação precária para a área de odontologia. Uma das alternativas vista, além da atualização da CID é a CID-OE (Classificação internacional de doenças em estomatologia odontológica) que é mais específica e detalhada em alguns casos para a odontologia, onde teve abrangências com relação a mais patologias.

BISFOSFONATOS E SUA REPERCUSSÃO NA CAVIDADE BUCAL

DE SOUSA, Vinícios Coelho*; Virma; Giulianna; Elida; DOS REIS, Washington Luis Machado; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: viniciosousa07@hotmail.com

Os Bisfosfonatos (Pamidronato) são medicamentos utilizados para o tratamento e prevenção de doenças de metabolismos ósseos como a osteoporose e osteopenia, tendo ação terapêutica sobre as mesmas. Ultimamente ela tem sido a droga mais prescrita para o tratamento da osteoporose no mundo. Consequentemente com a grande demanda desse medicamento, foram relatados casos frequentes de lesões ósseas em mandíbula e/ou maxila justificando os efeitos adversos do uso prolongado desse fármaco. Além do mais foram observados casos de alterações bucais como, inibição da angiogênese, indução de queratinócitos a apoptose e presença de ulceração na própria cavidade oral e no esôfago. Caso o paciente não apresente nenhuma dessas lesões ele estará sujeito a adquirir uma lesão chamada BRONJ (Biphosphonate related osteonecrosis of the jaw). A BRONJ é uma lesão dolorosa e que não cicatriza. Tendo essas e outras alterações patológicas em mente, é cabível ao cirurgião-dentista diagnosticar e tomar certos cuidados com relação a alguns procedimentos inclusive extração, pois existe uma grande dificuldade de cicatrização nessa região.

UMA INTERVENÇÃO BIOPSISSOCIAL NA ÁREA DE ONCOLOGIA COM CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES: MINIMIZANDO OS IMPACTOS DA HOSPITALIZAÇÃO SEGUNDO A PERSPECTIVA HUMANISTA.

DINO, Alice Martins Costa Jorge*; CASTRO, Uilton Mota; RODRIGUES, Samara Morita de Freitas; FARIA, Simony

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: alicejdino@hotmail.com

O presente estudo visa discutir o trabalho do psicólogo hospitalar na área de oncologia pediátrica com crianças advindas do interior do estado do Maranhão. Essas crianças deixam sua casa, família, escola e seus amigos para se submeterem a um longo e difícil tratamento. Diante do processo de saúde e doença, cada criança percebe a hospitalização de maneira particular e também assim manifesta seu sofrimento, suas dores e angústias. Por tudo isso, o ambiente hospitalar, trás aspectos desencadeantes de sofrimento relacionados a estrutura física não-familiar, ao controle dos horários, as medicações, ao ambiente agora coletivo, bem como, o do distanciamento do seu mundo infantil. As famílias também passam por angústias e medo do desconhecido, utilizam estratégias de defesa evitando falar da hospitalização, estabelecer relações com os outros acompanhantes evitando mostrar suas fragilidades como o choro e não aceitação de todo o processo relativo ao câncer. Diante do exposto, o acompanhamento psicológico faz parte integrante de todo o tratamento oncológico, facilitando, desse modo, a adesão e o entendimento dos sentimentos envolvidos desde o diagnóstico, o tratamento, a cura ou ao processo de finitude, seja este a criança assistida ou o seu familiar. Dessa forma, é fundamental que equipe multidisciplinar trabalhe coesa e harmônica, distribuindo entre seus membros as tarefas que competem a cada tipo de especialidade da equipe de saúde, salientando que todos são importantes na construção do espaço terapêutico e em todo o percurso do tratamento.

AFEÇÕES ESTOMATOLÓGICAS ORIUNDAS DE FÁRMACOS

GOMES, Isadora Carvalho*; SOUZA, Wennya Karolliny Moreira; FONSECA, Fernanda Costa Barros; OLIVEIRA, Luciane Souza Silva; MUNIZ, Naylla Mouzinho; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: isaadora-@hotmail.com

Os medicamentos ocupam um lugar dominante no sistema de saúde e no tratamento de doença. Estes por sua vez quando utilizada de forma incorreta ou prolongada tem o potencial de causar reações adversas na cavidade bucal. Algumas dessas alterações são: síndrome da ardência bucal (dor do tipo em queimação), xerostomia (sensação subjetiva de boca seca), mucosite bucal (inflamação e ulceração da mucosa bucal), Estomatite (inflamação da mucosa), osteonecrose (necrose óssea), osteíte alveolar (inflamação ou necrose do alvéolo), pigmentação (mudança na coloração do tecido mole bucal), língua pilosa (projeções semelhantes a pêlos na região dorsal), ulceração e necrose (violação do epitélio bucal ou morte de um tecido ou parte dele). Diante disso os profissionais da saúde devem estar atentos na orientação consciente dos possíveis efeitos indesejáveis provocadas por cada droga, assim, possibilita o correto diagnóstico e conseqüentemente uma adequada conduta clínica. Esta revisão literária tem como objetivo descrever através de artigos nacionais e internacionais as afecções estomatológicas oriundas de fármacos que podem produzir efeitos colaterais na cavidade oral.

AVALIAÇÃO DA COR DE RESINAS COMPOSTAS SUBMETIDAS À IMERSÃO DE DIFERENTES SOLUÇÕES

GUIMARÃES, Larissa Bertulucci*; PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar; ARAÚJO, Randerson de Sousa; LIMA, Leylanne Ribeiro Barros; GOMES, Isabella Azevedo; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: larissa0304@gmail.com

A procura pela estética tem sido uma realidade na clínica odontológica moderna. O material mais amplamente utilizado para essa finalidade é a resina composta, cuja aceitação constitui-se em um dos mais significativos avanços para a Odontologia. Porém, apesar de serem materiais de primeira escolha quando o requisito primordial é a estética, os compósitos possuem limitações que impedem sua classificação como um material ideal, como o manchamento superficial que decorre de suas próprias características. Uma das principais propriedades que interferem na estabilidade de cor dos compósitos é sua porosidade, que possibilita a penetração de corantes. Nolasco (2007) ressaltou o papel primordial da dieta, que é a fonte mais comum de ácidos que promovem a degradação superficial de materiais restauradores. Com isso, há penetração de corantes e o subsequente manchamento. Descoloração de materiais resinosos pode ser causado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Fatores intrínsecos que envolvem a descoloração do próprio material. Fatores extrínsecos como adsorção ou absorção de corante, podendo causar a descoloração (Nahsan et al 2009).

NORMAS INTERNACIONAIS

JANSEN, Paulo Ricardo de Aguiar*; MOURA, Amanda Bezerra de Oliveira de; NETO, Osmar Araújo Portela; VIEIRA, Stefanny de Almeida; MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: amandynha_olyver@hotmail.com

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos (tabela I e II do Decreto- Lei n 15/93 , e n. 1 do artigo 86 ,) tem de ser feita no modelo de receita medica aprovado pelo Despacho n. 15700/2012 , de 30 de novembro.

As receitas eletrônicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias , devendo ser impressa a indicação da respectiva via (1 via , 2 via e 3 via). Apenas podem ser prescritos em receitas renováveis, pôs medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração, ou seja, os medicamentos que constem da tabela 2 da Portaria n1471/2004, de 21 de dezembro, na sua atual redação (Deliberação n. 173/CD/2011, de 27 de outubro) Para que o processo de desmaterialização da receita seja

possível, é obrigatório que a prescrição seja realizada On-line, ou seja, no momento da prescrição, os softwares tem de validar e registrar a receita de medicamentos no sistema central de prescrições, antes da sua emissão em papel. Só receitas validadas pelo sistema e registradas centralmente são consideradas receitas eletrônicas. A quando da desmaterialização, estas receitas ficam imediatamente visíveis para as farmácias. (INFRAMED, 2012) farmacêutico poderá prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo: -medicamentos industrializados e preparações magistrais alopáticas ou dinamizadas; -plantas medicinais; drogas vegetais; -outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico.

INFLUÊNCIA DO ACABAMENTO E POLIMENTO NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DAS RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA

LIMA, Leylanne Ribeiro Barros*; ARAÚJO, Randerson de Sousa; GUIMARÃES, Larissa Bertulucci; PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; GOMES, Isabella Azevedo.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: leylannebarros@hotmail.com

Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a influência do acabamento e polimento de resinas compostas. A evolução da ciência associada à exigência dos pacientes em restabelecer não somente a função, mas também a forma e a estética de seus dentes têm motivado o desenvolvimento de materiais restauradores mais estáveis e estéticos, que simulem de maneira natural a estrutura dental. Após a etapa restauradora, é necessário o acabamento da restauração, que visa a redução do contorno grosseiro e a obtenção da forma anatômica desejada, para subsequente realização do polimento. O polimento visa reduzir a rugosidade das ranhuras deixadas pelos instrumentos utilizados na etapa de acabamento, resultando em uma superfície lisa e brilhante. Uma restauração rugosa acumula placa bacteriana, podendo promover manchamento das margens, mudança precoce de coloração, cárie secundária, agressões ao periodonto e comprometimento no brilho, resultando em uma depreciação da longevidade da restauração. Esses procedimentos tornam a lisura superficial da restauração semelhante a do esmalte dental, mimetizando a restauração com os demais dentes e devolvendo a harmonia estética. Alguns fatores influenciam diretamente no resultado final da restauração estética, tais como: a composição da resina composta, a técnica restauradora da modelagem dental e o material utilizado para confeccionar o acabamento e polimento da restauração.

PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DTM (DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR)

LIMA, Leylanne Ribeiro Barros*; E COSTA, Hugo Costa; PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar; PASSOS, Thays Sousa Vasconcelos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: leylannebarros@hotmail.com

O Cirurgião-dentista tem como ofício a manutenção e o restabelecimento da saúde nos seres humanos, atuando no alívio e/ou remoção da dor, restabelecimento da estética, função e fonação. Para que possa intervir, seja com procedimentos preventivos ou curativos, deve ser capaz de identificar um estado de saúde e doença. A saúde tem sido definida como o perfeito e harmonioso bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não simplesmente a ausência de doenças. Em Odontologia existem diversas situações que podem referir dor ao paciente. Dentre as mais comuns estão as disfunções temporomandibulares (DTM). O tratamento de casos de DTM exige um conhecimento profundo da etiologia do problema. Fatores estruturais, funcionais e psicológicos parecem estar reunidos, determinando uma origem multifatorial. O cirurgião-dentista deve possuir conhecimentos sobre farmacologia e terapêutica para uma prescrição adequada e racional. Desta forma este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre as principais classes de drogas utilizadas no controle da dor na DTM que incluem os analgésicos não-opioides, analgésicos opioides, corticosteroides, ansiolíticos, antidepressivos, anestésicos locais, relaxantes musculares.

NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

LINHARES, Adriana Lopes*; OLIVEIRA, Fernanda Tais de; NETO, Luiz Gonzaga Arruda; PINHEIRO, Daniel Aranha; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: drikalinhares66@hotmail.com

A biossegurança é uma condição de segurança avançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. O cumprimento dessas normas em consultório odontológico garante ao usuário um serviço de atenção em saúde bucal mais qualificada. A biossegurança tem um papel fundamental na promoção da consciência sanitária, preservação de meio ambiente, descarte de resíduos químicos, tóxicos, infectantes e acidentes ocupacionais, além de ser um processo progressivo devendo ser sempre atualizado e sujeito a exigência de respostas imediatas ao surgimento de microrganismos resistentes e agressivos. O ambiente clínico expõe os cirurgiões e auxiliares a uma diversidade de riscos, tais como contaminação dos instrumentais, acidentes pérfuro-cortantes, doenças infecto-contagiosas e contatos diretos com fluidos durante a realização de procedimentos invasivos ou através de manipulação de roupas e lixos e até mesmo de superfícies contaminadas, sem que medidas de controle de infecção sejam utilizadas. A fim de evitar uma eventual contaminação em ambiente odontológico, devemos seguir os princípios de biossegurança como lavagens das mãos antes e depois dos procedimentos, uso de EPI completo, filme PVC nas superfícies dos equipamentos utilizados, uso de luva de borracha para limpeza de instrumentais, uso de campos cirúrgicos, antisepsia do paciente, lavagem do instrumental após procedimentos, esterilização do material e destino do lixo contaminado em recipientes contaminados. Daí a importância da biossegurança, que aplicada nas clínicas, corresponde à adoção de normas e procedimentos seguros a manutenção da saúde dos pacientes e profissionais.

CASÉOS AMIGDALIANOS

MATOS, Aline Cristine Dutra*; LOPES, Ludmilla Ribeiro; TAVARES, Cícera Bianca Cruz; MEDEIROS, Francisca de Araújo; SANTOS, Reginaldo Victor Pereira; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: al-lynna@hotmail.com

Os cáseos são pequenas formações brancas ou amareladas, localizadas frequentemente nas amígdalas, mais precisamente nas criptas amigdalianas. Estes cáseos são formados por células epiteliais que se descama da mucosa oral, proteínas salivares e restos alimentares, os quais irão dar o substrato necessário para que bactérias se proliferem. Com esta proliferação bacteriana, os cáseos formados virão acompanhados de alterações sentidas pelo paciente, como a tonsilite crônica caseosa, halitose, sensação de corpo estranho ou tonsilite de repetição. Estas alterações saem depois da eliminação do cáseo. Os tratamentos para o cáseo seriam através do uso de antiinflamatórios e enxaguatórios com soluções salinas e anti-sépticas, sendo estes os meios não-cirúrgicos. Mas também existem tratamentos cirúrgicos, como a tonsilectomia e criptólise.

O PAPEL DOS IMUNONUTRIENTES NO TRATAMENTO DO CÂNCER

MELO, Thalyta Araújo de, Kelinny Kelen Costa Machado, Patrícia de Souza Mesquita, Rosângela Maria Lopes de Sousa *

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: talytinha_melo@hotmail.com

Câncer é uma doença caracteriza pela divisão e reprodução de células anormais que podem se espalhar para todo o corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer é a maior causa de morte no mundo e o número total de casos da doença está crescendo. Indivíduos com câncer sofrem perda progressiva de gordura corporal e massa magra corpórea, acompanhada de profunda fraqueza, anorexia e anemia, processo referido como caquexia e associado a essa clínica, existe um déficit nos mecanismos de defesa. Pela forte relação entre nutrição e imunidade publicada na literatura clínica, tem se observado um uso cada vez mais frequente de nutrientes específicos visando à restauração e manutenção da resposta imune. Alguns nutrientes específicos com efeitos imunológicos e farmacológicos, em determinadas doses, são referidos como imunonutrientes. Os mais utilizados são: arginina, ácidos graxos ômega-3, glutamina, nucleotídeos, beta-caroteno e/

ou aminoácidos de cadeia ramificada. Desta forma o presente estudo objetivou analisar o papel dos imunonutrientes no tratamento do câncer. Para isto realizou-se um estudo exploratório do tipo revisão bibliográfica a partir de artigos científicos que consistiu busca em bases de dados: Medline, Pub-med e Scielo, Monografias e Teses no período de 2000 a 2014. Utilizaram-se os descritores nutrientes, imunidade, câncer, resposta imunológica e câncer, tecido maligno e mecanismo de defesa. Na revisão dos estudos atuais sobre os imunonutrientes percebeu-se que apesar dos efeitos na melhoria do sistema imunológico e resposta ao tratamento, ainda faltam muitos estudos contundentes sobre o efeito dos mesmos nos pacientes oncológicos. Desta forma constatamos a necessidade de mais pesquisas na área, bem como ensaios clínicos para que se tracem novos caminhos que facilitem a recuperação imunológica e clínica deste paciente.

ATUAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL: UMA ABORDAGEM DO ESTADO DA ARTE

MELO, Natália Costa Oliveira, Waneska Reis , Adriana Mara Araújo Leal *

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: nataliamelo.95@hotmail.com

O agente comunitário de saúde (ACS) compõe a equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF) e atua na promoção da saúde e na prevenção de agravos, potencializando a integralidade do cuidado a partir do vínculo entre as equipes de saúde bucal e a comunidade. Considerando que as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal apontam que a educação em saúde é uma importante estratégia de reorientação do modelo assistencial e que os ACS's são facilitadores do processo de desenvolvimento das ações em saúde para a redução dos problemas de saúde bucal das famílias residentes nas áreas cobertas pelas equipes da ESF, o objetivo do estudo é descrever a atuação do ACS para a democratização do conhecimento do processo saúde/ doença, a reorganização dos serviços e a produção de saúde. Trata-se de um estudo descritivo mediante revisão de literatura. Foram utilizadas somente publicações nacionais, com texto completo, escritas no idioma português. Estudos nacionais demonstram que as atividades em saúde bucal realizadas pelos ACS acontecem esporadicamente, com marcantes deficiências e inadequada cooperação e corresponsabilidade entre ACS e a comunidade, comprometendo, dessa forma, o acesso progressivo às ações de promoção e de prevenção em saúde bucal, bem como àquelas de caráter cirúrgico- restauradoras. Incluir ações de saúde bucal no conjunto de atividades desenvolvidas pelos ACS é indispensável para o estímulo à manutenção e melhoria das condições de saúde bucal da população assistida.

CARDIOPATIAS E SEUS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO.

NERES, keliane Almeida*; ALMEIDA, Jessica Coelho de; SOUSA, Maysa Kelly de Oliveira

Orientador: MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: keliane_neres@hotmail.com

O número de indivíduos portadores de doenças cardiovasculares aumenta cada vez mais, com alto índice de morbidade e mortalidade. Muitos desses pacientes necessitam de tratamento odontológico aos cuidados de um clínico geral ou um especialista.

O paciente cardiopata na clínica odontológica deve receber um atendimento diferenciado, sendo sempre questionado sobre o controle atual da doença, para que o cirurgião- dentista possa fazer um planejamento adequado com o auxílio do cardiologista, além disso o profissional deve estar apto a evitar qualquer intercorrência que comprometa a saúde deles. São inúmeros os tipos e subtipos das doenças cardiovasculares, tornando ainda mais complexo os manejos cirúrgicos a serem empregados nesses pacientes. Dentre os vários tipos de cardiopatia temos a doença cardíaca isquêmica(Angina do peito e infarto do miocárdio) , insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e endocardites bacterianas que são as que apresentam maior grau de comprometimento cardiovascular, para cada cardiopatia é empregado um protocolo diferenciado levando em consideração, o tempo do procedimento, tipo de anestésico com suas doses e o emprego ou não de vasoconstrictores para determinadas cardiopatias.

O objetivo deste trabalho é informar os cirurgiões- dentistas sobre os devidos cuidados com os pacientes portadores de cardiopatias para a obtenção de um resultado satisfatório no término do tratamento.

MANEJOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES HIV POSITIVO NA ODONTOLOGIA

Nunes, Marilourdes Araujo Lima*; PEREIRA, Priscila Silva; DO NASCIMENTO, Carolina Sousa; LUNA, Paulo Ricardo Aguiar; GOMES, Isanio; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: priscila_sp_12@hotmail.com

A emergência e a reemergência de doenças infecciosas, sobretudo quando a forma de contágio ocorre pela penetração de objetos perfurantes, ou cortantes, contaminados, trouxeram novas implicações para os profissionais e para a organização do trabalho nos serviços de saúde. Ao cuidar de pessoas infectadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, o profissional expõe-se a riscos ocupacionais, trazendo representações antigas sobre transmissibilidade e males epidêmicos. A partir da descoberta do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da elucidação de sua forma de transmissão, o Estado e as instituições de saúde reforçaram a necessidade de normas, monitoramento e avaliação, feitos pela vigilância em saúde, para diminuir as consequências dos acidentes por exposição ocupacional aos fluidos orgânicos, potencialmente infectados. Os profissionais de saúde são aqueles que têm acesso mais rápido às informações científicas, mas conservam medos e representações do senso comum que podem interferir no processo de trabalho.

Metodologia

O objetivo do presente estudo foi analisar as representações de profissionais de saúde na área da odontologia que atuam na rede privada e pública no município de São Luis e no estado do Maranhão, sobre o risco de infecção pelo HIV, aos quais estão expostos durante o atendimento, diminuir as consequências dos acidentes por exposição ocupacional aos fluidos orgânicos, mostrar o grau de informação sobre possível acidente com material biológico e aonde o mesmo deve se dirigir e quanto tempo o mesmo deve ingerir a medicação anti- HIV sobre pacientes potencialmente infectados.

VIOLÊNCIA NA PERSPECTIVA GÊNERO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E EMPÍRICAS

PACHECO, Ivanilde Cordeiro*; COELHO, Elisa; COSTA, Fabiana; TEIXEIRA, IRACY; SANTOS, Norma Lélia Vieira dos; DA SILVA, Nelma Pereira

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: ivanilde.pacheco@ifma.edu.br

Este trabalho foi apresentado pelos alunos do curso de psicologia da UNIVERSIDADE CEUMA, no seminário da disciplina violência na contemporaneidade, com objetivo de trazer uma breve análise do conceito de violência na perspectiva do gênero, além de apresentar estudos de casos que contribuem na compreensão do tema. A metodologia utilizada no desenvolvimento do tema foi pesquisa exploratória com uso de técnicas de coletas em dados bibliográficas e documentais. Nas principais referências adotadas, mostraram três correntes teóricas: dominação masculina, dominação patriarcal e relacional. No tocante às Legislações vigentes, a CF/88 aponta que é dever do estado proteger toda e qualquer pessoa que esteja em estado de violência e diante do número crescente de agressões e homicídios contra as mulheres no Brasil e do silêncio do Código Penal, criou-se várias leis protetivas a favor das mulheres, destacando-se a Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006 -, que foi implantada para coibir condutas criminosas de companheiros, pessoas mais íntimas ou mesmo de estranhos em relação à mulher. Lima (2008) reflete que a questão da violência torna-se um problema até para área de saúde a partir do momento em que afeta a saúde individual e coletiva. Notadamente, através de levantamentos dos dados realizados, percebe-se que essas agressões não privilegiam só as classes pobres e carentes, mas abrange a classe de pessoas de alta renda e que precisam de grandes mudanças para alcançar resultados mais significativos.

TERCEIRA IDADE: CONTRIBUIÇÕES DO LAZER NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

PACHECO, Ivanilde Cordeiro; MARTINS, Ana Carla Privado; BECKMAN, Márcia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: ivanilde.pacheco@ifma.edu.br

O trabalho tem por finalidade a análise bibliográfica sobre os estudos voltados para a população idosa e as contribuições da prática do lazer para longevidade, tendo em vista a projeção da população no período 2000/2006 apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - atualmente com mais de 200 milhões de habitantes - que demonstra redução gradual

da taxa de natalidade e aumento expressivo do contingente de idosos nesse período (IBGE, 2013). Como desenvolvimento metodológico, foram utilizadas pesquisas exploratórias, auxiliadas pelas técnicas de coletas bibliográficas e identificação de artigos a partir de consultas nas bases de dados que indexam os principais periódicos na área, além de busca em documentos correlatos, tais como Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas e Estatuto do Idoso. Os resultados obtidos ressaltam que, considerando o aumento da população idosa no Brasil, várias áreas de conhecimento intensificaram seus estudos pelo tema, entre elas a psicologia, medicina, sociologia e o turismo. Os principais interesses dos estudos abordados são em desvendar os mistérios da velhice; conhecer as principais evoluções e contribuições socioculturais; além de entender como acontece o processo de desenvolvimento e mudanças que implicam no aumento da expectativa de vida. Visto os dados coletados, a prática de atividades de lazer para a terceira idade mostra-se imprescindíveis para que o envelhecimento possa se tornar uma etapa de vida com inúmeras possibilidades de usufruir de experiências prazerosas e que contribuam para minimizar os diversos impactos dessa fase.

MANEJO DE PACIENTES PORTADOR DE DIABETES MELLITUS.

PAIXÃO, Vaguilene Ferreira Lopes*; BEZERRA, Ana Paula Gonçalves; BORBA, Wendy da Cruz Santos; SILVA, Wheslitan Leite da; MACIEL, Francisco Jose Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: aninhapaula_bezerra@hotmail.com

O diabetes mellitus inclui um grupo de doenças cuja etiologia envolve aspectos imunológicos e metabólicos, caracterizando-se, inicialmente, por hiperglicemia, a qual resulta de anomalias na secreção e/ou na ação da insulina.

A intensidade dessas alterações varia de acordo com a intensidade do diabetes, cuidados de saúde do paciente, acompanhamento clínico do mesmo de forma que podemos nos deparar com pacientes capazes de levar uma vida próxima da normalidade e outros que se encontram completamente desprovidos de suporte.

Os diferentes cuidados que devem ser considerados pelo cirurgião-dentista ou pela equipe interdisciplinar no atendimento de pacientes diabéticos podem ser divididos em três níveis diferentes, os cuidados na fase pré-operatória, no trans-operatório e atenção pós-operatória.

Fase Pré-Operatória - as particularidades desses pacientes reforçam a necessidade de uma correta anamnese, avaliando-se o histórico de cuidados seguidos pelo paciente. Fase Operatória - Na fase operatória, alguns cuidados devem ser tomados imediatamente antes do procedimento. Fase Pós-Operatória - Uma avaliação imediata das condições sistêmicas do paciente deve ser realizada com um cuidado especial para a presença de infecções secundárias e sangramentos.

Portanto, pode-se concluir que o cirurgião dentista, como profissional da saúde, deve estar capacitado a avaliar e tratar seu paciente de forma integrada e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida do mesmo.

LESÕES HIPERCROMICAS E HIPOCROMICAS NA FACE

PINA, Gabriella Maria Martins Rendeiro*; CARVALHO, PEREIRA, Mariana Mendonça de; Patrícia Paula; CARVALHO, Sanalle Luiza Baêta; MOURA, Lorena Lima; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: gabriella.pina@hotmail.com.br

Os melanócitos são células responsáveis por produzir uma substância que é distribuída por toda a pele: a melanina. A principal função dessa substância é dar cor à pele e protegê-la contra os raios ultravioletas. Quando a sua distribuição é irregular, ocorre o aparecimento de manchas que podem ser mais escuras (hipercrômicas) ou mais claras (hipocrômicas). As manchas hipercrômicas apresentam-se mais escuras por conta do excesso de melanina. Elas podem ser pós-inflamatórias, ocorrendo após algum processo inflamatório da pele como acne ou machucado, após a exposição ao sol ou por conta de alterações hormonais. O melasma, exemplo de mancha hipercrômica, não possui uma causa definida, mas relaciona-se à gravidez, ao uso de anticoncepcionais e à exposição solar. Outro exemplo são os nevos, popularmente conhecidos como pintas e sinais. Podem estar presentes desde o nascimento ou surgir ao longo da vida. As manchas hipocrômicas apresentam-se mais claras do que a cor da pele por conta da ausência de melanina e acometem geralmente pessoas de pele mais morena. Temos como exemplo o vitiligo, que é caracterizado pela perda de pigmentação. Essa doença atinge cerca de 1% a 2% de pessoas no mundo, podendo se manifestar de diferentes formas e tamanhos. Outro caso é a pitíriase, causada por exposição ao sol, ocorrendo geralmente em indivíduos de pele seca.

É importante salientar a importância do conhecimento do cirurgião-dentista para diagnosticar e tratar a doença em seu estágio inicial, utilizando instrumentos adequados e técnicas que evitam o progresso da enfermidade.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES AUTISTAS

PRAZERES, Raissa Silva*; SANTOS, Aline Adelaide Rodrigues dos; COSTA, Cyrene Piazero Silva

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: ramom.m.aguiar@hotmail.com

O autismo é caracterizado por comportamentos persistentes nas interações sociais recíprocas, desvios na comunicação e padrões comportamentais restritos e estereotipados, de etiologia desconhecida. Os pacientes autistas apresentam níveis de higiene oral insatisfatória, devido as dificuldades na execução, pois apresentam alterações de coordenação e pouca cooperação para realizações de tarefas, a mesma também é influenciada pela dieta cariogênica e uso de medicamentos xerostomogênicos. A higiene oral de um autista é geralmente negligenciada devido a preocupação da família relacionada diretamente a doença. A incidência dessa desordem é relativamente alta e isso faz importante o conhecimento do cirurgião-dentista das suas características, limitações e possíveis implicações no tratamento odontológico, pois as alterações comportamentais é um importante complicador no atendimento pela dificuldade da realização de exames e tratamento. Por esses motivos, o cirurgião-dentista tem que utilizar estratégias que facilite a abordagem e atendimento desse paciente, dentre eles, o Programa Son Rise, tornando esse momento mais prazeroso e inovador. O Programa Son Rise é centrado na pessoa com autismo, isto significa que o tratamento parte do desenvolvimento inicial de uma profunda compreensão e genuína apreciação da pessoa, de como ela se comporta, interage e se comunica, assim como de seus interesses. Este é um método lúdico, de abordagem relacional, que incentiva os pais e terapeutas a observar as preferências dos autistas e usá-las como recursos de aprendizagem, favorecendo, conseqüentemente o desenvolvimento social, emocional e cognitivo desses indivíduos. Para que haja sucesso no atendimento de pacientes autistas é necessário conhecimento da técnica por parte do cirurgião-dentista.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

RABELO, Sara*; ARAÚJO, Larissa; BEZERRA, Thamyris; CARVALHO, Flavia;

MACIEL, Francisco Jose; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lari.araujoo2015@hotmail.com

Os pacientes oncológicos pediátricos devem ser submetidos ao exame clínico feito pelo cirurgião-dentista tão logo tenham sua doença diagnosticada, o tratamento odontológico deve ser iniciado antes do tratamento oncológico. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar da área de odontologia sendo que, tem que levar em consideração a condição clínica de cada paciente, levou em consideração as medidas preventivas e curativas ao meio bucal com a intenção de evitar complicações provenientes da terapia antineoplásica. Vale ressaltar que o tratamento odontológico deve anteceder o antineoplásico e que é fundamental a conscientização dos pacientes e pais sobre a importância da higiene bucal.

ÉTICA NA ODONTOLOGIA: ATENDIMENTO DO PACIENTE SORO POSITIVO

RAMOS, Lucas Teixeira*;; ARAÚJO, Lucian da Silva; ALMEIDA, Raniely Saminez;

DE MOURA, Amanda Bezerra de Oliveira; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lucassteixeiraa@gmail.com

Adequação e Otimização da conduta Odontológica para com pacientes portadores do vírus HIV. Entre as questões éticas e legais relacionadas prática odontológica vem sendo questionada a conduta a ser seguida frente às pessoas que apresentam certas patologias – como os portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) um dos mais graves e maiores problemas sociais e de saúde pública já enfrentados pela população mundial. Ainda há preconceito e desconhecimento sobre o risco de infecção por HIV. Tanto por parte dos cirurgiões dentistas quanto por parte de outros pacientes. Quando um paciente comprovadamente infectado pelo vírus HIV ou que tenha AIDS deve-se adotar uma das seguintes condutas: em caso de urgência deve-se atender normalmente o paciente nos limites de sua atuação. Caso não seja urgência o profissional poderá atender normalmente se a necessidade do paciente estiver dentro do campo de sua atuação. No Brasil o CFO elaborou o código de ética odontológica, que estabelece punições aos profissionais que não exercem os preceitos éticos adequadamente, pois de acordo com a constituição brasileira, todos têm direito à saúde. É necessário dar início a um pro-

jeto de educação nos consultórios e nas universidades que formam novos profissionais, como também reforçar o papel dos Conselhos Regionais e Federal de Odontologia. No conhecimento sobre a postura ética dos cirurgiões dentistas mediante a infecção pelo HIV. O importante e ético é que não se negue atendimento por ser o paciente portador de HIV ou AIDS.

USO DE ANESTÉSICOS EM CRIANÇAS

RAMOS, Allan Moura*; PESSOA, Thalita Fonseca; ARAÚJO, Randerson de Sousa; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: thalita_fpessoa@hotmail.com

Os anestésicos são as drogas mais utilizadas na Odontologia. A prevenção da dor durante procedimentos odontológicos é importante para uma boa relação entre o cirurgião-dentista e o paciente, principalmente quando se trata de crianças. Os anestésicos tópicos são utilizados para a criança não sentir a dor da picada da agulha, evitando assim aumentar o nível de tensão da criança, sendo o mais utilizado a benzocaína, por ter efeito mais rápido. Os anestésicos locais indicados são lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 ou 1:1200.000, articaína 4% com epinefrina na mesma proporção do anterior também pode ser utilizada, porém apenas para crianças maiores de 4 anos. Se a criança apresenta alergia a epinefrina, devido ao sulfito, pode ser utilizado a prilocaína 3% com felipressina, com devido cuidado quanto a dosagem. O problema quanto aos anestésicos de maior duração é porque as crianças ficam mordiscando os tecidos moles, assim quando cessa o efeito anestésico ela sente injúria. O dentista deve ficar atento à dosagem do anestésico, que tem relação direta com o peso da criança, para não exceder a dose e causar danos. Portanto, o conhecimento quanto às técnicas anestésicas juntamente anatomia é de extrema importância, para evitar que ocorra uma superdosagem devido ao erro de técnica.

NEUROFIBROMATOSE E SUAS ALTERAÇÕES DE INTERESSES ODONTOLÓGICOS

RIBEIRO, Ana Paula Silva*; CALDAS, Talita; CARVALHO, Vanessa; ROSENDO, Joyce; ALVES, Genne Rose; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: anapsribeiro@live.com

Os distúrbios genéticos podem ser herdados dos pais (distúrbios gênicos) ou fruto de um acidente no início da formação do novo ser (distúrbios cromossômicos ou cromossomopatias). Qualquer mudança no código genético chamado de mutação pode provocar diferenças importantes nas pessoas. Algumas mutações prejudicam o funcionamento normal do organismo, ou seja, resultam em doença. As neurofibromatoses são causadas por mutações que alteram a produção de algumas proteínas que controlam o crescimento das células, dos tecidos e dos órgãos. Causando assim grande sofrimento, limitação social e intelectual e nos casos mais graves podem levar a morte precoce. Existem 3 tipos de neurofibromatoses: a neurofibromatose 1 também conhecida como doença de Von Recklinghausen é o tipo mais comum e apresentam-se desde a infância. Caracterizada por múltiplas manchas cor de café-com-leite, sardas axilares ou inguinais, nódulos de lisch além de neurofibromas (cutâneos ou plexiformes). A neurofibromatose 2 cujo as características são os tumores cerebrais, os principais são os schwannomas bilaterais do nervo acústico, os meningiomas, ependimomas, outros tumores de bainhas de nervos periféricos e mais raramente os astrocitomas de baixo grau de malignidade. A schwannomatose tem como principal manifestação a dor neuropática intratável na vida adulta relacionado com a presença de múltiplos schwannomas. Atualmente não existe cura para a NF, porém existem alguns tratamentos alternativos que consistem na ressecção das lesões que comprometem a função e/ou estéticas através de técnicas cirúrgicas.

USO DA DAPIRONA NO MUNDO

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; ZAMIGNAM, Kalleny; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: kalleny95@hotmail.com

A dipirona vem sendo alvo de muita polêmica, sendo inclusive proibida em alguns países como nos EUA, em virtude do suposto papel de deprimir a medula óssea, causando anemia aplástica e a agranulocitose. Esta doença é rara, porém

grave, com taxa de fatalidade em torno de 6-10%. Porém, a associação da dipirona à agranulocitose apresenta incidência variável em diferentes estudos. Assim, apesar de sua eficácia em suas duas principais serventias, a dipirona foi aos poucos sendo abolida desde a década de 70 em vários países do mundo, dentre eles: Austrália, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suécia e outros. Porém, é sabido que medicamentos, em geral, produzem efeitos colaterais, e dentre estes as alterações hematológicas são comumente encontradas. Já existem estudos que comprovam que o risco de mortalidade associada à dipirona parece ser substancialmente menor do que o risco associado aos anti-inflamatórios não-esteroidais. Em um estudo analisado com analgésicos dipirona, aspirina, diclofenaco e paracetamol com base em quatro aspectos de reações adversas (agranulocitose, anemia aplástica, anafilaxia e hemorragia digestiva) demonstrou que a dipirona foi a substância que apresentou a menor taxa, 25 mortes por 100 milhões de usuários. Diante de vários estudos que comprovam a segurança do uso da dipirona frente aos motivos pelos quais alguns países proibiram seu uso, é importante ressaltar a soberania norte-americana e o desenvolvimento de um medicamento – o paracetamol – que bem como a dipirona, é usado basicamente como antipirético e analgésico.

ESTABELECIMENTO DE UM SORRISO HARMÔNICO E ESTÉTICO

RICCI, Paula Karen*; AHID Vinícius Pires, AHID Fernando Jorge Mendes

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: paulakrodonto@hotmail.com

A busca pela estética do sorriso com dentes mais brancos, formas e proporções harmônicas é uma rotina nos consultórios odontológicos, porém na sua maioria este objetivo é alcançado à custa de desgastes das estruturas biológicas dos dentes, esmalte e dentina, e pela perda da vitalidade pulpar, fazendo com que, muitas das vezes, o paciente avalie o custo biológico com o resultado estético, pondo em dúvida a realização do tratamento. Com o avanço das técnicas e materiais adesivos, hoje se tornou possível a reabilitação estética do sorriso preservando a biologia dental, sendo o propósito deste trabalho apresentar um caso clínico observando estes princípios. Paciente JPF, com 22 anos, sexo masculino, procurou a clínica particular, com a queixa principal “melhorar o sorriso”. Após a análise da documentação radiográfica e fotos, foi proposto ao paciente um tratamento ortodôntico para realinhar e posicionar os dentes, em seguida o clareamento dental e por final, a harmonização da forma e proporção dental, usando laminados cerâmicos sem desgaste da estrutura dental.

IMPORTÂNCIA DO ATESTADO LEGAL NA ODONTOLOGIA

ROCHA, Francisca Safira Vale*; CRUZ, Cleidiane Melo; RIBEIRO, Kelcyane Costa; MELO, Natália Costa Oliveira; AMORIM, Mariana Damasia Siqueira; REIS, Washington; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: safira_valle@hotmail.com

Na Odontologia, o atestado é uma declaração particular sucinta em que se afirma a veracidade de certo fato odontológico, sendo que as consequências deste implicam em providência administrativa ou judiciária relacionada ao cliente. Segundo o conselho de Odontologia “O profissional deve fornecer atestado que corresponda à veracidade dos fatos, considerando complexidade de cada procedimento por ele realizado, tendo tal direito garantido pela 5081/66.” A lei 5081 artigo 6º parágrafo III diz que compete ao cirurgião dentista, atestar no setor de suas atividades profissionais, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Vale a pena ressaltar que um atestado é constituído por várias partes, sendo a primeira delas, as relativas às qualificações profissionais, em seguida constam a identificação do paciente e as finalidades a que se destinam, ou seja; fins trabalhistas, esportivos, militares ou escolares e por fim, declara que o paciente esteve sob os cuidados do profissional valendo-se do código internacional de doenças (CID) que é uma classificação criada pela organização mundial de saúde contendo todas as informações a cerca de determinado procedimento ou patologia, seus sinais e sintomas. A não veracidade do atestado pode acarretar complicações para o profissional, pois o mesmo trata-se de uma documentação legal, tendo em vista que uma afirmação que não corresponda à veracidade do documento poderá acarretar-lhe crime de falsidade ideológica, crime previsto no art. 299 do código penal.

O USO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RODRIGUES, Laíse Nunes*; SANTOS, Adriano Tavares; VIEIRA, Clarissa

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: lise-nunes@hotmail.com

As atividades antimicrobiana e anti-inflamatória de diversas ervas e plantas vem sendo estudadas em vários países. Na Odontologia o interesse na utilização dos produtos fitoterápicos vem crescendo como alternativa de tratamento e prevenção do biofilme dental. Pesquisas vêm apontando que a distinção das características fenotípicas das bactérias inseridas no biofilme dental resulta no aumento de resistência dos biofilmes aos agentes antimicrobianos. Baseado nisto, os medicamentos fitoterápicos podem representar uma opção no combate aos microrganismos resistentes, pois possuem, na maioria das vezes ação mais suave que os medicamentos alopáticos, e ainda ajudam a reduzir os efeitos colaterais, prejudiciais à saúde. Porém, a indicação do uso de fitoterápicos na medicina humana não é substituir medicamentos já registrados e comercializados com eficácia comprovada, mas sim aumentar a opção terapêutica dos profissionais de saúde, oferecendo medicamentos equivalentes, também registrados e com eficácia comprovada, para as mesmas indicações terapêuticas e, eventualmente, com indicações complementares às existentes. Portanto, o objetivo dessa revisão de literatura é estudar alguns desses produtos e suas propriedades farmacológicas a fim de incentivar sua utilização na cavidade bucal.

Palavras-chaves: Biofilme Dental. Fitoterapia. Odontologia.

FISSURAS LABIOPALATINAS: REVISÃO DE LITERATURA

SANTOS, Sidney Henrique; SILVA, Maressa Keila de Souza; VELOSO, Matheus Felipe;
COELHO, Aline Rocha Coelho; Calvet, Clélea de Oliveira.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: mgmaressakeila@gmail.com

As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas que se desenvolvem nas primeiras fases embrionárias devido a um defeito de fusão dos processos palatinos e/ou a não formação completa das eminências nasais. Podem ocorrer associadas entre si, de forma isolada ou até mesmo combinadas a outras malformações, assim apresentando-se em diferentes graus de severidade. Essa condição ocasiona sérios problemas estéticos, anodontia, dentes supranumerários, microdentes, atraso na erupção e formação dentária, agenesia, dificuldade na fala, audição, alimentação, respiração e problemas psicológicos. Através da metodologia de revisão de literatura ressaltamos que os incisivos laterais superiores são os elementos dentários que podem ser mais comprometidos. Em cerca de setenta por cento dos casos de FLP ocorre como fator isolado, com uma malformação não sindrômica. As fendas palatinas são mais comuns no sexo feminino do que no masculino e vinte por cento dos casos são hereditários. O atendimento possibilita adaptações na vida do paciente em ações rotineiras, como alimentação e fala. O diagnóstico, que pode ser realizado no pré-natal, é de extrema importância, pois contribui para um melhor tratamento. A terapêutica é realizada de forma multidisciplinar, através de uma operação cirúrgica em que o cirurgia bucomaxilofacial é o principal responsável por tal procedimento.

EROSÃO DENTAL

SARTORIO, Raianne Coelho*; GOMES, Mario Gilson Nina; MAIA, Mariana de Figueiredo Lopes e; GOMES, Isabella Azevedo

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: raianne_sartorio@hotmail.com

Este estudo teve por objetivo realizar uma revisão da literatura sobre erosão dental. A erosão dental é definida como a perda progressiva e irreversível de tecido dental duro por processo químico que não envolve ação bacteriana (BRANCO et al., 2008). Os ácidos responsáveis pela destruição dental durante o processo de erosão podem ser de origem extrínsecas ou intrínsecas. Fontes extrínsecas podem incluir: bebidas, alimentos e medicamentos. Os fatores intrínsecos da erosão dental incluem bulimia, anorexia, doença do refluxo gastroesofágico, xerostomia (VARGAS et al., 2010). Qualquer substância ácida com PH inferior crítico para o esmalte (5,5) e dentina, pode absolver os cristais de hidroxiapatita. A saliva tem papel de neutralizar ácidos, porém pacientes submetidos a radioterapia e hemodiálise possuem chance aumentadas à erosão

dental, devido à redução do fluxo salivar (CORRÊA et al.,2010). Esta doença moderna é comum, chegando a afetar aproximadamente 60% da população mundial. Em situações mais severas, como nos casos de dentina expostas, fratura dental ou em alguns casos de hipersensibilidade que não podem ser controladas, indica-se a utilização de manobras restauradoras (KREULER et al.,2010). O diagnóstico precoce de lesões erosivas possibilita a atuação do Cirurgião-Dentista a prevenção de desgaste na dentição decídua e permanente através da conscientização do paciente, assim com a diminuição da frequência de exposição de seus dentes aos ácidos continua sendo a forma mais eficaz de prevenir o desgaste erosivo.

A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE PARA O SUCESSO DO PLANEJAMENTO ODONTOLÓGICO

SERAFIM, Mayara Farah Dal’Lin*; AMARAL, Neuza Costa MESQUITA, Ana Caroline Cantanhede; CASANOVA, Rayanne Ribeiro; MOREIRA, Keila Soares; DIAS, Andrezza; REIS, Washington.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: mayarafarahdallin@hotmail.com

Nos dias atuais, é inaceitável a aplicação do mesmo plano de tratamento para todos os pacientes, sem dar a devida relevância aos aspectos individuais, visto que a resposta ao tratamento pode ser bastante variada dependendo do indivíduo, de acordo com sua genética e imunidade, além de particularidades que este pode apresentar. Por sua vez, o cirurgião-dentista, visando o estabelecimento da saúde, sendo esta entendida por bem-estar físico, psicológico e social, deve conhecer o estado clínico do seu paciente por completo. No atendimento odontológico, faz-se necessário exercer uma detalhada anamnese, no ato da primeira consulta e antes da realização do exame físico, a qual deve abranger o relato da história médica e doença atual, além de antecedentes pessoais, familiares e mórbidos, possibilitando, assim, a melhor coleta de sintomas e alterações fisiológicas, almejando o estabelecimento do correto plano de tratamento ao paciente. Esta anamnese, que se caracteriza por ser um exame subjetivo, compõe o exame clínico e viabiliza ampliar o conhecimento do cirurgião-dentista quanto ao quadro em que o paciente se encontra e certificar o plano de tratamento que será estabelecido para o mesmo, além de melhorar a relação entre profissional e paciente. A mesma é imprescindível para o alcance do êxito no tratamento, uma vez que atualiza o cirurgião-dentista quanto aos problemas que acometem o paciente em questão, permitindo um diagnóstico mais seguro

BIOCOMPATIBILIDADE DOS MATERIAS UTILIZADOS EM PRÓTESE E EM DENTÍSTICAS, CERÔMEROS/ CERÂMICAS/PORCELANA

SILVA, Antônia Claudia Goncalves*; SILVA, Fabiola Ayane Costa; ALVES, Chirlene Lemos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: Albuquerque_cr@hotmail.com

A biocompatibilidade é a habilidade que um material possui de promover uma resposta biológica apropriada em uma dada aplicação, esta propriedade dos materiais restauradores é extremamente desejável, uma vez que estes devem estar intimamente ligados ao dente para promover adesão. Sabendo-se que nenhum material restaurador estético é 100% compatível biologicamente, na decisão sobre qual material pode ser usado na estrutura dentária deve-se balancear os riscos e benefícios do seu devido emprego. Diante da variedade de agentes cimentantes não poderá empregar um único cimento em os casos dever levar em consideração as características inertes a cada situação. O objeto desse trabalho e apresentar os materiais que há e sua utilização para cada caso.

HEPATITES VIRAIS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

SILVA, Deusuita Ramos da*; MATOS, Amanda; SANTOS, José Handerson Araújo dos;

ANJOS, Tarcila Ferreira dos; CARVALHO, Thaylla Sabino Nascimento; MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: deusa06ramos@hotmail.com

As hepatites constituem um grupo de doenças inflamatórias do fígado de diversas etiologias, sendo que as mais frequentes na prática clínica são a B e C e as mesmas podem cronicar e evoluir para a cirrose. Os profissionais da odontologia são os mais infectados pelos vírus da hepatite B e C do que outros profissionais da saúde. Além do contágio através de acidentes perfuro cortantes envolvendo sangue contaminado. O objetivo do presente trabalho é discutir, através de uma revisão de

literatura, os riscos de adquirir infecção pelo vírus das hepatites B e C na prática odontológica. As pesquisas encontradas mostraram que tanto os profissionais de odontologia quanto os graduandos estão expostos em suas práticas a riscos de acidentes com instrumentos perfuro-cortantes constituindo assim, um grupo de alto risco de contaminação pelos vírus das hepatites principalmente B e C. Esta pesquisa permitiu concluir que o risco de exposição aos vírus da hepatite é eminente para esta categoria e que é necessário estabelecer estratégias de intervenção tanto em nível das instituições de trabalho quanto a nível de práticas acadêmicas a fim de reduzir os riscos.

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS-MA.

SILVA, Neusa De Paula Mendes*; COELHO, Duciana De Melo; CORDEIRO, Geovanne Dos Santos; ASSUNÇÃO, Marcos Vinicius De Ferreira De.; OLIVEIRA, Lucio Dias.

Categoria: Graduação

Curso: Educação Física

Email: neusa.dpaula@gmail.com

A dança oferece um campo pedagógico amplo, por ser uma atividade coletiva e lúdica, acredita-se que seja um instrumento de facilitação nos relacionamentos interpessoais, no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. O objetivo desse estudo foi conhecer as características dos integrantes do projeto de dança dentro de uma universidade particular em São Luís - MA. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, onde buscou-se traçar um perfil das pessoas que procuram a dança como forma de atividade física. A pesquisa realizou-se na Universidade Ceuma - Campus Renascença, com alunos integrantes do projeto "Medida Certa" na modalidade de dança. A população de estudo corresponde a 71 pessoas, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada contendo 06 questões, que foram coletadas no próprio local onde são realizadas as aulas de dança. Identificou-se neste estudo que 63% dos integrantes eram do sexo feminino; quanto a faixa etária, 50% estavam entre 20 a 29 anos; 74% são dos cursos da área de Ciências Biológicas; 100% são discentes da instituição, sendo que 79% tem estudante como profissão; 31% nunca tiveram contato com a dança; os ritmos de maior interesse foram forró, zouk e samba, com 81%, 63% e 53%, respectivamente. Observou-se neste trabalho, que a maioria das pessoas que procuram o projeto são mulheres com idade entre 20 a 29 anos, que cursam na área de Ciências Biológicas e tem o intuito de aprender a dançar visando a saúde através da prática da atividade física.

ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM DEPENDENTES QUÍMICOS

SOUSA, Karen Regina Pinto*; SERRA, Adilson Lima; RAMOS, Flávia Gisele Rolande Garros; FILHO, Edilson Ribeiro Gomes; DA SILVA, Joceline Conrado; MARTINS, Michelle de Souza Fontes

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: karensousap@gmail.com

O consumo de drogas sempre fez parte da história da humanidade. Hoje, o uso de drogas está cada vez mais prevalente em nossa sociedade, e está associado a inúmeros problemas sociais, econômicos e de saúde. Diante desta problemática social, objetiva-se neste trabalho, compreender, com a metodologia da revisão de literatura, as alterações neuropsicológicas ocasionadas por substâncias psicoativas como: medicamentos, álcool, tabaco, maconha, cocaína e crack. As drogas psicotrópicas agem no Sistema Nervoso Central (SNC). Quando um indivíduo recebe um estímulo através dos seus órgãos do sentido, este estímulo é enviado ao SNC, onde ocorre o processamento da informação, interpretação, memorização, entre outros. As drogas psicotrópicas alteram a comunicação entre os neurônios, células nervosas presentes no SNC, podendo produzir diversos efeitos no sujeito como euforia, ansiedade, sonolência, etc. de acordo com o neurotransmissor envolvido e a forma como a droga atua. Nesta esfera, a Neuropsicologia busca compreender os danos cerebrais e seus efeitos na cognição e no comportamento dos indivíduos, ela procura descrever as alterações cognitivas, comportamentais e emocionais, bem como a qualidade do funcionamento mental, além de buscar descrever o curso da recuperação e estimar o funcionamento pré-mórbido (anterior) dos usuários das substâncias. Estuda ainda os comprometimentos neurocognitivos dos pacientes, relacionando-os aos achados estruturais e funcionais de neuroimagem. Portanto, a realidade da dependência química e seus efeitos sobre a sociedade é uma problemática inevitável. Neste sentido, a Neuropsicologia, como subdepartamento das neurociências, fornece um instrumental preciso para enriquecer as avaliações psicológicas, além de possibilitar maior compreensão das substâncias e patologias.

USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA

SOUSA, Waltonne Silva*; REIS FILHO, José Reinaldo; SOARES, Felipe Simões; CAMPELO, Ricardo Gabriel Calvet; SANTOS, Reginaldo Victor Pereira; LUCENA, Silvia.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: waltonneodonto@hotmail.com

A toxina botulínica tipo A (Botox) é uma substância produzida pela bactéria *Clostridium botulinum* capaz de gerar denervação química temporária de músculos esqueléticos. Sua ação se dar por bloqueio da liberação mediada por Ca^{+2} de acetilcolina das terminações nervosas de neurônios motores produzindo enfraquecimento da atividade muscular. Apesar de seu reconhecido uso em tratamentos cosméticos, é cada vez maior o emprego da toxina botulínica com finalidades terapêuticas. Na Odontologia, suas propriedades têm sido amplamente exploradas para o tratamento de variadas condições clínicas que envolvem a região orofacial. A aplicação da toxina botulínica nos músculos mastigatórios é atualmente utilizada no tratamento de dores orofaciais, disfunção temporomandibular e bruxismo. A mesma também tem sido indicada no tratamento de outras condições tais como o sorriso gengival e a sialorréia. A literatura mostra que os resultados desses tratamentos são bastante favoráveis e promissores o que vem ampliando o número de cirurgiões-dentistas que recorrem a toxina botulínica na sua rotina clínica. Entretanto, o sucesso deste tipo de tratamento é diretamente dependente de adequadas indicações clínicas e da execução da técnica de forma correta e segura, devendo o profissional conhecer os potenciais riscos associados. Assim, o objetivo deste trabalho é revisar a literatura científica relacionada ao uso da toxina botulínica na Odontologia, discutindo as indicações e contra-indicações desta opção terapêutica.

É SEGURO REALIZAR TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM GESTANTES?

ZAMIGNAM, Kalleny*; RIBEIRO Marina Salomão Ricarte; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: kalleney95@hotmail.com

Muitas são as crendices e os mitos que rodeiam o atendimento odontológico de pacientes gestantes. Cirurgiões-dentistas mal informados chegam a cometer a negligência de não prestar atendimento e, portanto, indicar a postergação do atendimento a este público. Todavia, todas estas restrições que cercam a presença de gestantes nos consultórios odontológicos podem ocasionar sérios problemas a gestante e ao bebê que está por vir. Durante a gravidez, a mulher fica bem mais suscetível a desenvolver algumas patologias na cavidade oral. A mulher grávida necessita de atendimento ímpar, pois os níveis de estresse, durante as consultas, estão intimamente relacionados ao vínculo que se estabelece entre a gestante e o cirurgião-dentista. Os riscos de um atendimento odontológico para o bebê são, na maioria dos casos, menores que os riscos que os problemas bucais podem causar à mãe, haja vista que uma simples dor de dente pode culminar em uma infecção generalizada no organismo. O anestésico indicado para o atendimento de gestantes é a lidocaína e o uso de vasoconstrictor pode ser feito com segurança. Estudos apontam que o atendimento pode ser feito durante toda a gravidez, porém o segundo trimestre é o tempo da gestação mais propício para o atendimento em razão do feto já estar estável no útero da mãe. A adrenalina do vasoconstrictor é insignificante frente a adrenalina endógena produzida pelo organismo da mãe devido o estresse do atendimento.

PROJETO DE EXTENSAO

UNICEUMA SEM FRONTEIRAS

SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro*; MATOS, Pamella Mayara Ferreira De; SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: pamellamatos@hotmail.com

O movimento da Terceira Idade encontra-se finalmente estabelecido e urge um novo paradigma, o de se repensar o velho. Diversas estratégias têm despontado no sentido de se estimular potenciais na descoberta de novas áreas de interesses a

esta população, como também na possibilidade de descobrir, agir e produzir um novo conceito de envelhecimento. As universidades despontam como uma resposta que se manifesta para iniciar a alterar este panorama negativo reservado para o velho. O objetivo deste trabalho é apresentar a sociedade o projeto de extensão universitária “Uniceuma sem fronteiras”, o qual destaca os seus objetivos como sendo entre tantos outros o de contribuir para a compreensão do lugar e do papel da pessoa de faixa etária igual ou acima de 60 anos na sociedade desenvolvendo atividades físicas intelectuais, culturais, criativas e expressivas, estabelecendo assim, novas relações sociais desta pessoa com a vida, propiciando o redescobrimto e o renascimento da sua alegria de viver. Trata-se de um projeto multidisciplinar e permanente realizado nas instalações da Universidade Ceuma, São Luis do Maranhão, com grupos constituídos por 20 idosos que são assistidos nas dependências da Universidade Ceuma Campos I-Renascença, destacando-se a sala de expressão corporal, clínica de fisioterapia, academia e laboratório de informática. As atividades oferecidas consistem em: Fisiomotricidade (Cinesioterapia em grupo para as idosas); Condicionamento físico (Atividade física na academia); Hidroginástica (Hidrocinesioterapia em grupo); Oficinas de memória (Atividades de cunho cognitivo realizadas por terapeuta ocupacional); Psicoestimulação (Avaliações e atividades de cunho cognitivo realizadas por Psicóloga); Inclusão Digital (Informática para a terceira idade e jogos de psicoestimulação) e Palestras mensais com Profissionais escolhidos/convidados. Os resultados são obtidos através de avaliações que se dão em nível físico e cognitivo e são realizadas periodicamente no início e ao final de cada ciclo que tem a duração de seis meses. São aplicadas por todos os profissionais envolvidos e os resultados são publicados em periódicos da área e/ou apresentados em congressos e mostras científicas. Considerações finais. O projeto tem contribuído para a consolidação do eixo ensino/pesquisa/extensão, mas principalmente para diminuir o limiar de afastamento entre as gerações e promover uma proteção social básica de assistência através da força do próprio grupo o grupo estimulando o autoconhecimento, quanto à condição de vida e a relação com a família e a comunidade, favorecendo e promovendo o envelhecimento ativo, evitando o isolamento e asilamento da pessoa idosa a partir da interação entre os professores, alunos e idosos participantes.

BULLYING NA ESCOLA: AÇÕES QUE PODEM PREVINIR ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA

SALES, Ana Rafaela Berredo*; PINHEIRO, Ana Camila Nunes; CAMPOS, Maria Eduarda Estrela; GOMES, Mariane; BARROS, Mirelle Fernanda Piedade; BECKMAN, Marcia Valéria Reis

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: s.anarafaela@yahoo.com.br

O presente trabalho buscou abordar e discutir o bullying, com crianças de faixa etária entre 7 e 8 anos de uma escola municipal da cidade de São Luís. O objetivo era proporcionar a construção de um conhecimento a cerca da temática junto às crianças, planejando intervenções psicopedagógicas. O projeto foi dividido em encontros, primeiramente para a observação e o levantamento de dados, caracterizando o grupo e as problemáticas, em seguida para discutir e apresentar conceitos sobre violência, agressores, vitimas e testemunhas. Os procedimentos utilizados durante tal processo foram: aulas expositivas, dinâmicas de grupos, leitura, filmes, musica e arte plástica. Os resultados observados após a intervenção foram à conscientização sobre o tema abordado e a mudança nos comportamentos inadequados referentes ao bullying, por parte das crianças, que demonstravam mais respeito umas pelas outras. Concluiu-se que, esse tipo de violência é bastante comum no contexto escolar, deste modo, destaca-se a importância de práticas preventivas desde os primeiros anos na vida escolar.

EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DE IDOSAS

SOUSA, Thiago Matheus da Silva*; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; CHAVES, Luiz Filipe Costa; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado de; GAMBASSI, Bruno Bavaresco

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: professorbrunobavaresco@gmail.com

O envelhecimento é um processo pelo qual todos os indivíduos passam, sendo caracterizado pela perda gradual das capacidades físicas. Devido a perda de força, as pessoas ficam com o dia a dia comprometido tendo como consequência uma piora na qualidade de vida. O objetivo desde trabalho foi verificar o efeito do treinamento resistido sobre a força de membros superiores e inferiores de mulheres. Participaram do estudo 18 mulheres com idade entre 65 e 70 anos. Realizaram-se 16 sessões, duas vezes por semana, cujos exercícios propostos foram: mesa flexora, supino reto, leg press 45 graus e remada sentada, sendo a intensidade determinada pela zona de repetições máximas (10 RM), com 3 séries e 30

segundos de intervalo para descanso. Os exercícios foram ordenados, alternando os segmentos. Aplicou-se o teste de 10 repetições máximas no exercício supino reto e leg press 45 graus antes e após o programa de treinamento para avaliar a força muscular. Para análise estatística foi utilizado o teste t Student para amostras pareadas considerando -se o IC de 95 %. **RESULTADOS:** Foi observado que a diferença média dos níveis de força com a prática do exercício é significativa ($p < 0.0001$). Conclui-se que os exercícios resistidos provocaram melhora significativa na força de membros superiores e inferiores das mulheres da população investigada.

LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?

FANTOZZI, Caio*; Azevedo, Flávia Fernanda Salazar; LIMA, Ludmylla Araújo; FREITAS, Mauro José Correia Filho; BELFORT, Michelle Fernanda; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa uma grande oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido em sala de aula para com a comunidade civil. Neste sentido escolhemos falar sobre a dieta para os intolerantes a lactose, tentando esclarecer alguns pontos como: o que é a lactose, qual diferença entre alergia e intolerância, qual a alimentação adequada, entre outros. É importante ressaltar que a dieta aos intolerantes a lactose tem como base a eliminação do consumo de qualquer produto que contenha o carboidrato chamado lactose, pois o organismo não produz ou produz pouca quantidade da enzima lactase, responsável pela digestão deste carboidrato. Em relação às pessoas alérgicas, na verdade elas são responsivas a presença de algumas proteínas do leite, que são identificadas pelo nosso sistema imunológico como um agente agressor, causando assim a alergia. Nestes casos, deve-se substituir do leite de vaca e seus derivados por outros alimentos, tais como o leite de soja, arroz entre outras fontes de cálcio e proteínas. O diagnóstico entre intolerância ou alergia somente pode ser dado por um profissional especializado, sendo necessário o acompanhamento de um nutricionista ou médico.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; ABREU, Wagner Seixas; RODRIGUES, Maria Giulliane Silva; CASTRO, Bruno; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

VOCÊ CONHECE A GOTA?

COSTA, Lucélia Regina da Silva*; OLIVEIRA, Itamara Simone Reis; SILVA, Diego Vieira da; SILVA, Wenner Patrick Ferreira da ;CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A gota é uma doença reumatológica, inflamatória e metabólica, que cursa com hiperuricemia (elevação dos níveis de ácido úrico no sangue) e é resultante da deposição de cristais do ácido úrico nos tecidos e articulações. Entretanto, esta doença ainda pouco conhecida, é um sério problema que afeta principalmente a saúde dos homens com 30 a 50 anos de idade.

Neste contexto, nosso objetivo é divulgar, esclarecer e conscientizar a população sobre a importância desta doença. Uma das medidas adotadas foi falar sobre a dieta para melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença. Para manter o nível de ácido úrico normal no sangue, o portador da doença precisa seguir uma dieta pobre em carnes, ou seja, baixo consumo de proteínas. É importante ingerir cerca de três litros de água por dia, para auxiliar a excreção do excesso de ácido úrico e para reduzir a possibilidade de formação de cálculos renais. Também devem ser evitados alimentos muito gordurosos, como as frituras, e aqueles que tenham muito açúcar, pois o excesso de gordura e açúcar torna o sangue mais ácido.

PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro*; SILVA, Luis Gustavo Cássio da; RODRIGUES, Maria Darte Furtado; MORAES, Denis Ranieri de ; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE

LACERDA, Cahuan*; SANTOS, Josiane; LIMA, Palmira; PEREIRA, Simone; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A berinjela é um alimento acessível à população e muito importante para saúde humana. Dentre seus princípios medicinais, podemos citar o poder de reduzir a taxa de colesterol plasmático, podendo também atuar diminuindo a pressão sanguínea e prevenindo a arteriosclerose. Também é recomendada nos casos de artrite, apresentando bons resultados na gota e no reumatismo, bem como na diabetes e nas inflamações da pele em geral. É importante ressaltar que a berinjela não deve ser usada com frequência, para que não haja hipoglicemia, e seu uso medicinal é restrito à pacientes diabéticos, hipertensos e com casos de reumatismo, senão, pode haver efeitos citotóxicos, tal como a baixa da hemoglobina, causando anemia.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1

SOUSA, Albert Alexandre Costa de *; GASSMANN, Hildenesa; SOUSA, Waltone Silva ; RAMOS, Allan Moura; COSTA, Iasmim Lima; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

ALVES, Chirlene Lemos*; LEITE, HaddaLyzandra Austríaco; FALCÃO, Tércia; MAIA, Etevaldo; RIZZI, Claudia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: haddalyz@hotmail.com

O projeto de extensão “Atendimento de Urgências Endodônticas” é uma ação que visa prover assistência odontológica em situações de urgência endodôntica ao público que busca a Universidade Ceuma e, ainda, possibilita aos acadêmicos o aperfeiçoamento concomitante de práticas de diagnóstico e tratamento de pessoas acometidas por dor e desconforto de origem pulpar ou periapical. Teve início em Abril de 2014, onde alunos a partir do 7º período, tratam dos casos de urgência sobre a supervisão dos professores Cláudia Rizzi, Tércia Falcão e Etevaldo Maia, participantes do projeto. Desde então já foram realizados 100 atendimentos, sendo eles exodontias, drenagens de abscessos, traumatismos dentais, entre outros. Tais procedimentos buscam retirar o paciente da situação de dor e encaminha-los para a continuação adequada do tratamento. Existe grande procura por parte dos alunos para participarem do projeto.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 1

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro; CARVALHO, Luana Demétrio; LIMA, Anna Paula Da Silva; VIEIRA, Brenna Larissa Barros; PASSINIO, Josinete Pereira Louzeiro; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Maciel Lima

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial e é tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da sequela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de bucal.

PREVINA-SE A DENGUE MATA

SANTOS, Artur Eduardo Kalatakis dos; FILHO, Marcelo De Oliveira Veras; SALES, Erica Edelyn Rodrigues de; SANTOS, Ana Carolina Teixeira Rodrigues; SILVA, Thaynara Pinto; SILVA, Bruno Bertone Rodrigues da; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A fim de alertar a sociedade para se prevenir contra a dengue, uma doença que parece ser pouco agressiva e de fácil prevenção, elaboramos um painel autoexplicativo sobre os principais métodos para a erradicação desta doença. Isto porque, nos casos de uma reinfecção, os sintomas da doença se tornam mais graves, e o indivíduo apresenta a forma mais temida desta doença, conhecida como dengue hemorrágica. Milhões de pessoas são anualmente infectadas por um dos quatro tipos de vírus da dengue, onde a transmissão acontece pelo mosquito fêmea do *Aedes aegypti*, o qual necessita de nosso sangue para depositar seus ovos em recipiente com água limpa e parada. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana e após este período transformam-se em novos mosquitos adultos, prontos para reiniciar este ciclo. Mesmo com a facilidade de se combater esta doença, ainda têm pessoas que desconhecem as suas formas de prevenção, por isso, esta doença continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 2

SILVA, Antônia Cláudia Gonçalves*; BOGEA, Leticia de Albuquerque; RIOS, Rayanne Martins dos; SILVA, Fabíola Ayane Costa; SOUSA, RhuanaDrielly Rodrigues de; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Maciel Lima

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial E É tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da sequela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de bucal.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 3

LEAL, Lyvia Cristine Lopes Oliveira*; COSTA, Iasmim Lima; NASCIMENTO, Mônica Caroline Mendes; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; REIS, Washington

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial E É tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da sequela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de bucal.

GRIPE NÃO, É TUBERCULOSE!

NASCIMENTO, Ana Paula *; MASCARENHAS, Bruna Maria; PENHA, Leani; SANTOS, Sarah Regina; TRINDADE, Elyanne ; VALE, Yaratane ; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Estética

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa a real possibilidade de apresentar ao público externo, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da Universidade. Para participarmos desta atividade, escolhemos uma doença que causa grande risco à saúde pública, a Tuberculose, principalmente porque seus sintomas iniciais podem ser confundidos com os da gripe. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo de Koch, cujo nome científico é *Mycobacterium tuberculosis*. A sua transmissão ocorre por meio das secreções respiratórias. Os sintomas dos pacientes infectados são: tosse por mais de três semanas, falta de apetite, febre ao entardecer, perda de peso, cansaço fácil e suores noturnos. Uma das curiosidades desta doença é que além do pulmão, os bacilos podem se espalhar para os nódulos linfáticos e daí, através da corrente sanguínea, para tecidos mais distantes onde a doença pode se desenvolver: na parte superior dos pulmões, nos rins, no cérebro e até mesmo nos ossos. É importante ressaltar que a tuberculose tem cura e o sucesso do tratamento é tomar os medicamentos (antibióticos) durante os seis meses sem interrupção, de acordo com a prescrição do médico.

GONORREIA: CONHECER PARA SE PROTEGER

SILVA, Ateniry Santos*; MAGALHÃES, Ester Campos; SOARES, Edna Sousa da Silva; SOUSA, Crystiane Lima de; SILVA, Raissa dos Santos; NETA, Nadir Serra; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Estética

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária interliga a universidade, nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da população, permitindo não só a diminuição das desigualdades sociais, mas também uma formação profissional teórico-prática efetiva. Neste sentido, gostaríamos de conscientizar a população dos riscos da relação sexual sem camisinha e apresentar a gonorreia como uma doença sexualmente transmissível (DST). Causada por uma bactéria gram negativa, chamada de Neisseriagonorrhoeae, a gonorreia é uma doença de distribuição universal que afeta ambos os sexos, principalmente os sexualmente ativos. É importante ressaltar que o parceiro sexual do paciente infectado deve ser examinado e tratado. Esse procedimento evita futuras (re)transmissões da doença. Lembrando sempre que o diagnóstico só pode ser feito por médico especializado.

PINTINHAS? SÓ É LEGAL NA GALINHA PINTADINHA.

CÂMARA, Aline Maciel*; FERREIRA, Aline de Sousa; RIBEIRO, Ana Carolina; ANDRADE, Amanda Ketlen; VIEIRA, Bernada dos Santos; SANTOS, Gessimaria Alves ; FURTADO, Hellen; CONCEIÇÃO, Samella dos Santos; BASTOS, Raimunda Santos; MENDES, Raynara; PINTO, Rayssa ; COSTA, Renata Costa; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Apresentamos um painel de extensão universitária com o objetivo de orientar a prevenção do sarampo na comunidade ludovicense. Durante muitos anos o sarampo, causado pelo vírus da família Paramyxoviridae, foi uma das principais causas de morbidade e mortalidades na infância. Foi somente na década de 60, com a introdução da vacina no Brasil, que os índices desta doença caíram significativamente. Entretanto, ainda hoje, ocorrem cerca de 40 milhões de novos casos e um a dois milhões de mortes por ano em países sem programas de vacinação eficientes. Assim, é de fundamental importância conscientizar a população sobre os benefícios da imunização com as vacinas e de que o vírus do sarampo ainda existe na natureza, causando uma doença infecciosa aguda extremamente contagiosa pelo contato direto com secreções respiratórias, tais como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse.

AFASTE-SE DOS POMBOS!

ALMEIDA, Samila ; FERRAZ, Camila; MESQUITA, Rayane ; MUNIZ, Adriana; PEREIRA, Isabella; UCHOA, Raniele ; CASTRO, Fernanda; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Existem certas coisas que parecem ser inofensivas, mas, por incrível que pareça, não são! Como é o caso dos pombos. Em algumas cidades, estes animais se tornaram um risco à saúde pública, pois sua população cresce rapidamente e suas fezes podem conter microrganismos causadores de várias doenças respiratórias graves, que podem levar à morte ou deixar sequelas. Os pombos estão presentes em quase todos os lugares, desde praças, parques, telhados das casas, etc; e são UM Dos principais transmissores da criptococose, também conhecida como torulose, blastomicose europeia ou doença de Busse-Buschke, causada pelo fungo chamado Cryptococcus neoformans. O sintoma mais grave provocado por essa doença é a meningite, além de fortes dores de cabeça, sensibilidade à luz, dores no peito, rigidez na nuca, suores noturnos, confusão mental, alterações de visão, espirros, vômitos, febre, fraqueza, perda de coordenação motora, perda da fala, entre muitos outros. Assim, atividades sócio-educativas, tal como atividades de extensão universitária, são de extrema importância para conscientizar a população de que cuidados gerais de higiene são necessários para manusear as fezes destes, bem como de outros animais. Cabe também ressaltar que medidas especiais devem ser tomadas a fim de evitar a proliferação dos pombos, tais como não alimentar estes animais em vias públicas, não deixar água reservada e não oferecer abrigos a estes animais.

CUIDE DO SEU MAIOR PATRIMÔNIO... SEU CORPO... SUA VIDA

RIBEIRO, Amanda Silva; RODRIGUES JUNIOR, Carlos Roberto Coelho; SOUSA, Dhenne Maria dos Santos; FERREIRA, Gisele Lima; COSTA, Hannah Ctalina Gomes Machado; SILVA, Hélias Brito; PINHEIRO, Lucas Branly Costa; ATAIDE, Lyslane Gomes; SOUZA, Maryelma do Carmo Neves; PESSOA, Mirella Costa; VIEIRA, KetlemRamyras Silva; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: A extensão universitária representa a oportunidade de discentes exporem suas ideias. Através deste projeto, poder informar as pessoas sobre o vírus do HIV é algo importantíssimo, pois o vírus da imunodeficiência humana, conhecido popularmente como HIV, é considerado uma pandemia mundial. Segundo dados da UNAIDS (Órgão da ONU para AIDS) existem 490 mil brasileiros infectados com vírus do HIV atualmente. Assim, a escolha da doença partiu de um princípio informativo, pois a população precisa estar ciente da gravidade do vírus HIV. Pesquisas indicam que o HIV surgiu no Centro-Oeste da África durante o início do século XX (SHARP. P.M. et al., 2011) e desde sua descoberta (em 1981) já matou cerca de 30 milhões de pessoas até o ano de 2009 (UNAIDS, 2010). Este vírus pode manter-se em estado de latência por até dez anos, que é quando a AIDS (acquiredimmunodeficiencysyndrome) se manifesta causando constante cansaço, diarreia, febre, perda de peso acelerado, entre outros. O diagnóstico pode ser feito em qualquer posto de saúde a partir de uma gota de sangue retirada do dedo. Infelizmente, a AIDS ainda não tem cura, mas os portadores do HIV dispõem de tratamento gratuito oferecido pelo governo (atendimento SUS).

CUIDADO, OLHA O POMBO!!!

SILVA, Bianny Beatriz Texeira; PEREIRA, Fábio Henrique Ferreira; SOUZA, Kelly Rayane Nunes; CAIRES, Lorena da Silva;* OLIVEIRA, Luciellen Pinheiro; LAGO, Mayk Pereira Lago; SILVA, Mayhara dos Santos Silva; MORAIS, Nathanny; SILVA, Raimunda Ilcilene Machado; NOGUEIRA, Zulane Regina Chagas Nogueira; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Através dos trabalhos de extensão universitária podemos informar e conscientizar a população sobre os mais diferentes temas da atualidade, principalmente os relativos às doenças que acometem o ser humano. Neste sentido, nos propusemos a realizar um painel informativo a respeito da histoplasmoze, uma doença fúngica pouco conhecida, que é um motivo de preocupação da saúde pública mundial. Popularmente conhecida como doença do pombo, a histoplasmoze é considerada uma das micoses mais frequentes no mundo, comprometendo significativamente as pessoas com baixa imunidade, como é o caso de portadores do vírus HIV. A histoplasmoze é adquirida através da inalação dos esporos do fungo Histoplasma capsulatum presentes nas fezes de aves, roedores e marsupiais. Os principais sintomas da doença na fase aguda são: tosse, dispnéia marcante, bronco espasmos frequentes, dor torácica, perda de peso, entre outros. Na sua forma crônica os sintomas são: febre, hepatoesplenomegalia (aumento do tamanho do fígado e do baço) e anemia.

NÃO TEM OUTRA OPÇÃO: CAMISINHA E HIGIENIZAÇÃO. CANDIDÍASE MERECE ATENÇÃO!

AZEVEDO, Brandow Washington ; ABREU, Bruna Raphaela ; ALMEIDA, Isamara ; SABÁ, Joyce Luise; NASCIMENTO, Carolina*; PINHEIRO, Elisiomar ; SALES, Francisco Sales; NASCIMENTO, Lourival; LEMOS, Saffira; MESEZES, Rangel; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: A extensão universitária é uma importante forma de transmitir o conhecimento adquirido em sala. Escolhemos a doença fúngica causada pela Candida sp. como foco de nossa divulgação, para expor à população seus sintomas e malefícios. A candidíase é comum em nossa região, porém pouco conhecida. Em ambos os sexos os sintomas são: prurido, vermelhidão, ardor genital ao urinar e no ato sexual, corrimento branco e edema leve. Em caso de suspeita, o paciente deve se dirigir ao centro de saúde mais próximo para obter um diagnóstico preciso da doença, assim, também receberá um tratamento eficaz e mais informações sobre os métodos de higienização adequados. O fungo causador da candidíase

habita, naturalmente, nosso organismo, podendo proliferar-se, caindo na corrente sanguínea e afetando diversos órgãos, em situações como: baixa imunidade, uso prolongado de antibióticos, anticoncepcionais, pacientes com diabetes, leucemia, HIV positivos, portadores do HPV.

QUAL SEU TIPO?

SOUSA, Djacir Carvalho de*; CAMARA, Francieno Lindoso; SOUSA, Danilo Coutinho de; BARBETTA, Gabriel de Castro; MECKING, Laila Mendes; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: barsalobres@gmail.com

As atividades de extensão são articulações entre a pesquisa e o ensino, possibilitando a real participação de discentes nos processos sociais. Em busca de uma ação cidadã, nos propusemos a confeccionar um painel sobre a dieta do sangue. Esta dieta explica que os tipos sanguíneos (A, B, AB ou O) tem forte influência no organismo. Eles determinam a eficiência do metabolismo, do sistema imunológico, o estado emocional e até mesmo a personalidade de cada indivíduo. Esta dieta também pode promover o bem-estar, diminuir o peso e fortalecer a saúde a partir de uma mudança dos hábitos alimentares. Sem comprovações científicas, essa dieta promove a qualidade de vida, desde que seguida por uma alimentação adequada e saudável e com a prática de exercícios físicos.

PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro*; SILVA, Luis Gustavo Cássio da; RODRIGUES, Maria Darte Furtado; MORAES, Denis Raniere de; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

VOCÊ CONHECE A GOTA?

COSTA, Lucélia Regina da Silva*; OLIVEIRA, Itamara Simone Reis; SILVA, Diego Vieira da; SILVA, Wenner Patrick Ferreira da; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A gota é uma doença reumatológica, inflamatória e metabólica, que cursa com hiperuricemia (elevação dos níveis de ácido úrico no sangue) e é resultante da deposição de cristais do ácido úrico nos tecidos e articulações. Entretanto, esta doença ainda pouco conhecida, é um sério problema que afeta principalmente a saúde dos homens com 30 a 50 anos de idade. Neste contexto, nosso objetivo é divulgar, esclarecer e conscientizar a população sobre a importância desta doença. Uma das medidas adotadas foi falar sobre a dieta para melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença. Para manter o nível de ácido úrico normal no sangue, o portador da doença precisa seguir uma dieta pobre em carnes, ou seja, baixo consumo de proteínas. É importante ingerir cerca de três litros de água por dia, para auxiliar a excreção do excesso de ácido úrico e para reduzir a possibilidade de formação de cálculos renais. Também devem ser evitados alimentos muito gordurosos, como as frituras, e aqueles que tenham muito açúcar, pois o excesso de gordura e açúcar torna o sangue mais ácido.

LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?

FANTOZZI, Caio*; Azevedo, Flávia Fernanda Salazar; LIMA, Ludmylla Araújo; FREITAS, Mauro José Correia Filho; BELFORT, Michelle Fernanda; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa uma grande oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido em sala de aula para com a comunidade civil. Neste sentido escolhemos falar sobre a dieta para os intolerantes a lactose, tentando esclarecer alguns pontos como: o que é a lactose, qual diferença entre alergia e intolerância, qual a alimentação adequada, entre outros. É importante ressaltar que a dieta aos intolerantes a lactose tem como base a eliminação do consumo de qualquer produto que contenha o carboidrato chamado lactose, pois o organismo não produz ou produz pouca quantidade da enzima lactase, responsável pela digestão deste carboidrato. Em relação às pessoas alérgicas, na verdade elas são responsivas a presença de algumas proteínas do leite, que são identificadas pelo nosso sistema imunológico como um agente agressor, causando assim a alergia. Nestes casos, deve-se substituir do leite de vaca e seus derivados por outros alimentos, tais como o leite de soja, arroz entre outras fontes de cálcio e proteínas. O diagnóstico entre intolerância ou alergia somente pode ser dado por um profissional especializado, sendo necessário o acompanhamento de um nutricionista ou médico.

BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE

LACERDA, Cahuan*; SANTOS, Josiane; LIMA, Palmira; PEREIRA, Simone; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A berinjela é um alimento acessível à população e muito importante para saúde humana. Dentre seus princípios medicinais, podemos citar o poder de reduzir a taxa de colesterol plasmático, podendo também atuar diminuindo a pressão sanguínea e prevenindo a arteriosclerose. Também é recomendada nos casos de artrite, apresentando bons resultados na gota e no reumatismo, bem como na diabetes e nas inflamações da pele em geral. É importante ressaltar que a berinjela não deve ser usada com frequência, para que não haja hipoglicemia, e seu uso medicinal é restrito à pacientes diabéticos, hipertensos e com casos de reumatismo, senão, pode haver efeitos citotóxicos, tal como a baixa da hemoglobina, causando anemia.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; ABREU, Wagner Seixas; RODRIGUES, Maria Giuliane Silva; CASTRO, Bruno; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1

SOUSA, Albert Alexandre Costa de *; GASSMANN, Hildenesa; SOUSA, Waltone Silva ; RAMOS, Allan Moura; COSTA, Iasmim Lima; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação
Curso: Odontologia
E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

AFASTE-SE DOS POMBOS!

ALMEIDA, Samila ; FERRAZ, Camila; MESQUITA, Rayane ; MUNIZ, Adriana; PEREIRA, Isabella; UCHOA, Raniele ; CASTRO, Fernanda; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia
Categoria: graduação
Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Existem certas coisas que parecem ser inofensivas, mas, por incrível que pareça, não são! Como é o caso dos pombos. Em algumas cidades, estes animais se tornaram um risco à saúde pública, pois sua população cresce rapidamente e suas fezes podem conter microrganismos causadores de várias doenças respiratórias graves, que podem levar à morte ou deixar sequelas. Os pombos estão presentes em quase todos os lugares, desde praças, parques, telhados das casas, etc; e são UM Dos principais transmissores da criptococose, também conhecida como torulose, blastomicoseeuropéia ou doença de Busse-Buschke, causada pelo fungo chamado Cryptococcusneoformans. O sintoma mais grave provocado por essa doença é a meningite, além de fortes dores de cabeça, sensibilidade à luz, dores no peito, rigidez na nuca, suores noturnos, confusão mental, alterações de visão, espirros, vômitos, febre, fraqueza, perda de coordenação motora, perda da fala, entre muitos outros. Assim, atividades sócio-educativas, tal como atividades de extensão universitária, são de extrema importância para conscientizar a população de que cuidados gerais de higiene são necessários para manusear as fezes destes, bem como de outros animais. Cabe também ressaltar que medidas especiais devem ser tomadas a fim de evitar a proliferação dos pombos, tais como não alimentar estes animais em vias públicas, não deixar água reservada e não oferecer abrigos a estes animais.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

ALVES, Chirlene Lemos*; LEITE, HaddaLyzandra Austríaco; FALCÃO, Tércia; MAIA, Etevaldo; RIZZI, Claudia

Curso: Odontologia
Categoria: Graduação
E-mail: haddalyz@hotmail.com

O projeto de extensão “Atendimento de Urgências Endodônticas” é uma ação que visa prover assistência odontológica em situações de urgência endodôntica ao público que busca a Universidade Ceuma e, ainda, possibilita aos acadêmicos o aperfeiçoamento concomitante de práticas de diagnóstico e tratamento de pessoas acometidas por dor e desconforto de origem pulpar ou periapical. Teve início em Abril de 2014, onde alunos a partir do 7º período, tratam dos casos de urgência sobre a supervisão dos professores Cláudia Rizzi, Tércia Falcão e Etevaldo Maia, participantes do projeto. Desde então já foram realizados 100 atendimentos, sendo eles exodontias, drenagens de abscessos, traumatismos dentais, entre outros. Tais procedimentos buscam retirar o paciente da situação de dor e encaminha-los para a continuação adequada do tratamento. Existe grande procura por parte dos alunos para participarem do projeto.

NÃO TEM OUTRA OPÇÃO: CAMISINHA E HIGIENIZAÇÃO. CANDIDÍASE MERECE ATENÇÃO!

AZEVEDO, Brandow Washington ; ABREU, Bruna Raphaela ; ALMEIDA, Isamara ; SABÁ, Joyce Luise; NASCIMENTO, Carolina*; PINHEIRO, Elisiomar ; SALES, Francisco Sales; NASCIMENTO, Lourival; LEMOS, Saffira; MESEZES, Rangel;Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia
Categoria: graduação
Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: A extensão universitária é uma importante forma de transmitir o conhecimento adquirido em sala. Escolhemos a doença fúngica causada pela *Candida sp.* como foco de nossa divulgação, para expor à população seus sintomas e malefícios. A candidíase é comum em nossa região, porém pouco conhecida. Em ambos os sexos os sintomas são: plurídeo, vermelhidão, ardor genital ao urinar e no ato sexual, corrimento branco e edema leve. Em caso de suspeita, o paciente deve se dirigir ao centro de saúde mais próximo para obter um diagnóstico preciso da doença, assim, também receberá um tratamento eficaz e mais informações sobre os métodos de higienização adequados. O fungo causador da candidíase habita, naturalmente, nosso organismo, podendo proliferar-se, caindo na corrente sanguínea e afetando diversos órgãos, em situações como: baixa imunidade, uso prolongado de antibióticos, anticoncepcionais, pacientes com diabetes, leucemia, HIV positivos, portadores do HPV.

PINTINHAS? SÓ É LEGAL NA GALINHA PINTADINHA.

CÂMARA, Aline Maciel*; FERREIRA, Aline de Sousa; RIBEIRO, Ana Carolina; ANDRADE, Amanda Ketlen; VIEIRA, Bernada dos Santos; SANTOS, Gessimaria Alves ; FURTADO, Hellen; CONCEIÇÃO, Samella dos Santos; BASTOS, Raimunda Santos; MENDES, Raynara; PINTO, Rayssa ; COSTA, Renata Costa;Cavallari. Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia
Categoria: graduação
Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Apresentamos um painel de extensão universitária com o objetivo de orientar a prevenção do sarampo na comunidade ludovicense. Durante muitos anos o sarampo, causado pelo vírus da família Paramyxoviridae, foi uma das principais causas de morbidade e mortalidades na infância. Foi somente na década de 60, com a introdução da vacina no Brasil, que os índices desta doença caíram significativamente. Entretanto, ainda hoje, ocorrem cerca de 40 milhões de novos casos e um a dois milhões de mortes por ano em países sem programas de vacinação eficientes. Assim, é de fundamental importância conscientizar a população sobre os benefícios da imunização com as vacinas e de que o vírus do sarampo ainda existe na natureza, causando uma doença infecciosa aguda extremamente contagiosa pelo contato direto com secreções respiratórias, tais como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse.

PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro*; SILVA, Luis Gustavo Cássio da; RODRIGUES, Maria Darte Furtado; MORAES, Denis Raniere de; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação
Curso: Odontologia
E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

PROJETO TRAUMA DENTOALVEOLAR 2

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro*; SILVA, Luis Gustavo Cássio da; RODRIGUES, Maria Darte Furtado; MORAES, Denis Raniere de ; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL,Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação
Curso: Odontologia
E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 1

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro; CARVALHO, Luana Demétrio; LIMA, Anna Paula Da Silva; VIEIRA, Brenna Larissa Barros; PASSINIO, Josinete Pereira Louzeiro; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Maciel Lima

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial e é tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da sequela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de bucal.

VOCÊ CONHECE A GOTA?

COSTA, Lucélia Regina da Silva*; OLIVEIRA, Itamara Simone Reis; SILVA, Diego Vieira da; SILVA, Wenner Patrick Ferreira da ;CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A gota é uma doença reumatológica, inflamatória e metabólica, que cursa com hiperuricemia (elevação dos níveis de ácido úrico no sangue) e é resultante da deposição de cristais do ácido úrico nos tecidos e articulações. Entretanto, esta doença ainda pouco conhecida, é um sério problema que afeta principalmente a saúde dos homens com 30 a 50 anos de idade. Neste contexto, nosso objetivo é divulgar, esclarecer e conscientizar a população sobre a importância desta doença. Uma das medidas adotadas foi falar sobre a dieta para melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença. Para manter o nível de ácido úrico normal no sangue, o portador da doença precisa seguir uma dieta pobre em carnes, ou seja, baixo consumo de proteínas. É importante ingerir cerca de três litros de água por dia, para auxiliar a excreção do excesso de ácido úrico e para reduzir a possibilidade de formação de cálculos renais. Também devem ser evitados alimentos muito gordurosos, como as frituras, e aqueles que tenham muito açúcar, pois o excesso de gordura e açúcar torna o sangue mais ácido.

VOCÊ CONHECE A GOTA?

COSTA, Lucélia Regina da Silva*; OLIVEIRA, Itamara Simone Reis; SILVA, Diego Vieira da; SILVA, Wenner Patrick Ferreira da; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A gota é uma doença reumatológica, inflamatória e metabólica, que cursa com hiperuricemia (elevação dos níveis de ácido úrico no sangue) e é resultante da deposição de cristais do ácido úrico nos tecidos e articulações. Entretanto, esta doença

ainda pouco conhecida, é um sério problema que afeta principalmente a saúde dos homens com 30 a 50 anos de idade. Neste contexto, nosso objetivo é divulgar, esclarecer e conscientizar a população sobre a importância desta doença. Uma das medidas adotadas foi falar sobre a dieta para melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença. Para manter o nível de ácido úrico normal no sangue, o portador da doença precisa seguir uma dieta pobre em carnes, ou seja, baixo consumo de proteínas. É importante ingerir cerca de três litros de água por dia, para auxiliar a excreção do excesso de ácido úrico e para reduzir a possibilidade de formação de cálculos renais. Também devem ser evitados alimentos muito gordurosos, como as frituras, e aqueles que tenham muito açúcar, pois o excesso de gordura e açúcar torna o sangue mais ácido.

LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?

FANTOZZI, Caio*; Azevedo, Flávia Fernanda Salazar; LIMA, Ludmylla Araújo; FREITAS, Mauro José Correia Filho; BELFORT, Michelle Fernanda; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa uma grande oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido em sala de aula para com a comunidade civil. Neste sentido escolhemos falar sobre a dieta para os intolerantes a lactose, tentando esclarecer alguns pontos como: o que é a lactose, qual diferença entre alergia e intolerância, qual a alimentação adequada, entre outros. É importante ressaltar que a dieta aos intolerantes a lactose tem como base a eliminação do consumo de qualquer produto que contenha o carboidrato chamado lactose, pois o organismo não produz ou produz pouca quantidade da enzima lactase, responsável pela digestão deste carboidrato. Em relação às pessoas alérgicas, na verdade elas são responsivas a presença de algumas proteínas do leite, que são identificadas pelo nosso sistema imunológico como um agente agressor, causando assim a alergia. Nestes casos, deve-se substituir do leite de vaca e seus derivados por outros alimentos, tais como o leite de soja, arroz entre outras fontes de cálcio e proteínas. O diagnóstico entre intolerância ou alergia somente pode ser dado por um profissional especializado, sendo necessário o acompanhamento de um nutricionista ou médico.

LACTOSE: UM BICHO DE SETE CABEÇAS?

FANTOZZI, Caio*; Azevedo, Flávia Fernanda Salazar; LIMA, Ludmylla Araújo; FREITAS, Mauro José Correia Filho; BELFORT, Michelle Fernanda; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa uma grande oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido em sala de aula para com a comunidade civil. Neste sentido escolhemos falar sobre a dieta para os intolerantes a lactose, tentando esclarecer alguns pontos como: o que é a lactose, qual diferença entre alergia e intolerância, qual a alimentação adequada, entre outros. É importante ressaltar que a dieta aos intolerantes a lactose tem como base a eliminação do consumo de qualquer produto que contenha o carboidrato chamado lactose, pois o organismo não produz ou produz pouca quantidade da enzima lactase, responsável pela digestão deste carboidrato. Em relação às pessoas alérgicas, na verdade elas são responsivas a presença de algumas proteínas do leite, que são identificadas pelo nosso sistema imunológico como um agente agressor, causando assim a alergia. Nestes casos, deve-se substituir do leite de vaca e seus derivados por outros alimentos, tais como o leite de soja, arroz entre outras fontes de cálcio e proteínas. O diagnóstico entre intolerância ou alergia somente pode ser dado por um profissional especializado, sendo necessário o acompanhamento de um nutricionista ou médico.

BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE

LACERDA, Cahuan*; SANTOS, Josiane; LIMA, Palmira; PEREIRA, Simone; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-Mail: barsalobres@gmail.com

A berinjela é um alimento acessível à população e muito importante para saúde humana. Dentre seus princípios medicinais, podemos citar o poder de reduzir a taxa de colesterol plasmático, podendo também atuar diminuindo a pressão

sanguínea e prevenindo a arteriosclerose. Também é recomendada nos casos de artrite, apresentando bons resultados na gota e no reumatismo, bem como na diabetes e nas inflamações da pele em geral. É importante ressaltar que a berinjela não deve ser usada com frequência, para que não haja hipoglicemia, e seu uso medicinal é restrito à pacientes diabéticos, hipertensos e com casos de reumatismo, senão, pode haver efeitos citotóxicos, tal como a baixa da hemoglobina, causando anemia.

BERINGELA, O ROXO DA SAÚDE

LACERDA, Cahuan*; SANTOS, Josiane; LIMA, Palmira; PEREIRA, Simone; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: barsalobres@gmail.com

A berinjela é um alimento acessível à população e muito importante para saúde humana. Dentre seus princípios medicinais, podemos citar o poder de reduzir a taxa de colesterol plasmático, podendo também atuar diminuindo a pressão sanguínea e prevenindo a arteriosclerose. Também é recomendada nos casos de artrite, apresentando bons resultados na gota e no reumatismo, bem como na diabetes e nas inflamações da pele em geral. É importante ressaltar que a berinjela não deve ser usada com frequência, para que não haja hipoglicemia, e seu uso medicinal é restrito à pacientes diabéticos, hipertensos e com casos de reumatismo, senão, pode haver efeitos citotóxicos, tal como a baixa da hemoglobina, causando anemia.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 3

LEAL, Lyvia Cristine Lopes Oliveira*; COSTA, Iasmim Lima; NASCIMENTO, Mônica Caroline Mendes; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; REIS, Washington

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial. É tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da seqüela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de boca.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA DE IAM NO CENTRO DE SAÚDE AMAR.

MOURA, Meirielle de Sousa*; SILVA, Cristiane Alves; NUNES Joana Katya Veras Rodrigues Sampaio; SILVA Flor de Maria Araujo Mendonça

Categoria: Graduação

Email: meiriellesm@hotmail.com

A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras 2 horas de manifestação da doença. Assim, a maior parte dessas mortes acontecem fora do ambiente hospitalar, geralmente desassistida pelos médicos. Sabe-se que a fase pré-hospitalar é caracterizada por ser demorada, especialmente em idosos, sexo feminino e pessoas com baixa condição socioeconômica. Alguns fatores estão relacionados ao aumento desse tempo tão precioso. Este trabalho tem como objetivo geral capacitar os profissionais técnicos de saúde na prevenção primária para casos de IAM no centro de saúde AMAR. Sendo os objetivos específicos: A orientação sobre a identificação precoce dos sinais e sintomas do IAM; Identificar os fatores de risco que levam ao IAM, além dos meios de acesso ao socorro precoce, bem como estimular a troca de experiências nas oficinas.

GRIPE NÃO, É TUBERCULOSE!

NASCIMENTO, Ana Paula *; MASCARENHAS, Bruna Maria; PENHA, Leani; SANTOS, Sarah Regina; TRINDADE, Elyanne ; VALE, Yaratane ; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Estética

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária representa a real possibilidade de apresentar ao público externo, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da Universidade. Para participarmos desta atividade, escolhemos uma doença que causa grande risco à saúde pública, a Tuberculose, principalmente porque seus sintomas iniciais podem ser confundidos com os da gripe. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo de Koch, cujo nome científico é *Mycobacterium tuberculosis*. A sua transmissão ocorre por meio das secreções respiratórias. Os sintomas dos pacientes infectados são: tosse por mais de três semanas, falta de apetite, febre ao entardecer, perda de peso, cansaço fácil e suores noturnos. Uma das curiosidades desta doença é que além do pulmão, os bacilos podem se espalhar para os nódulos linfáticos e daí, através da corrente sanguínea, para tecidos mais distantes onde a doença pode se desenvolver: na parte superior dos pulmões, nos rins, no cérebro e até mesmo nos ossos. É importante ressaltar que a tuberculose tem cura e o sucesso do tratamento é tomar os medicamentos (antibióticos) durante os seis meses sem interrupção, de acordo com a prescrição do médico.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; ABREU, Wagner Seixas; RODRIGUES, Maria Giulliane Silva; CASTRO, Bruno; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

GUIDE DO SEU MAIOR PATRIMÔNIO... SEU CORPO... SUA VIDA

RIBEIRO, Amanda Silva; RODRIGUES JUNIOR, Carlos Roberto Coelho; SOUSA, Dhenne Maria dos Santos; FERREIRA, Gisele Lima; COSTA, Hannah Ctalina Gomes Machado; SILVA, Hélias Brito; PINHEIRO, Lucas Branly Costa; ATAIDE, Lyslane Gomes; SOUZA, Maryelma do Carmo Neves; PESSOA, Mirella Costa; VIEIRA, KetlemRamyres Silva; Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: A extensão universitária representa a oportunidade de discentes exporem suas ideias. Através deste projeto, poder informar as pessoas sobre o vírus do HIV é algo importantíssimo, pois o vírus da imunodeficiência humana, conhecido popularmente como HIV, é considerado uma pandemia mundial. Segundo dados da UNAIDS (Órgão da ONU para AIDS) existem 490 mil brasileiros infectados com vírus do HIV atualmente. Assim, a escolha da doença partiu de um princípio informativo, pois a população precisa estar ciente da gravidade do vírus HIV. Pesquisas indicam que o HIV surgiu no Centro-Oeste da África durante o início do século XX (SHARP. P.M. et al., 2011) e desde sua descoberta (em 1981) já matou cerca de 30 milhões de pessoas até o ano de 2009 (UNAIDS, 2010). Este vírus pode manter-se em estado de latência por até dez anos, que é quando a AIDS (acquiredimmunodeficiency syndrome) se manifesta causando constante cansaço, diarreia, febre, perda de peso acelerado, entre outros. O diagnóstico pode ser feito em qualquer posto de saúde a partir de uma gota de sangue retirada do dedo. Infelizmente, a AIDS ainda não tem cura, mas os portadores do HIV dispõem de tratamento gratuito oferecido pelo governo (atendimento SUS).

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 3

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; ABREU, Wagner Seixas; RODRIGUES, Maria Giuliane Silva; CASTRO, Bruno; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

BULLYING NA ESCOLA: AÇÕES QUE PODEM PREVINIR ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA

SALES, Ana Rafaela Berredo*; PINHEIRO, Ana Camila Nunes; CAMPOS, Maria Eduarda Estrela; GOMES, Mariane; BARROS, Mirelle Fernanda Piedade; BECKMAN, Marcia Valéria Reis

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: s.anarafaela@yahoo.com.br

O presente trabalho buscou abordar e discutir o bullying, com crianças de faixa etária entre 7 e 8 anos de uma escola municipal da cidade de São Luís. O objetivo era proporcionar a construção de um conhecimento a cerca da temática junto às crianças, planejando intervenções psicopedagógicas. O projeto foi dividido em encontros, primeiramente para a observação e o levantamento de dados, caracterizando o grupo e as problemáticas, em seguida para discutir e apresentar conceitos sobre violência, agressores, vítimas e testemunhas. Os procedimentos utilizados durante tal processo foram: aulas expositivas, dinâmicas de grupos, leitura, filmes, musica e arte plástica. Os resultados observados após a intervenção foram à conscientização sobre o tema abordado e a mudança nos comportamentos inadequados referentes ao bullying, por parte das crianças, que demonstravam mais respeito umas pelas outras. Concluiu-se que, esse tipo de violência é bastante comum no contexto escolar, deste modo, destaca-se a importância de práticas preventivas desde os primeiros anos na vida escolar.

PROJETO AMIGOS DA ESCOLA: AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO.

SAMPAIO, Amanda Silva*; RIBEIRO, Kerly Madeira; SANTOS, Israel Silva dos; SOUSA, Jessica Izlene Rocha; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; DIAS, Rosane da Silva

Curso: Fisioterapia

Email: anaavelar@terra.com.br

Durante a fase de crescimento, há a possibilidade de instalação de deformidades posturais e lesões osteomioarticulares devido a adoção de posturas inadequadas. No ensino fundamental, alunos de diferentes faixas etárias e biótipos utilizam um único tipo de mobiliário escolar. Essa problemática desencadeará problemas posturais a curto, médio e longo prazo, que além de gerarem desconforto levam a desatenção e desinteresse pelas atividades pedagógicas, prejudicando não somente a saúde como também a aprendizagem dos alunos. O presente estudo, de natureza descritiva, derivada de observação sistêmica, objetivou adequação do mobiliário escolar com o biótipo de escolares do ensino fundamental de uma escola pública municipal da cidade de São Luís. A partir das medidas antropométricas realizadas em crianças de cinco a treze anos de idade, e da análise ergonômica do ambiente escolar, encontrou-se um mobiliário prejudicial ao desenvolvimento das crianças o que possibilitou a adequação e sugestão de outro que atendessem às necessidades dos alunos.

PREVINA-SE A DENGUE MATA

SANTOS, Artur Eduardo Kalatakis dos; FILHO, Marcelo De Oliveira Veras; SALES, Erica Edelyn Rodrigues de; SANTOS, Ana Carolina Teixeira Rodrigues; SILVA, Thaynara Pinto; SILVA, Bruno Bertone Rodrigues da; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A fim de alertar a sociedade para se prevenir contra a dengue, uma doença que parece ser pouco agressiva e de fácil prevenção, elaboramos um painel autoexplicativo sobre os principais métodos para a erradicação desta doença. Isto porque, nos casos de uma reinfecção, os sintomas da doença se tornam mais graves, e o indivíduo apresenta a forma mais temida desta doença, conhecida como dengue hemorrágica. Milhões de pessoas são anualmente infectadas por um dos quatro tipos de vírus da dengue, onde a transmissão acontece pelo mosquito fêmea do *Aedes aegypti*, o qual necessita de nosso sangue para depositar seus ovos em recipiente com água limpa e parada. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana e após este período transformam-se em novos mosquitos adultos, prontos para reiniciar este ciclo. Mesmo com a facilidade de se combater esta doença, ainda têm pessoas que desconhecem as suas formas de prevenção, por isso, esta doença continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.

GUIA DE AUTO EXAME BUCAL 2

SILVA, Antônia Cláudia Gonçalves*; BOGEA, Leticia de Albuquerque; RIOS, Rayanne Martins dos; SILVA, Fabíola Ayane Costa; SOUSA, RhuanaDrielly Rodrigues de; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Maciel Lima

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O câncer de boca tem aumentado cerca de 50% na população mundial. É tido como uma doença crônica, multifatorial, que resulta em alta morbidade e mortalidade, pois a grande maioria dos casos é detectada em estágios avançados, esse fato aumenta a gravidade da sequela do tratamento e diminui a sobrevida e a possibilidade de cura dos pacientes. Portanto, além da ida periódica ao Dentista, como forma de prevenção deve-se também fazer o autoexame bucal, essa medida é de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. É importante ressaltar que nem toda lesão encontrada na cavidade oral significa ser um câncer, porém qualquer alteração observada precisa ser analisada por um cirurgião-dentista. O exame pode e deve ser feito por qualquer pessoa, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica. Para fazer o autoexame bucal, é preciso apenas de um espelho e um local com boa luminosidade. O presente trabalho visa ressaltar a importância do autoexame bucal como coadjuvante no diagnóstico precoce de câncer de bucal.

GONORREIA: CONHECER PARA SE PROTEGER

SILVA, Ateniry Santos*; MAGALHÃES, Ester Campos; SOARES, Edna Sousa da Silva; SOUSA, Crystiane Lima de; SILVA, Raissa dos Santos; NETA, Nadir Serra; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Estética

Categoria: Graduação

Email: barsalobres@gmail.com

A extensão universitária interliga a universidade, nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da população, permitindo não só a diminuição das desigualdades sociais, mas também uma formação profissional teórico-prática efetiva. Neste sentido, gostaríamos de conscientizar a população dos riscos da relação sexual sem camisinha e apresentar a gonorreia como uma doença sexualmente transmissível (DST). Causada por uma bactéria gram negativa, chamada de *Neisseria gonorrhoeae*, a gonorreia é uma doença de distribuição universal que afeta ambos os sexos, principalmente os sexualmente ativos. É importante ressaltar que o parceiro sexual do paciente infectado deve ser examinado e tratado. Esse procedimento evita futuras (re)transmissões da doença. Lembrando sempre que o diagnóstico só pode ser feito por médico especializado.

CUIDADO, OLHA O POMBO!!!

SILVA, Bianny Beatriz Texeira; PEREIRA, Fábio Henrique Ferreira; SOUZA, Kelly Rayane Nunes; CAIRES, Lorena da Silva;* OLIVEIRA, Luciellen Pinheiro; LAGO, Mayk Pereira Lago; SILVA, Mayhara dos Santos Silva; MORAIS, Nathanny; SILVA, Raimunda Ilcilene Machado; NOGUEIRA, Zulane Regina Chagas Nogueira;Cavallari, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Fisioterapia

Categoria: graduação

Email: barsalobres@gmail.com

Resumo: Através dos trabalhos de extensão universitária podemos informar e conscientizar a população sobre os mais diferentes temas da atualidade, principalmente os relativos às doenças que acometem o ser humano. Neste sentido, nos propusemos a realizar um painel informativo a respeito da histoplasmose, uma doença fúngica pouco conhecida, que é um motivo de preocupação da saúde pública mundial. Popularmente conhecida como doença do pombo, a histoplasmose é considerada uma das micoses mais frequentes no mundo, comprometendo significativamente as pessoas com baixa imunidade, como é o caso de portadores do vírus HIV. A histoplasmose é adquirida através da inalação dos esporos do fungo *Histoplasma capsulatum* presentes nas fezes de aves, roedores e marsupiais. Os principais sintomas da doença na fase aguda são: tosse, dispnéia marcante, bronco espasmos frequentes, dor torácica, perda de peso, entre outros. Na sua forma crônica os sintomas são: febre, hepatoesplenomegalia (aumento do tamanho do fígado e do baço) e anemia.

UNICEUMA SEM FRONTEIRAS

SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro*; MATOS, Pamella Mayara Ferreira De; SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: pamellamatos@hotmail.com

O movimento da Terceira Idade encontra-se finalmente estabelecido e urge um novo paradigma, o de se repensar o velho. Diversas estratégias têm despontado no sentido de se estimular potenciais na descoberta de novas áreas de interesses a esta população, como também na possibilidade de descobrir, agir e produzir um novo conceito de envelhecimento. As universidades despontam como uma resposta que se manifesta para iniciar a alterar este panorama negativo reservado para o velho. O objetivo deste trabalho é apresentar a sociedade o projeto de extensão universitária "Uniceuma sem fronteiras", o qual destaca os seus objetivos como sendo entre tantos outros o de contribuir para a compreensão do lugar e do papel da pessoa de faixa etária igual ou acima de 60 anos na sociedade desenvolvendo atividades físicas intelectuais, culturais, criativas e expressivas, estabelecendo assim, novas relações sociais desta pessoa com a vida, propiciando o redescobrimto e o renascimento da sua alegria de viver. Trata-se de um projeto multidisciplinar e permanente realizado nas instalações da Universidade Ceuma, São Luis do Maranhão, com grupos constituídos por 20 idosos que são assistidos nas dependências da Universidade Ceuma Campos I-Renascença, destacando-se a sala de expressão corporal, clínica de fisioterapia, academia e laboratório de informática. As atividades oferecidas consistem em: Fisiomotricidade (Cinesioterapia em grupo para as idosas);Condicionamento físico (Atividade física na academia); Hidroginástica (Hidrocinestioterapia em grupo); Oficinas de memória (Atividades de cunho cognitivo realizadas por terapeuta ocupacional); Psicoestimulação (Avaliações e atividades de cunho cognitivo realizadas por Psicóloga);Inclusão Digital (Informática para a terceira idade e jogos de psicoestimulação) e Palestras mensais com Profissionais escolhidos/convidados. Os resultados são obtidos através de avaliações que se dão em nível físico e cognitivo e são realizadas periodicamente no início e ao final de cada ciclo que tem a duração de seis meses. São aplicadas por todos os profissionais envolvidos e os resultados são publicados em periódicos da área e/ou apresentados em congressos e mostras científicas. Considerações finais.O projeto tem contribuído para a consolidação do eixo ensino/pesquisa/extensão, mas principalmente para diminuir o limiar de afastamento entre as gerações e promover uma proteção social básica de assistência através da força do próprio grupo o grupo estimulando o autoconhecimento, quanto à condição de vida e a relação com a família e a comunidade, favorecendo e promovendo o envelhecimento ativo, evitando o isolamento e asilamento da pessoa idosa a partir da interação entre os professores, alunos e idosos participantes.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1

SOUSA, Albert Alexandre Costa de *; GASSMANN,Hildenesa; SOUSA, Waltone Silva ; RAMOS, Allan Moura; COSTA, Iasmim Lima; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL,Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

QUAL SEU TIPO?

SOUSA, Djacir Carvalho de*; CAMARA, Francienolindoso; SOUSA, Danilo Coutinho de;
BARBETTA, Gabriel de Castro; MECKING, Laila Mendes; CAVALLARI, Carla Fernanda Barsalobres

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: barsalobres@gmail.com

As atividades de extensão são articulações entre a pesquisa e o ensino, possibilitando a real participação de discentes nos processos sociais. Em busca de uma ação cidadã, nos propusemos a confeccionar um painel sobre a dieta do sangue. Esta dieta explica que os tipos sanguíneos (A, B, AB ou O) tem forte influência no organismo. Eles determinam a eficiência do metabolismo, do sistema imunológico, o estado emocional e até mesmo a personalidade de cada indivíduo. Esta dieta também pode promover o bem-estar, diminuir o peso e fortalecer a saúde a partir de uma mudança dos hábitos alimentares. Sem comprovações científicas, essa dieta promove a qualidade de vida, desde que seguida por uma alimentação adequada e saudável e com a prática de exercícios físicos.

PROJETO DE TRAUMA DENTOALVEOLAR 1

SOUSA, Albert Alexandre Costa de *; GASSMANN, Hildenesa; SOUSA, Waltone Silva ; RAMOS, Allan Moura;
COSTA, Iasmim Lima; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: alisonjc7@gmail.com

O traumatismo dento-alveolar tem incidência significativa entre os traumas faciais, envolvendo dentes, osso alveolar e tecidos moles contíguos. São classificados de acordo com inúmeros fatores, e estruturas atingidas o dano e o tempo determinam o tratamento. Muitos autores afirmam que para cada tipo de trauma haveria uma forma idealizada de contenção dos elementos dentais, e o tempo que os dentes permanecem imóveis seria diretamente proporcional ao tempo de cicatrização das estruturas lesadas. O objetivo deste projeto de extensão é o atendimento aos pacientes traumatizados sendo o mesmo uma das referências dentro da cidade de São Luís MA, evitando assim aos pacientes percas dentarias, infecções e possíveis complicações ao estado geral de saúde. Os pacientes são encaminhados para o projeto e após exames clínico e radiográfico recebem o tratamento. O projeto se torna uma eficiente ferramenta de promoção de saúde a pacientes acometidos com essas desordens.

EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DE IDOSAS

SOUSA, Thiago Matheus da Silva*; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; CHAVES, Luiz Filipe Costa;
ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado de; GAMBASSI, Bruno Bavaresco

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: professorbrunobavaresco@gmail.com

O envelhecimento é um processo pelo qual todos os indivíduos passam, sendo caracterizado pela perda gradual das capacidades físicas. Devido a perda de força, as pessoas ficam com o dia a dia comprometido tendo como consequência uma piora na qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do treinamento resistido sobre a força de membros superiores e inferiores de mulheres. Participaram do estudo 18 mulheres com idade entre 65 e 70 anos. Reali-

zaram-se 16 sessões, duas vezes por semana, cujos exercícios propostos foram: mesa flexora, supino reto, leg press 45 graus e remada sentada, sendo a intensidade determinada pela zona de repetições máximas (10 RM), com 3 séries e 30 segundos de intervalo para descanso. Os exercícios foram ordenados, alternando os segmentos. Aplicou-se o teste de 10 repetições máximas no exercício supino reto e leg press 45 graus antes e após o programa de treinamento para avaliar a força muscular. Para análise estatística foi utilizado o teste t Student para amostras pareadas considerando -se o IC de 95 %. RESULTADOS: Foi observado que a diferença média dos níveis de força com a prática do exercício é significativa ($p < 0.0001$). Conclui-se que os exercícios resistidos provocaram melhora significativa na força de membros superiores e inferiores das mulheres da população investigada.

MESA CLÍNICA

CÁLCULO DE TUBETES: UM APLICATIVO ÚTIL PARA O PLANEJAMENTO ANESTÉSICO

ARAÚJO, Randerson de Sousa*; ARAÚJO, Mariana de Sousa; CASTRO, Bruno Rodrigo Amorim; RAMOS, Allan Moura; PESSOA, Thalita Fonseca; VIEIRA, Clarissa Lopes; COSTA, Cyrene Piazero Silva

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: randersonsa@hotmail.com

Com certeza um marco na história da Odontologia foi à descoberta de substâncias que promovem a perda da sensibilidade, mas, como a maioria dos medicamentos, os anestésicos locais podem desencadear uma reação de toxicidade, que acontece, em grande parte dos casos, pela administração extra vascular excessiva. O objetivo dessa mesa demonstrativa será demonstrar e disponibilizar um aplicativo que auxilia o cirurgião-dentista na realização do planejamento da quantidade de anestésico local, assim, diminuindo o risco de complicação pela sua administração.

CONFECÇÃO DE SOBREMESAS PARA DIABÉTICOS

DINIZ, Amanda Ferreira*; COSTA, Keully Mayara Nunes; CARDOSO, Nathaly Lima; BAYMA, Maria José Koblitz; Hortegal, Helane Viana

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

Email: amanda.slz@hotmail.com

Resumo: O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é uma das doenças crônicas com impacto na saúde pública no âmbito mundial. Implica na diminuição da qualidade de vida e sobrevida dos pacientes, contribuindo para o surgimento de outras doenças e redução da produtividade, com altos custos de tratamento. Este se baseia na prescrição dietética, atividade física e uso de medicamentos antidiabéticos e/ou insulina. A alimentação é reconhecida como um dos principais problemas quanto à adaptação às recomendações dietéticas e ao controle permanente de desejos, sensações e ansiedades. Assim, o diabético deverão adotar uma nova filosofia de comer reestruturando a sua rotina, sendo importante proporcionar a estes indivíduos um cardápio variado, possibilitando momentos prazerosos de convívio social propocionda pela alimentação. O objetivo deste trabalho foi buscar alternativas saudáveis e prazerosas ao cardápio de pacientes diabéticos para melhoria do convívio social e maior adesão ao tratamento dietético. Foram selecionadas 3 receitas consumidas pela população em geral, porém proibidas aos diabéticos por conter sacarose: Pavê de Morango, Creme de Limão e o Bolo de Chocolate, que foram adaptadas a este público, excluindo-se a sacarose e com modificação no tipo de gordura. Foi observado que a utilização do adoçante próprio para culinária e uso de alimentos desnatados não interferiu no sabor. Concluímos que as receitas propostas atendem tanto em relação ao paladar quanto a função, sendo assim uma possibilidade saudável para atender pacientes diabético.

BIOMASSA DE BANANA VERDE: PROPRIEDADES FUNCIONAIS E GASTRONÔMICAS

DUARTE, Rita de Cássia Lucena*; DIAS, Ana Paula dos Santos; LAGO, Rafaela de Almeida Soares; LIMA, Tatiane Alves; LIMA, Telma Suely dos Santos; MACIEL, Anna Terra Modesto Lima Pires; HORTEGAL, Elane Viana

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

Email: rcassia_13@hotmail.com

O conceito de alimento funcional tem variados alcances em diferentes países. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é definido como aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido, como parte da dieta habitual, produz efeitos benéficos à saúde. Considerado um alimento funcional de desempenho nutricional expressivo, a Biomassa de Banana Verde está cada vez mais presente à mesa dos consumidores que buscam alternativas mais saudáveis e mudança na forma de se alimentar. É vista como uma excelente opção, pois pode ser utilizado em substituição à farinha de trigo, como espessante e também como emulsificante, além de agir como um “fermento natural”. O objetivo deste estudo foi propor alternativas na preparação das principais refeições com o uso da biomassa de banana verde. As preparações foram feitas no Laboratório de Técnica Dietética e Tecnologia de Alimentos da Universidade CEUMA, como prática da disciplina Nutrição e Gastronomia. Foram produzidos três pratos: bolo de chocolate sem glúten e sem lactose, stroganoff funcional sem lactose e hambúrguer de carne. As receitas foram analisadas quanto ao nível de reprodução e grau de funcionalidade. Todas as receitas testadas apresentam ingredientes com características funcionais, com grau de reprodução moderado. Apresentam como limitação o fato de ainda terem custo elevado para a média geral da população, considerando o nível socioeconômico. O uso da biomassa é um meio alternativo de alimentação saudável, além de atribuir um olhar gastronômico às preparações.

AVALIAÇÕES SENSORIAIS – TESTE GUSTATIVO (SOLUÇÕES DE DIFERENTES SABORES SOBRE A LÍNGUA).

LEODIDO, Victor Machado*; GALDINO, Dhara Yanca Tiburtino; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; PEREIRA, Maria Carolina Barreto de Carvalho; CAMPOS, Lara Ferraz; DUAILIBE, Silvana; ***

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: victorleodido@live.com

Sensibilidade é a capacidade que o organismo tem em que se refere à consciência das condições externa ou internas do corpo. O sistema sensitivo é bastante complexo e precisa de todos os seus componentes para funcionar adequadamente, a não ser que aja interferência de situações adversas do meio. O sabor é um produto derivado do sistema sensitivo de informação do corpo, vindo da síntese de variados componentes participantes da via transmissora de informação (via sensitiva) que como resposta final tem o gosto de tudo o que é posto sobre o órgão receptor, a língua. A sensibilidade é um sistema de primordial importância para diversos fatores, desde o gosto doce do mel até uma resposta de defesa a uma lesão de queimadura.

AROMATERAPIA EM ODONTOLOGIA

MOURÃO, Thaianne Polanna de Carvalho*; SILVA, Maressa Keila de Souza; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: thianne15@hotmail.com

A Aromaterapia é uma arte Milenar, praticada desde a antiguidade através da queima da mirra ou do uso de perfumes. A utilização de fragrâncias ajuda a relaxar e equilibrar as emoções, visto que elas atuam no subconsciente do ser humano, proporcionando um equilíbrio entre o corpo e a mente, visando preservar a saúde através do bem estar físico, mental e emocional. Os aromas encontrados em incensos, velas, banhos e perfumes são derivados de dissoluções feitas dos óleos essenciais, os quais são extraídos das folhas, caule, flores e sementes. Como exemplos de aromas que beneficiam o atendimento odontológico, promovendo um relaxamento e uma sensação de bem estar no paciente, - benjoim: por causar a sensação de profundo bem-estar, - bergamota: por auxiliar no tratamento de herpes, - ylang-ylang: por ajudar a diminuir a sensação de medo, - patchouly e laranja: por controlarem a ansiedade, - camomila: por ser calmante e analgésico, - lavanda, limão e menta: por apresentarem efeito calmante, - cítrica: por ser relaxante, - Tea Tree é um tipo de essência indicada para pessoas que possuem aftas recorrentes e herpes labial O objetivo desse trabalho é apresentar uma mesa demonstrativa com os principais aromatizantes usados em odontologia. Os aromas utilizados para o tratamento de casos de stress, ansiedade e medo, sendo utilizados dentro de um consultório de atendimento odontológico através da aromatização ambiental a fim de proporcionar a tranquilização e o bem estar dos pacientes.

INSTRUMENTAIS UTILIZADOS EM CIRURGIA E TRUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL E FIXAÇÃO INTERNA RÍGIDA

SOUSA, Alison Cruz de*; SILVA, Natã Felício de Souza; SOUZA, Albert Alexandre Costa de;
RAMOS, Allan Moura; SEIXAS, Wagner; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: alisonjc7@gmail.com

A cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial vem se beneficiando com o desenvolvimento de materiais de fixação interna rígida, o que significou um grande avanço. O advento dos materiais com boas propriedades físicas e biocompatibilidade como as placas e parafusos de titânio utilizados no esqueleto craniomaxilofacial possibilitando técnicas cirúrgicas de maior previsibilidade de resultado estético funcional. O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma mesa demonstrativa com todo o arsenal de instrumentais utilizados pela cirurgia buco-maxilo-facial, bem como os materiais de fixação interna rígida, utilizados em muitos hospitais públicos e privados da cidade de São Luís do Maranhão.

PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL RETIDA POR IMPLANTES ZIGOMÁTICOS APÓS A RESSECÇÃO DO LÁBIO SUPERIOR E NARIZ

DE OLIVEIRA, Erika Priscilla Marinho*; GIRUNDI, Francisco Mauro da Silva; MONT'ALVERNE, Breno;
GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: erika-oliveira@hotmail.com

O câncer de lábio é mais freqüente no lábio inferior, sendo o carcinoma espinocelular o tipo histopatológico mais encontrado. A ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha, no entanto, os defeitos maxilofaciais podem encontrar-se presentes e exigem cuidados especiais na reabilitação. As próteses maxilofaciais retidas em implantes osseointegrados são uma solução utilizada para proporcionar a reabilitação estética e funcional aos pacientes. O presente estudo descreve o relato de uma paciente desdentada, diagnosticada com carcinoma espinocelular do lábio superior, que se apresentou para reabilitação maxilofacial após ressecção de grande quantidade de tecido do lábio superior e nariz, seguida por radioterapia. Após a cicatrização cirúrgica, quatro implantes zigomáticos foram instalados. No entanto, devido complicações no pós-operatório, o seio maxilar direito foi exposto ao ambiente oral e um implante nesta região foi perdido. As próteses intra-orais (prótese total maxilar e mandibular) e extra-oral (nasal) foram instaladas e fixadas sobre os outros três implantes zigomáticos. Após seis anos de acompanhamento, não houve recorrência, e a paciente não apresentou metástases. Os tecidos ao redor dos implantes apresentavam-se em boas condições de saúde, e as próteses permaneceram bem adaptadas. A reabilitação das deformidades maxilofaciais com a utilização de próteses retidas por implantes mostrou-se uma modalidade de tratamento eficiente, atingindo resultados estéticos e funcionais satisfatórios para a paciente.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NO DIAGNÓSTICO DE EXTENSO TUMOR ODONTOGÊNICO QUERATOCÍSTO: CASO CLÍNICO

JUNIOR, Paulo Henrique Pereira Santos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: ph_junior2009@hotmail.com

O tumor odontogênico queratocisto é uma lesão intraóssea benigna que deriva do remanescente da lâmina dentária. Requer considerações especiais devido ao seu comportamento clínico agressivo e recorrente. Desta forma, este trabalho mostra um relato de caso de um queratocisto localizado na mandíbula onde depois da marsupialização foram feitos exames de imagem trimestralmente para avaliarmos o grau de regressão da lesão onde 10 meses após o tratamento a lesão apresentava-se com tamanho reduzido.

RELATO DE CASO CLÍNICO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE

DEUS, Dalila Pego de*; COSTA, Rebeca Martins; DANDA, Tatiana F. Q.; TEIXEIRA, André

Curso: Medicina**Categoria:** Graduação**Email:** dalilapego@outlook.com

O carcinoma epidermoide ou espino-celular é uma neoplasia maligna que tem origem no epitélio de revestimento, com potencial de invasão dos tecidos, ocasionando a reabsorção dos tecidos ósseos subjacentes. Tem maior prevalência na cavidade oral e sua etiologia está relacionada com vários fatores, como hábitos pessoais deletérios, local de trabalho insalubre, dando ênfase ao uso de álcool e tabaco. Analisar aspectos clínicos, radiográficos e tomográficos do Carcinoma epidermoide. Paciente G. J. P., do gênero masculino, 33 anos de idade, fumante há 10 anos, melanoderma, compareceu à clínica de Estomatologia do Hospital Escola da Facimp da cidade de Imperatriz- MA, apresentando linfonodo submandibular alterado, com evidencia de edema e assimetria facial do lado esquerdo. No exame clínico intra-bucal, apresentava crescimento tecidual sintomático na região de rebordo alveolar da maxila do lado esquerdo associado à ulcerada de aproximadamente 1 cm de diâmetro com presença de exsudado purulento. O mesmo portava consigo uma radiografia panorâmica onde foi observada a destruição da cortical óssea sinusal e de todo o tecido ósseo da região posterior da maxila. Para melhor complementação visual da área foi solicitado uma tomografia computadorizada sendo em seguida realizada uma biópsia incisional com o fragmento encaminhado para o exame histopatológico. O laudo foi conclusivo para carcinoma epidermoide invasivo, e o paciente foi em seguida encaminhado para um centro de tratamento oncológico. É de grande relevância o conhecimento do cirurgião dentista quanto às manifestações clínicas e radiográficas do carcinoma epidermoide, para que se realize um diagnóstico precoce e o encaminhamento do mesmo para tratamento específico, com isso contribuindo para maior sobrevida do paciente.

EXÉRESE DE TÓRUS BILATERAL MANDIBULAR

SOUSA, Alison Cruz de*; SILVA, Natã Felício de Souza; GUARÁ, Tayanne Cristine Gomes; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia**Categoria:** Graduação**E-mail:** alisonjc7@gmail.com

Tórus, exostose óssea ou hiperostose é uma alteração de desenvolvimento relativamente comum onde ocorre crescimento ósseo protuberante e pode ser diagnosticado como palatino ou lingual. Sua etiologia é incerta, podendo ser associado a fatores genéticos, alterações funcionais e características raciais. É assintomática que, em geral, não causa danos ao paciente, todavia a sua remoção é freqüentemente indicada quando há problemas funcionais como: traumas frequentes, problemas fonéticos, mastigatórios e posicionamento anormal da língua, ou impossibilitar a adaptação de trabalhos protéticos. Essa alteração apresenta-se como osso compacto interposto por osso esponjoso semelhante a estrutura óssea de sua região. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência de exérese de Tórus bilateral mandibular de M C A, 52 anos que procurou a clínica integrada I para tratamento odontológico. Paciente segue em acompanhamento e apresenta-se em bom estado geral, sem sinais de infecção e com cicatrização dentro da normalidade expressada pela literatura.

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL NA PANCREATITE AGUDA

LIMA, Jessica Silva; MONTELES, Isabelle de Sousa; SILVA, Juliana Moreira da; NUNE, Leidiane Correa; BATISTA, Célia Regina de Freitas

Curso: Nutrição**Categoria:** Graduação**E-mail:** jessica155@hotmail.com

A pancreatite é definida como uma condição inflamatória do pâncreas podendo ser classificada como Pancreatite Aguda (PA) e pancreatite crônica. Por varias décadas, a nutrição parenteral foi a única modalidade empregada, visando nutrir e possibilitar o repouso glandular. Nos últimos anos, a nutrição enteral (NE) pós-pilórica tornou-se a forma preferencial de terapia nutricional na PA grave, ficando a nutrição parenteral reservada para os casos com contra-indicação ou impossibilidade de usar a via enteral. Paciente, D. C.O, sexo feminino, 31 anos, desempregada, deu entrada na unidade hospitalar dia 27.06.14 por apresentar dor abdominal intensa. Através de exames de imagem (TC com contraste de abdômen) e laboratorial (amilase e lipase) foi diagnosticada com pancreatite aguda. Suspeita de uso de anabolizantes injetável de origem veterinária. Paciente ficou em dieta zero por 7 dias quando foi reintroduzida dieta oral. Devido aos episódios de náuseas, vômitos e distensão e dor abdominal

foi prescrita NE jejunal por sonda posicionada após ângulo de Treitz no dia 20.07.14. A paciente evoluiu favoravelmente sendo introduzida dieta oral gradativamente, que fornecia juntamente com a NE 34kcal/kg e 1,3g de PTN/kg de peso, até a retirada da NE no dia 05.08.14 e posterior alta hospitalar. A terapia nutricional enteral mostrou-se um recurso terapêutico favorável na evolução da PA, reduzindo a incidência de complicações e permanência hospitalar.

RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES FRATURADOS UTILIZANDO RESINAS COMPOSTAS – RELATO DE CASO CLÍNICO

RIBEIRO; Marina Salomão Ricarte*; Dias; Laercio

Orientador: TAVAREZ; Rudys Rodolfo De Jesus

Co- Orientador: MALHEIROS; Adriana Santos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: marina.salomao25@hotmail.com

Fraturas de dentes anteriores são comuns em pacientes jovens, sendo que estas podem trazer consequências psicológicas, funcionais e estéticas. A restauração de dentes fraturados, principalmente no segmento anterior, deve ser planejada e executada com extremos cuidados, já que seu resultado pode comprometer a função, harmonia do sorriso e estética do paciente. Restaurações utilizando resinas compostas são uma das principais opções para a restauração destes casos. Com estes materiais é possível obter boa resistência e biocompatibilidade, assim como excelentes resultados estéticos. Por outro lado sua execução precisa de conhecimentos da anatomia dentária, do material e o desenvolvimento de habilidades técnicas. Além disto deve ser realizado um planejamento cuidadoso utilizando modelos de estudos com enceramento diagnóstico, de forma a reproduzir a forma prévia a realização da restauração. Igualmente a seleção do tipo de resina composta e o sistema adesivo permitem a obtenção da estética e a longevidade da restauração. Assim este trabalho propõe-se apresentar um caso clínico de dentes anteriores fraturados abordando os principais aspectos na sua execução.

RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES FRATURADOS UTILIZANDO RESINAS COMPOSTAS – RELATO DE CASO CLÍNICO

RIBEIRO; Marina Salomão Ricarte*; Dias; Laercio

Orientador: TAVAREZ; Rudys Rodolfo De Jesus

Co- Orientador: MALHEIROS; Adriana Santos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: marina.salomao25@hotmail.com

Fraturas de dentes anteriores são comuns em pacientes jovens, sendo que estas podem trazer consequências psicológicas, funcionais e estéticas. A restauração de dentes fraturados, principalmente no segmento anterior, deve ser planejada e executada com extremos cuidados, já que seu resultado pode comprometer a função, harmonia do sorriso e estética do paciente. Restaurações utilizando resinas compostas são uma das principais opções para a restauração destes casos. Com estes materiais é possível obter boa resistência e biocompatibilidade, assim como excelentes resultados estéticos. Por outro lado sua execução precisa de conhecimentos da anatomia dentária, do material e o desenvolvimento de habilidades técnicas. Além disto deve ser realizado um planejamento cuidadoso utilizando modelos de estudos com enceramento diagnóstico, de forma a reproduzir a forma prévia a realização da restauração. Igualmente a seleção do tipo de resina composta e o sistema adesivo permitem a obtenção da estética e a longevidade da restauração. Assim este trabalho propõe-se apresentar um caso clínico de dentes anteriores fraturados abordando os principais aspectos na sua execução.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

ALVES, Chirlene Lemos*; LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco

Orientador: RIZZI, Claudia

Co- Orientador: FALCÃO, Tassia

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: haddalyz@hotmail.com

O projeto de extensão “Atendimento de Urgências Endodônticas” é uma ação que visa prover assistência odontológica em situações de urgência endodôntica ao público que busca a Universidade Ceuma e, ainda, possibilita aos acadêmicos o aperfeiçoamento concomitante de práticas de diagnóstico e tratamento de pessoas acometidas por dor e desconforto de origem pulpar ou periapical. Teve início em Abril de 2014, onde alunos a partir do 7º período tratam dos casos de urgência sobre a supervisão dos professores Cláudia Rizzi, Tércia Falcão e Etevaldo Maia, participantes do projeto. Apesar de o projeto ser direcionado ao atendimento endodôntico, outros tipos de urgências odontológicas também são contempladas. Desde então já foram realizados mais de 100 atendimentos, sendo eles exodontias, drenagens de abscessos, tratamento de traumatismos dentais, entre outros. Tais procedimentos buscam retirar o paciente da situação de dor e encaminha-los para a continuação adequada do tratamento. Existe grande procura por parte dos alunos para participarem do projeto.

RESTAURAÇÕES CLASSE IV E REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVOS SUPERIORES TÉCNICA DO MOCK-UP: RELATO DE CASO CLÍNICO.

ALVES, Eliezer Gomes*; PINHEIRO, Daniel Aranha; DINIZ, Ana Carolina Soares; LAMHA, Ana Paula Soares Fernandes; MAIA, Mariana de Figueiredo Lopes e

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: eelyyy@gmail.com

O tratamento restaurador estético, seja com resinas compostas de uso direto ou até restaurações cerâmicas, é capaz de promover realinhamento de curvas estéticas, reparar inclinações axiais, minimizar discrepâncias de posição, cor, largura, comprimento e forma dos dentes. Além disso, pode alterar também a psique da pessoa, pela melhoria de sua autoestima. O objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico de um paciente de 45 anos de idade, gênero masculino, que compareceu a clínica integrada do Uniceuma relatando estar muito insatisfeito com a estética do seu sorriso. No exame intraoral, foram constatadas restaurações classe IV insatisfatórias nos dentes 12, 11, 21, 22. O paciente apresentava também diastemas acentuados entre os centrais e laterais e uma discreta distalização dos centrais. Apresenta-se a sequência clínica passo a passo, desde a moldagem para confecção do enceramento diagnóstico, a confecção do guia de silicone para auxiliar na execução dos procedimentos restauradores, através da técnica do mock-up. Esta ferramenta é de grande importância dentro da filosofia atual de excelência estética no tratamento restaurador direto, diminuindo o tempo clínico e dando previsibilidade ao trabalho. Confirma-se assim que, se bem planejada, esta técnica pode trazer um resultado estético imediato e bastante interessante, garantido a satisfação do paciente.

CÂNCER GÁSTRICO

LIMA, Jessica Silva*; MONTELES, Isabelle de Sousa; SILVA, Juliana Moreira dA; NUNES, Leidiane Correa; MORAIS, Marcelo Erison Almeida; BATISTA, Célia Regina de Freitas (FALTA CO-ORIENTADOR)

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: jessica155@hotmail.com

O câncer gástrico ainda é o quarto tipo de câncer mais comum e a segunda causa mais comum de morte por câncer no mundo. A perda de peso é frequente em pacientes oncológicos sendo que até 30% dos pacientes adultos apresentam perda superior a 10%. No caso apresentado paciente, D. A. S., 35 anos, sexo masculino, com histórico de gastrite por causa da bactéria *Helicobacter pylori*. Foi internado em agosto de 2014 apresentando abdômen distendido, vômitos, diarreia e síndrome consumptiva há mais menos 4 meses com perda ponderal de 21% em três meses (14 kg) sendo diagnosticado com câncer gástrico. Na primeira avaliação nutricional apresentou IMC de 19,1kg/m² e segundo % adequação Circunferência do Braço (61,3%), % adequação Prega Cutânea Tricipital (42%), ANSG (25 pontos), NRS (5 pontos), foi diagnosticado com desnutrição grave. Devido à estenose pilórica, foi solicitada uma sonda nasoenteral em posição pós-pilórica, que não foi possível devido a estenose gástrica. Foi realizada uma jejunostomia que também não foi bem sucedida devido à obstrução intestinal, e só assim foi prescrita terapia nutricional parenteral total ofertando 17,4 kcal/kg/d e 1,1 g/kg/d. **CONCLUSÃO:** Paciente continuou apresentando uma importante perda ponderal, de 10% em 20 dias, após a primeira avaliação, totalizando 31% em quatro meses, chegando a óbito. Isso se justifica pelo fato do câncer ser uma patologia altamente catabólica levando a depleção dos tecidos corporais e anorexia, importante causa de mortalidade.

AMELOBLASTOMA MULTICÍSTICO : RELATO DE CASO CLÍNICO

CUNHA, Lucas Daniel Lago Lopes*; MARINHO, Sarah Milhomem Barbos;
TEXEIRA, André Luiz de Sousa; DANDA, Tatiana Queiroz

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

O Ameloblastoma é um tumor de origem epitelial, benigno histologicamente e de origem odontogênica com capacidade de infiltração local. Representa cerca de 10% a 30% dos tumores de origem odontogênica, em 80% dos casos presente na mandíbula, é um tumor classificado de acordo com as suas características clínicas e radiográficas: Podendo ser multicístico também chamado de ameloblastoma sólido; Unicístico caracteriza-se pela presença do tumor dentro de uma cápsula cística; Periférico pouco incidente representando apenas 1% dos casos. O tratamento pode variar dependendo dos casos de leve, a conservador, até agressivo. Neste trabalho objetiva-se apresentar um caso clínico sobre ameloblastoma multicístico, dando ênfase no processo diagnóstico que compreende o exame físico, análise dos exames de imagens e técnicas de biópsias para confirmação histopatológica. Relato de caso: Paciente A.L.A.A de gênero feminino, idade 28 anos, leucoderma cognitivo e coerente, deambulante compareceu ao Hospital Escola da FACIMP, com queixa principal de dores na região de pré molar e molar esquerdo. Foi observado um edema na região de fundo de sulco, paciente foi submetido à biópsia incisional e diagnosticada após análise tecidual a presença do Ameloblastoma. Conclusão: Pode-se concluir então que o Ameloblastoma é uma condição patológica silenciosa e de evolução lenta com capacidade de infiltração local e com características histológicas Benignas.

USO DE ACESSO CADWELL- LUC PARA REMOÇÃO DE RAIZ RESIDUAL NO SEIO MAXILAR – RELATO DE CASO CLÍNICO

DE CERQUEIRA, Caroline Escórcio Alves*; ALEIXO, Vitor Hugo Almeida; TEXEIRA, André Luís de Sousa

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: caroline.escorcio@hotmail.com

Deslocamento de raiz dentarias fraturadas para seio maxilar em complicações de exodontias de dentes maxilares posteriores, são ocorrências comuns em pacientes que apresentam pneumatização dos seios maxilares. Normalmente diagnosticada com auxílio de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada, tem como características básicas o desenvolvimento de sinusite maxilar, variando os sintomas desde febre, cefaléia e presença de secreção nasal fétida, até ausência total de sinais e sintomas. O tratamento preconizado é a remoção da raiz via acesso de Caldwell- Luc, com prévia antibioticoterapia. Descrição de Caso Clínico: Paciente C. A. 31 anos, foi encaminhado para Hospital Escola da Faculdade de Imperatriz (FACIMP) após complicação na exodontia do elemento 15. Após exame clínico e radiográfico, paciente foi diagnosticado com deslocamento da raiz do elemento 15 para seio maxilar e tratado com antibioticoterapia prévia e remoção da raiz pelo acesso de Caldwell- Luc. Conclusão: Os acidentes em exodontia de dentes maxilares posteriores são relativamente comuns devido anatomia do assoalho do seio maxilar e a fragilidade das raízes sendo de grande importância o estudo continuado e uso de exames de imagens apurados.

AMELOBLASTOMA: ANÁLISE CLÍNICA, RADIOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA.

FERREIRA, Francisco Thales Martins*; SANTOS, Felipe Cavalcante; CAMPOS, Cassio Bernard Alves;
BASBOSA, Diego Paulo; MELO, Laize Arruda de; LAWALL, Melaine de Almeida; PEREIRA, Erika Martins

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação;

Email: f-thales@hotmail.com

O ameloblastoma é um tumor odontogênico frequente e apresenta-se clinicamente como um tumor assintomático na maioria dos casos na mandíbula com característica radiográfica multilocular e o tipo histológico mais frequente é o plexiforme. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o assunto, abordando as características clínicas, radiográficas e histopatológicas e associar a um caso clínico visando orientar os Cirurgiões-Dentistas no diagnóstico e estabelecimento do tratamento adequado. Relato do caso: Paciente JSN do sexo masculino de 73 anos apresentou-se no clínica de Semiologia da Universidade com a queixa de “aumento de volume na mandíbula”. Ao exame físico extra-bucal notou-se lesão de grandes proporções envolvendo a mandíbula, radiograficamente observou-se imagem radiolúcida multilocular envolvendo a região de mandíbula direita. Optou-se pela biópsia incisional da lesão. O diagnóstico histopatológico

foi de ameloblastoma plexiforme, de pose do resultado o paciente foi encaminhado para o cirurgião buco-maxilo-facial para tratamento adequado da lesão. Conclusões: Os ameloblastomas são tumores odontogênicos frequentes e muito agressivos, seu diagnóstico correto ocorre através da avaliação clínica, radiográfica e histopatológica, assim o tratamento pode ser instituído. O tratamento destas lesões são realizados de diversas maneiras variando da enucleação seguida de curetagem até a ressecção em bloco. O importante nestes casos é o diagnóstico correto para que o tratamento adequado seja realizado.

PRESENÇA DE DENTE SUPRANUMÉRARIO RETIDO NO SEIO MAXILAR – RELATO DE CASO CLÍNICO

PINHEIRO, Thairinny Barbosa Alencar*;BRITO, Anna Cecy Ribeiro;
JÚNIOR, Francisco José Rodrigues da Rocha; CORREA, Ítalo Márcio Barros; CORREA, Silvan

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: thairinnyalencar@gmail.com

A presença de dentes supranumerários ectopicamente retidos dentro do seio maxilar é um evento raro e pode acontecer devido a incompatibilidade entre o espaço existente e o tamanho do elemento em questão. Relata-se neste estudo, o caso clínico de um paciente de 24 anos, do sexo masculino e melanoderma que compareceu a Clínica de Odontologia da Universidade Ceuma, disciplina de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial para remoção de um elemento supranumerário localizado parcialmente em seio maxilar para a posterior realização de tratamento ortodôntico. A retirada do elemento foi realizada através da técnica de Caldwell-Luc, elemento localizado na região dos elementos 15 e 16, remoção e síntese com sutura oclusiva. No pós-operatório o paciente recebeu corretas orientações quanto aos cuidados e prescrições medicamentosas e apresentou rápida recuperação.

MIMETIZAÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL FIXA EM CASO DE FLUROSE DENTÁRIA .

SANTOS, Fernanda Melo dos*; PIMENTEL, Marcele Jardim; ARÉLLGA, Juan Pablo;
MONT'ALVERNE, Breno; GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: fernanda_melo05@hotmail.com

O sucesso estético em prótese dentária seja em reabilitações extensas ou unitárias, se baseia na mimetização da peça protética. A não percepção da substituição da estrutura dentária perdida é o objetivo atual na Odontologia Restauradora. A presença de manchas ou características específicas torna essa camuflagem mais difícil e, a necessidade de esconder a prótese torna-se um desafio. Este caso clínico relata a confecção de uma prótese fixa de três elementos mimetizada, em paciente diagnosticado com fluorose intensa e generalizada. Inicialmente, fotografias em alta resolução com detalhes das manchas foram enviadas ao laboratório. As manchas foram registradas em fotografias com escalas de cores em variadas intensidades, facilitando a transmissão da informação entre o protesista e o laboratório. Assim, foi confeccionada uma prótese metalocerâmica através da técnica de estratificação, com aplicação de opaco esbranquiçado do terço médio ao incisal, em forma de ranhuras irregulares. Para tornar o terço incisal mais claro, uma camada espessa foi confeccionada, obtendo efeito de transparência nessa região. Foram realizadas duas provas estéticas da peça protética antes da cimentação. A cada prova, novas fotografias eram feitas e encaminhadas ao laboratório. Após a aplicação do glaze, foi observada manutenção do matiz, valor e croma obtidos durante a confecção da peça. A paciente apresentou-se satisfeita com o resultado estético final. Pode-se concluir que a caracterização das manchas se mostrou um método importante a ser considerado na reabilitação bucal, tornando o sorriso mais harmonioso.

REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TÓRUS PALATINO: RELATO DE CASO CLINICO

CAMPELO, Ricardo Gabriel Calvet*; VIEIRA, Jefferson Moura; DUAILIBE, Lara Ribeiro Feitosa;
NARAZAKI, Norton Ryuji; SOUSA, Waltonne Silva; DE DEUS, Ciro Borges Duailibe.

Curso: Odontologia

*Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Email: ricardo_cal_vet@hotmail.com

O tórus palatino pode ser definido como um crescimento ósseo ou exostose, de natureza benigna, como uma proeminência sólida na região da sutura intermaxilar, com predileção para o gênero feminino e início de desenvolvimento após a puberdade. Apesar de não ser classificado como uma alteração patológica, assim que diagnosticado este necessita de atenção e cautela

quanto à necessidade de tratamento. A remoção cirúrgica é necessária quando está presente: instabilidade de prótese total, dicção dificultada, mastigação ou deglutição incorreta, histórico de traumas recorrentes e no posicionamento inadequado da língua. Paciente R.C.C., 48 anos de idade, gênero feminino, leucoderma, encaminhada ao ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital de Base de Bauru/SP após avaliação por um clínico geral. Queixa principal: “uma bola de osso no céu da boca”. Durante anamnese a paciente negou sintomatologia dolorosa. Ao exame clínico pôde ser constatado que a paciente possuía aumento volumétrico de aproximadamente 30mm em seu sentido ântero-posterior na região de linha média de palato duro, o que comprometia a fonação correta. Foi realizada anestesia dos nervos palatinos maiores, nasopalatino e infiltrações locais para fins hemostáticos. Optou-se pela incisão em duplo Y seguida de osteotomias através de instrumento rotatório em baixa rotação sob irrigação copiosa com soro fisiológico para delimitação e segmentação do tecido a ser clivado e removido de forma segura através de cinzel e martelo. Após diagnóstico e eliminação da possibilidade de neoplasia, o tórus palatino deverá ser removido cirurgicamente por causar desconforto e perturbação funcional da língua.

TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR NA DENTIÇÃO DECÍDUA: RELATO DE CASO CLÍNICO

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro*; FILHO, Etevaldo Matos Maia;
LEAL, Adriana Mara Araújo Leal; RIZZI, Cláudia De Castro.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: delanelopes@hotmail.com

O trauma dentoalveolar tem uma incidência significativa entre os traumas de face e podem acometer uma ou várias estruturas dentoalveolares. Devem ser consideradas como um caso de emergência e ser tratadas imediatamente, para evitar a dor e melhorar o prognóstico. A luxação lateral é um traumatismo que exige atendimento de urgência, devido ao fato de que ocorre o deslocamento lateral do dente, com rompimento do ligamento periodontal e do feixe vasculonervoso, podendo ser acompanhando por fratura ou esmagamento das paredes do alvéolo. Ocorre com certa frequência em crianças, acometendo principalmente os incisivos centrais superiores. Esse tipo de trauma requer uma abordagem ainda mais cuidadosa e diferente da utilizada na dentição permanente, devido à proximidade do ápice do dente decíduo com o germe do dente permanente sucessor. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de um paciente infantil que compareceu à clínica de Odontopediatria da Universidade Ceuma com um trauma dentoalveolar do tipo luxação lateral e demonstrar a importância do manejo clínico correto, especificamente nestes casos.

USO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) COMO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA

PIRES, Davidson Rodrigues*; ANDRADE, Camila Lima; MONT'ALVERNE, Breno; MACHADO, Leticia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Modalidade: tema livre

E-mail: davidsonpires.cd@gmail.com

O objetivo do tratamento estético na Odontologia deve ser o de criar um design que se integre com as necessidades funcionais, estéticas e emocionais do paciente. Por esse motivo, a equipe de profissionais envolvidos deve munir-se de todas as ferramentas possíveis para melhorar a visualização dos problemas estéticos, criar possíveis soluções, apresentar estas soluções de forma eficaz para o paciente e guiar com precisão os procedimentos clínicos e laboratoriais para atingir resultados previsíveis. O objetivo deste trabalho será de demonstrar o uso da ferramenta “Digital Smile Design (DSD)” para aprimorar e facilitar o trabalho em equipe e a comunicação com o paciente, através do relato de um caso clínico. Paciente do sexo masculino apresentou-se com agenesia de incisivos laterais. Foi realizado o registro fotográfico do perfil facial, bem como fotos intra-orais para planejamento no software Keynote. Através deste software, foi realizado o planejamento digital (DSD) da estética dentogengival, o qual permitiu a transferência de medidas reais para o computador. Também foi planejada a forma dos dentes de acordo com a técnica do visagismo. O planejamento digital foi discutido com o protético, guiando a confecção do enceramento de diagnóstico. Após, foi realizado o mock-up com resina bisacrílica para posterior aprovação do planejamento por parte do paciente. Através deste caso clínico, foi possível concluir que o DSD é uma ferramenta que pode auxiliar o tratamento restaurador, melhorando o entendimento dos problemas estéticos e aumentando a aceitação do tratamento pelo paciente. Além disso, auxilia na comunicação entre dentista-protético, garantindo resultados satisfatórios e previsíveis.

USO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) COMO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA

PIRES, Davidson Rodrigues*; ANDRADE, Camila L.; FERREIRA, João T.; MONT'ALVERNE, Breno; GONÇALVES, Leticia M.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Modalidade: tema livre

E-mail: davidsonpires.cd@gmail.com

O objetivo do tratamento estético na Odontologia deve ser o de criar um design que se integre com as necessidades funcionais, estéticas e emocionais do paciente. Por esse motivo, a equipe de profissionais envolvidos deve munir-se de todas as ferramentas possíveis para melhorar a visualização dos problemas estéticos, criar possíveis soluções, apresentar estas soluções de forma eficaz para o paciente e guiar com precisão os procedimentos clínicos e laboratoriais para atingir resultados previsíveis. O objetivo deste trabalho será de demonstrar o uso da ferramenta "Digital Smile Design (DSD)" para aprimorar e facilitar o trabalho em equipe e a comunicação com o paciente, através do relato de um caso clínico. Paciente do sexo masculino apresentou-se com agenesia de incisivos laterais. Foi realizado o registro fotográfico do perfil facial, bem como fotos intra-orais para planejamento no software Keynote. Através deste software, foi realizado o planejamento digital (DSD) da estética dentogengival, o qual permitiu a transferência de medidas reais para o computador. Também foi planejada a forma dos dentes de acordo com a técnica do visagismo. O planejamento digital foi discutido com o protético, guiando a confecção do enceramento de diagnóstico. Após, foi realizado o mock-up com resina bisacrílica para posterior aprovação do planejamento por parte do paciente. Através deste caso clínico, foi possível concluir que o DSD é uma ferramenta que pode auxiliar o tratamento restaurador, melhorando o entendimento dos problemas estéticos e aumentando a aceitação do tratamento pelo paciente. Além disso, auxilia na comunicação entre dentista-protético, garantindo resultados satisfatórios e previsíveis.

FATORES QUE INTERFEREM NO SUCESSO DA OSTEINTEGRAÇÃO

SOARES, Felipe Simões*; FILHO, José Reinaldo Pereira Reis;

MALHEIROS, Adriana Santos; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Modalidade: tema livre

E-mail: felipe_simoes17@hotmail.com

Atualmente a implantodontia é citada como o ápice na modernidade quando a questão discutida é reabilitação oral. Antes do uso dos implantes, a reabilitação oral era realizada por próteses convencionais, do tipo removível, fixa ou total.

Para que o tratamento se desenvolva adequadamente é necessário que o implante se osseointegre no tecido ósseo receptor, já que a integração óssea é a chave do sucesso clínico cirúrgico que, posteriormente, será completado após o término da fase protética. Porém, muitos são os fatores a serem considerados nas fases pré-cirúrgica, trans-cirúrgica e pós-cirúrgica, para que o fenômeno da osseointegração ocorra de maneira satisfatória.

Para isso, é importante que o profissional tenha o controle das etapas do tratamento, executando um correto protocolo durante todas essas fases. Seja qual for a fase do tratamento, cada uma possui seu valor individual, por isso deve ser feita uma somatória desses fatores para que se estabeleça a melhor forma de planejar, executar ou finalizar a colocação do implante.

Além disso, alguns aspectos psicológicos devem ser considerados como: ausência de dor, desconforto, inflamação e satisfação pessoal. O implante deve restabelecer a capacidade mastigatória e fisiológica dos tecidos moles e duros adjacentes, trazendo conforto e autoestima para o paciente. Somente assim, a reabilitação poderá ser considerada como um sucesso. O presente trabalho tem por objetivo discutir os fatores importantes que influenciam na taxa de sucesso da osseointegração e apresentar um caso clínico onde fatores do trans-cirúrgico podem ser observados.

ANSIEDADE: RELATO DE UMA INTERVENÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL

VIANA, Isaac Pereira; DE MATOS, Daniel Carvalho;

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Modalidade: tema livre

Reações emocionais identificadas pelas pessoas como ansiedade representam um tipo de subproduto indesejado de contingências coercitivas sobretudo sociais. O presente trabalho foca no cliente cuja queixa era ansiedade. O cliente argumentava que se sentia ansioso por causa de seu emprego na área de saúde mental: não queria continuar com o emprego, mas alegava não poder abandonar por depender dele financeiramente. O cliente ainda descreveu que sofria com reações como tique nervoso, espasmos, angústia, confusão, desesperança, etc. O objetivo do trabalho foi o de auxiliar o cliente no controle de resposta as de ansiedade e estabelecimento de repertório para enfrentamento de eventos aversivos responsáveis por ansiedade. Ao decorrer das sessões psicoterápicas (total de seis), com as devidas intervenções clínicas, o cliente sinalizava verbalmente ao terapeuta que tanto estava traçando metas profissionais de curto, médio e longo prazo como também estava dando passos concretos em direção a elas. Por exemplo, em curto prazo, decidiu não abandonar o emprego atual e sim aprender a lidar com ele. Em médio/longo prazo decidiu atuar, também, na área clínica (O terapeuta reforçou relatos sobre essas metas em sessão, mas os atendimentos foram descontinuados em função do encerramento do semestre letivo na clínica escola da Universidade em que os atendimentos aconteciam). Na medida em que o cliente aprendeu a definir operacionalmente tudo o que deveria fazer para cumprir com suas metas estabelecidas, a natureza da queixa foi sendo modificada e o cliente sinalizou verbalmente ao terapeuta significativa redução das reações de ansiedade.

INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?

PEREIRA, Eugênia Aires*; LIRA, Marcela de Araújo; FERREIRA, Patricia Rodrigues;
SILVA, Joice Penha; NASCIMENTO, Leia Ribeiro

Orientador: DIAS, Rosane da Silva

Co-Orientador: CARVALHO, Laíse Neves

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: eugeniaapereira@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar as informações sobre comportamento de risco para saúde entre graduandos de saúde uma universidade privada de São Luís. A adoção de comportamentos de risco à saúde como inatividade física, fumo, dieta inadequada e abuso de bebidas alcoólicas é responsável por uma parcela significativa de mortes prematuras, sendo o conhecimento a melhor forma de prevenção. Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, realizado no período entre abril e agosto de 2013 na Universidade Ceuma. Foram incluídos no estudo 354 discentes da área de saúde de ambos os sexos, com idade entre 18 e 28 anos, regularmente matriculados em períodos com disciplinas teóricas. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para o Brasil. Na comparação do conhecimentos dos alunos dos diversos cursos foi utilizado o teste Qui-Quadrado interpretado ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA com parecer 372.391. Os alunos que mais relataram informações sobre comportamento de risco para saúde foram os de medicina ($p < 0,01$), perdendo apenas para enfermagem no que alude a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (79,2%) e a gravidez (66,7%), para o curso de nutrição no que se refere a dados dietéticos e nutricionais (71,9%) e para o curso de educação física nas informações sobre atividade física (78,6%). Existem deficiências relacionadas aos conhecimentos sobre comportamento de risco entre os diferentes cursos de saúde.

AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.

LIMA, Alysson Kenedy Sales*; SAUAIA, Bismarck Ascar; VIANA, Alef Salgado;

LIMA, Antônio Almir Junior; NASCIMENTO, Eline Lima do

Orientador: SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Co-Orientador: ALVES, Cândida Helena Lopes

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: alyssonkenedysaleslima@gmail.com

Envelhecimento implica alterações físicas e mentais que podem remeter para uma incapacidade em realizar tarefas básicas potencializando o risco de cair. A atividade física parece minimizar este quadro promovendo ajustes posturais em situações de desequilíbrio e prevenindo quedas. Estudos indicam a realização de exercício envolvendo tarefas físico/cognitivas simultaneamente para potencializar este efeito. Objetivou-se analisar o desempenho do protocolo de dupla tarefa no risco de queda em idosos. O estudo decorreu em São Luís-Ma, em 2014, amostra constituída por 40 idosos, 70 a 75 anos. Na coleta de dados utilizou-se o teste de Tinetti, versão adaptada ao Brasil, que avalia a mobilidade e equilíbrio em idosos correlacio-

nando-os ao risco de cair. O teste foi aplicado antes e após a intervenção de um protocolo cinesioterapeutico de dupla tarefa que durou três meses, duas vezes por semana 50 minutos/dia. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva da capacidade atencional empregou-se media e desvio padrão e teste de contingencia, sendo significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se o risco de cair em idosos, para antes da intervenção para médio risco ($n=28$; 70%) e, para depois da intervenção, baixo risco ($n=39$; 97,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se maior desvio padrão para antes (22,23) relativamente à depois (13,65), indicando maior dispersão de valores antes da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência sendo significativo $p < 0,0001$. Os resultados indicam uma relação altamente significante entre a aplicação do protocolo e a redução do risco de queda.

INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.

AMORIM, Adalberto Paulo Varella*; COSTA, Jocilene de Lima; RIZZI, Cláudia do Castro; TEXEIRA, Larissa Barbosa; CÂMARA, Vanda Silva

Orientador: LEAL, Adriana

Co-Orientador: GASPAR, Tânia

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: adalbertopaulofilho@hotmail.com

Sabe-se que a adequada esterilização do instrumental de trabalho é uma condição essencial para que seja mantida a cadeia asséptica e se atinja o sucesso da terapia endodôntica. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência dos diferentes métodos de limpeza na efetividade do processo de esterilização de limas endodônticas. Para o estudo, foram coletadas 50 limas endodônticas, que foram distribuídas em cinco grupos: G1 – limas novas sem processo de esterilização; G2 – utilizadas previamente e autoclavadas; G3 – utilizadas previamente e realizada a limpeza com água e sabão, secas, embaladas e autoclavadas; G4 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, secas, embaladas e autoclavadas; G5 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, lavadas, secas, embaladas e autoclavadas. Para a análise microbiológica, as limas foram inseridas, individualmente, em tubos de ensaio, contendo meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI) e levadas à estufa bacteriológica a 37°C onde permaneceu por 48 horas sendo a leitura feita em 72 horas. Resultados: Após o período de incubação as limas submetidas ao processo de esterilização independente do método de limpeza utilizado não apresentaram crescimento microbiano, no entanto, observou-se crescimento microbiano em 10% das amostras do G1 e 20% do G2. Conclusão: Pode-se concluir que as limas que não passaram pelo processo de limpeza prévia apresentaram contaminação microbiológica mesmo após a esterilização por calor úmido.

PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA

NASCIMENTO, Thanieri Dos Santos*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; DIAS, Rosane da Silva; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: thannyere_nascimento@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de asma em um grupo de escolares da rede pública de ensino. Asma é uma doença inflamatória crônica associada à hiperresponsividade das vias aéreas. Estima-se que atualmente existam 300 milhões de pessoas com esta doença no mundo. Embora essa patologia possa ocorrer em qualquer fase da vida, é mais comum que os primeiros sintomas apareçam na infância. Foi realizado estudo transversal no período de agosto e setembro de 2013 em uma escola da rede pública de ensino de São Luis – MA. Foram incluídos no estudo 78 alunos, de ambos os gêneros. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Na análise bivariada, foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo estabelecido nível de significância de 5%. A prevalência de asma na amostra estudada foi de 42,3%, sendo que entre 9 a 11 anos, 24 (72,7%) escolares apresentaram asma e entre 12 e 14 anos, apenas 9 (27,3) tiveram. A mediana do pico de fluxo dos indivíduos com asma foi de 410 (260-590) L/min. Não foi verificada associação estatisticamente significativa entre aspectos sociodemográficos e asma. Este estudo evidenciou que escolares de uma rede pública de ensino mostram uma alta prevalência de asma, dessa forma medidas educativas devem ser instituídas para minimizar o impacto dessa doença nessa população.

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

SCHERR, Jéssica Torres*; CALISTO, Mariana Martins; SANTANA, Renata Karissa Pessoa;
VIEIRA, Kelly Luana Rodrigues; CARVALHO, Laíse Neves; SILVA, Aniely Aranha

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: kluanavieira@hotmail.com

Esse trabalho tem como objetivo verificar a influência da idade e escolaridade materna sobre o planejamento familiar. Segundo o Ministério da Saúde vários aspectos sociodemográficos, como idade, escolaridade, estado civil e ocupação influenciam no planejamento familiar. Estudos descrevem que as famílias mais numerosas pertencem a mães mais jovens e analfabetas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, do tipo corte transversal, realizado com 48 gestantes. O estudo foi realizado em quatro unidades básicas de saúde: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, no período entre setembro de 2013 a março de 2014. Para coleta de dados foi utilizado um questionário formulado por preceptores do PET-saúde Redes da Universidade Ceuma, sendo sua aplicação realizada por alunos voluntários e bolsistas do programa. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Uniceuma com número de parecer 743094. Apenas 35,4% (17) das mulheres planejaram a gestação. Entre estas, 17,6% (3) tem abaixo de 18 anos, 41,2% (7) entre 18 e 28 anos e 41,2% (7) acima de 28 anos. A maioria 52,9% (9) são casadas e 41,25% (7) são analfabetas, porém, 17,6% (3) cursaram até 8ª série do ensino fundamental, 11,8% (2) o ensino médio incompleto e 23,5% (4) ensino médio completo. Embora a adolescência interfira negativamente no planejamento familiar, isso não foi verificado. Com relação ao nível de escolaridade, esse aspecto influenciou no planejamento familiar da amostra estudada.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UTILIZAÇÃO DA ASG 7 ESCALAS

SOUSA, Jaïcara Melo De Araújo*; BACELAR, Jerciane Dos Santos Costa; DA SILVA, Rayara Cristinna Viana;
MACHADO, Keliny Kelem Costa; MESQUITA, Patricia De Souza ROCHA, Marina Souza; HORTEGAL, Elane Viana

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: jaicaramelo@hotmail.com

A DRC é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais com impacto no estado nutricional dos pacientes. A avaliação nutricional subjetiva é um método capaz de avaliar o estado nutricional e considera não apenas alterações da composição corporal, mas também alterações funcionais dos pacientes. A avaliação subjetiva global (ASG) 7 escalas é um método adaptado aos pacientes renais crônicos, capaz de detectar um maior número de pacientes com desnutrição, podendo ser utilizada para intervenção precoce. Avaliar de forma correta o estado nutricional destes é de fundamental importância, pois a desnutrição energética-proteica (DEP) na hemodiálise é um fator de risco para mortalidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional utilizando a ASG 7 escalas em pacientes em tratamento hemodialítico de uma clínica particular de São Luis, Maranhão. Foram entrevistados 27 pacientes com idade de 26 a 92 anos. Além da ASG 7 escalas, foi realizada avaliação antropométrica após a sessão de diálise onde incluía o peso seco em quilogramas e a altura em centímetros para calcular o índice de massa corporal (IMC), classificado de acordo com o preconizado pela OMS. Observou-se que 59,2% apresentaram eutrofia, 33,33% sobrepeso e apenas 7,4% desnutrição pelo IMC. Quando o estado nutricional foi avaliado pela ASG 7 escalas, constatou-se que mais 60% dos indivíduos apresentou algum grau de desnutrição. Desta forma, a ASG parece ser um método que detecta melhor a desnutrição nestes pacientes.

EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS

ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima*; DE SOUZA, Marina Batista; RIBEIRO, Wallyson Martins; SOARES, Julia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: liviaguedesandrade@gmail.com

A música está presente na vida do homem desde seu nascimento. É, por exemplo, pela via das canções de ninar que o sujeito humano faz sua entrada na cultura. Stern e Trevarthen são autores que apresentam estudos da presença da ritmicidade desde as primeiras interações mãe-bebê, contribuindo os estudos que confirmam a importância dos ritmos para a estruturação psíquica do sujeito. O Projeto intenciona verificar o potencial do ritmo e da música no desenvolvimento das crianças com ou sem entraves no processo de constituição psíquica, no que tange sua relação com o outro e sua entrada

no mundo simbólico. O objetivo é avaliar os efeitos de um atelier musical como intervenção terapêutica em crianças com desenvolvimento típico e atípico, averiguando a percepção dos afetos, o desenvolvimento da linguagem e a potencialidade de enlaçamento com o outro. A importância do presente estudo justifica-se principalmente pelo fato de haverem poucos estudos no Brasil que abordem este tipo de intervenção na perspectiva apresentada, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade da assistência a crianças com TID, especialmente nos serviços da rede pública de saúde, uma vez que não exige grandes recursos materiais e pode ser facilmente executada pelos profissionais especialistas. O projeto será desenvolvido com crianças de desenvolvimento típico e atípico, de 2 a 4 anos, em um ateliê Mix Musical, que funciona semanalmente no CIAMM – instituição sediada em São Luís desde 2004. Após os encontros, será analisado o desempenho individual das crianças participantes com relatórios transcritos e supervisionado pelas coordenadoras do projeto.

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS INICIANTE DO ESTÁGIO DE AUDIOLOGIA SOBRE BIOSSEGURANÇA

SILVA, Marla Valéria Soares da*; CASTRO, Samyra Araújo; CESAR, Karla Cristinni Quadros; SILVA, Raquel Fernandes da; CALDAS, Érica Alesandra Caldas

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: marcocarneiro.adv@hotmail.com

A biossegurança é definida como um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos do meio ambiente para os profissionais e clientes. Verificar o grau de conhecimento de estudantes iniciando o estágio da graduação em Fonoaudiologia sobre biossegurança em Audiologia. Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva observacional quantitativa, através de um questionário respondido pelos alunos de graduação de Fonoaudiologia.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS DE SÃO LUÍS – MA

MENDONÇA, Ana Carolina Sá*; MEDEIROS, Ádila Lorena Silva; MENDES, Pauliana Conceição; NASCIMENTO, Leila Ribeiro do; SILVA, Joice Penha; CARVALHO, Laíse Neves; FERREIRA, Patricia Rodrigues

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: carol.smendonca@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi descrever o perfil profissional dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam nas unidades de terapia intensiva neonatal de São Luís – MA. A assistência prestada ao recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é complexa e exige tecnologias e estrutura adequada. Porém, para que efetivamente esta assistência seja de qualidade, torna-se mister recursos humanos altamente capacitados. Foi realizado estudo descritivo, observacional do tipo corte transversal, de agosto de 2013 a janeiro de 2014 no Complexo Hospitalar Materno Infantil Dr. Juvêncio Mattos e Hospital e Maternidade Marly Sarney com 63 profissionais entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A coleta de dados foi realizada por alunos de graduação que foram previamente treinados, sendo o instrumento um questionário modificado baseado no modelo de Nápolis (2006). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma com número do parecer 137.504. Dentre os entrevistados, 36,5% (23) eram médicos, 33,3% (21) fisioterapeutas e 30,2% (19) enfermeiros. A maioria (73%) dos profissionais são mulheres. A mediana do tempo de formado foi de 6 (0;28) anos. Apenas 36,5% (23) tem especialização em neonatologia e 28,6% (18) relatam não ter nenhuma especialização. Com relação a título de intensivista, 65,1% (41) afirmam não possuir. A UTIN é um espaço que devido a complexidade, exige profissionais de grande aporte de conhecimento, entretanto, no presente estudo observa-se precariedade com relação a qualificação do profissional.

ÍNDICE DE CONICIDADE ASSOCIADO À PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS DE UM AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA

MORAES, Florinda Maria De Freitas*; BARBOSA, José Bonifácio; FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento; FERREIRA, Ilana Carla Dos Anjos ;SILVA, Juliana Moreira Da; SANTOS, Alexsandro Ferreira Dos

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: florindaaflor@hotmail.com

Avaliar a associação do índice de conicidade (IC) com os níveis de pressão arterial (PA) de pacientes idosos atendidos em ambulatório cardiológico.

Estudo transversal, realizado em um ambulatório cardiológico de São Luís—MA com pacientes de 60 a 94 anos, de ambos os gêneros e todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram adotados os pontos de corte para o IC de 1,25 e 1,18 para homens e mulheres, respectivamente. Foi definido como hipertenso o indivíduo que apresentou PA sistólica (PAS) >140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) >90 mmHg. Para a associação das variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher e para correlação, o coeficiente de correlação de Pearson ($p < 0,05$). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, protocolo nº 33104- 0241/2007. Foram avaliados 116 pacientes com média de idade de $68,7 \pm 7,34$ anos. Notou-se excesso de peso em 41,86% dos homens e 54,74% das mulheres segundo o IMC. Não foi observada associação significativa entre o IC e a PAS e PAD ($p= 0,138$). Quanto à correlação o IC apresentou correlação positiva com a PAS e PAD, com significância estatística apenas entre o IC e PAD na população masculina ($p=0,009$). Na correlação das medidas de PAS e PAD com o IC, observou-se que quanto maior o IC maior a PAS e PAD. No entanto, o valor com maior significância estatística foi referente à PAD na população masculina idosa. Logo, mais estudos precisam ser realizados para maior acurácia dos dados

COMPARAÇÃO ENTRE ASG E NRS-2002 NA TRIAGEM NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO

FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento*; MORAES, Florinda Maria De Freitas; SILVA, Juliana Moreira Da; BATISTA, Célia Regina De Freitas

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: suzanne.carolyne@hotmail.com

Comparar a Avaliação Subjetiva Global (ASG) com a Nutritional Risk Screening (NRS-2002) na avaliação do estado nutricional de pacientes internados em uma clínica médica de um hospital público de São Luís —MA.

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, composto por pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 19 anos, atendidos no setor de clínica médica de um hospital público de São Luís -MA. A triagem nutricional foi avaliada por meio da ASG e NRS 2002. Utilizou-se o teste exato de Fisher para avaliar a associação entre os dois métodos. A concordância entre os métodos foi medida através do índice kappa, considerando-se: fracos os valores menores que 0,20; regular entre 0,21 a 0,40; moderada de 0,41 a 0,60; boa de 0,61 a 0,80; muito boa de 0,81 a 0,99. Adotou-se o nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Foram incluídos 27 pacientes, sendo 59,26% ($n= 16$) do sexo masculino, a média de idade foi de $60,96 \pm 22,42$. Com relação ao estado nutricional, 48,15% ($n=13$) dos pacientes foram diagnosticados com desnutrição segundo a ASG enquanto a NRS 2002 identificou 74,04% ($n= 20$) em risco nutricional. Observou-se uma associação significativa ($p=0,006$) e uma concordância moderada entre os métodos de triagem avaliados ($k=0,49$; $p= 0,003$). Diante dos resultados apresentados houve uma associação significativa e concordância moderada entre a ASG e NRS 2002, provavelmente por serem métodos com característica semelhantes. Dessa forma, sugere-se que ambos possam ser utilizados na identificação do estado nutricional de indivíduos hospitalizados.

IMPACTO DO TRAUMATISMO DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES E DE SUAS FAMÍLIAS

SERRA, Tallita Ferreira Moraes*; BRITO, Marcelle Luanna Oliveira; FERREIRA, Meire Coelho Ferreira,

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: tallitavip@hotmail.com

Na atualidade, o traumatismo dental tem se tornado um dos maiores problemas de saúde bucal pública (Malikaew et al., 2005). O acometimento de crianças pré-escolares pode levar a um impacto na qualidade de vida (Kramer et al., 2013). O objetivo do estudo foi avaliar o impacto do traumatismo dental na qualidade de vida de crianças pré-escolares e de suas famílias. A amostra do estudo foi composta por 39 crianças de 2 a 5 anos de idade, matriculadas em creches/pré-escolas públicas e privadas São Luís/MA. As crianças foram avaliadas para traumatismo dental (Andreasen et al., (2007). Um questionário sócio demográfico e o Brazilian Oral Health Impact Scale (B-COHIS) foi aplicado no formato de entrevista. Estatística descritiva e teste de Mann-Whitney ($p < 0,05$) foram realizados. Os grupos de estudo foram: crianças sem trauma e com 1 ou mais dentes com trauma. A média de idade das crianças foi de 4,05 (1,05) anos, sendo 24 (61,5%) do sexo masculino e 15 (38,5%) do sexo feminino. Trinta e seis por cento da amostra

apresentou traumatismo dental. A idade mais acometida por trauma foi 5 anos. Quanto ao impacto do trauma na qualidade de vida, não houve diferença significativa entre os grupos tanto para a escala total do ECOHIS ($p=0,585$), quanto para seus domínios ($p>0,05$). Conclui-se que para a amostra estudada, independente da criança apresentar traumatismo dental, sua qualidade de vida foi afetada, o que pode estar diretamente relacionado a outras alterações bucais como cárie dentária.

EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SÃO LUÍS

FILHO, Jairton Costa*; CAMPOS, Iara Regina Serra; SOUSA, Rejane Christine De; LAHMA, Ana Paula Soares Fernandes; LEAL, Adriana Mara Araújo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: jairtonfilho@gmail.com

Os profissionais da área da saúde estão sob constantes riscos de acidentes ocupacionais envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos dos pacientes. As condições dos consultórios odontológicos oferecem ambientes favoráveis para transmissão de doenças infecciosas, uma vez que os profissionais trabalham em locais insalubres, com equipamentos e instrumentos complexos, muitos dos quais podem provocar cortes e abrasões na pele e mucosa. O objetivo desse estudo foi identificar, quantificar e avaliar os acidentes com exposição ao material biológico em profissionais de Odontologia da rede pública do município de São Luís - MA. Foi realizado um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, em 312 profissionais de Odontologia que trabalhavam em hospitais, postos de saúde e centro de saúde da rede municipal da cidade de São Luís/MA, no período de setembro de 2013 a agosto de 2014.

CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA

PINTO, Thaysa Fernandes*; SANTOS, Maurílio Dias; Da Silva, Mariana Carvalho Batista

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: thaysafp@gmail.com

Resumo: Dentro da família é possível observar o papel de liderança assumido pela mãe em relação aos cuidados com a saúde, sobretudo a saúde bucal das crianças. Avaliar o significado do processo saúde-doença para mães torna-se importante para definição de políticas de saúde que influenciam os cuidados com a saúde bucal (SB) de crianças. Com o objetivo de demonstrar o conhecimento materno sobre cuidados com a dentição decídua foi aplicado um questionário com dados sócio-demográficos e questões sobre conhecimento de SB para mães de crianças de 0 a 5 anos de idade usuárias da Unidade de Saúde da Família do Pirapora, na cidade de São Luís(MA). A análise das questões relacionadas ao nível de conhecimento foi determinada por uma matriz de resposta. Definiram-se dois parâmetros: conhecimento adequado – para um número de acertos entre 13 e 20; e conhecimento não adequado – menos de 13 acertos. Foi realizada estatística descritiva e teste do Qui-Quadrado e Exato de Fischer ($\alpha=0.05$). Estudo aprovado pelo CEP/Uniceuma (199.537 /12). 84 mães foram entrevistadas. 64,29% apresentou nível adequado de conhecimento. Em relação à condição socioeconômica a maioria (53,7%) era da classe C, com idade superior a 20 anos (85,71%), com escolaridade maior que 12 anos (40,48%). A variável classe socioeconômica foi significativa ($p=0,01$). Idade ($p=0.27$), escolaridade ($p=0.06$), cor da pele ($p=0.43$), acesso a serviço odontológico ($p=0.06$) e recebimento de orientação de higiene bucal da criança ($p=0.26$) não foram significantes. Os dados mostram que, o fator socioeconômico é o principal fator que interferiu no conhecimento materno.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PRESENTES EM DIETAS ENTERAIS DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO LUÍS-MA

MELO, Thalyta Araújo*; CARVALHO, Sabrina Cantanhede; FIGUEIREDO, Patrícia de Maria Silva

Curso: Nutrição

Categoria: graduação

Email: talytinha_melo@hotmail.com

Resumo: As dietas enterais são ricas em macro e micronutrientes e, por isso, tornaram-se excelentes meios de crescimento de microrganismos. A administração de dietas contaminadas pode não somente causar distúrbios gastrointestinais, mas

contribuir para as mais graves infecções, principalmente em pacientes hospitalizados, idosos ou imunocomprometidos. Considerando que os alimentos constituem fonte potencial de patógenos no ambiente hospitalar, o objetivo do presente trabalho foi identificar os principais microrganismos presentes em dietas enterais de um hospital particular de São Luís-MA. Foram avaliadas um total de 8 amostras de dietas enterais. As amostras foram submetidas a análise microbiológica no laboratório de microbiologia médica e de alimentos da Universidade Ceuma segundo protocolos convencionais de análise de alimentos. Verificou-se a contaminação das amostras por *Serratia liquefacies*, *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae*, *Citrobacter freundii*, *Shigella* SP, *Salmonella paratyphi*, *Salmonella choleraesuis*, *Hafnia alvei*, *Citrobacter diversus*. Os resultados obtidos mostram que as dietas enterais analisadas deste hospital apresentou microrganismos que podem causar sérios riscos à saúde dos hospitalizados e que desta forma medidas devem ser tomadas para que haja um maior controle na sua manipulação além da realização de análises microbiológica rotineiras.

CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL E CLÍNICA DE CRIANÇAS COM PNEUMONIA AGUDA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

FELIPE, Karen Karollynny Pereira*; ALVES, Matheus Silva; REGO, Joseany Soares; SILVA, Elen Sousa de Abreu; SILVA, Ilana Cristina de Paula Abreu; SOUSA, Eduardo Martins de; LIMA, Lidio Gonçalves Neto

Curso: Farmácia

Categoria: Graduação

Email: karollynny_kkp@hotmail.com

Modalidade: Painel

A Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma infecção aguda comum nos hospitais estando associada a alto índice de mortalidade. A organização mundial da saúde (OMS) considera a PAC como causadora de morte em crianças devido ao alto número de mortes associadas a ela, existindo poucos estudos nesse sentido. O presente estudo propõe analisar aspectos clínico e laboratorial em crianças com PAC. Foram selecionadas Trinta e três crianças, diagnosticado com pneumonia. Os dados foram coletados relacionados às características demográficas, condição coexistente, exame clínico e os parâmetros laboratoriais: hipoxemia, contagem de glóbulos brancos e os níveis de pcr. A média de idade e peso foram respectivamente 31,4 meses e 7,8Kg. Cinquenta e dois por cento das crianças são do sexo masculino. A avaliação nutricional, em média, apresentou score z negativo (valor médio -2,24), sendo a prevalência de crianças com score z igual -2,0 de 56,5%. A maioria das crianças (60,87%) apresenta pelo menos uma comorbidade, com histórico de tosse (73,91%), febre (95,65%), taquipnéia (47,82%) e dispnéia (82,6%). Vinte e sete por cento das crianças com PAC foram consideradas com hipoxemia. A média de contagem de glóbulos branco foi de 10,225 (*10⁶/L). A contagem foi de 11.000 *10⁶/L em mais de 56,53% crianças. A média de pcr foi de 5,00 mg/dL e em 29,13% das crianças apresentaram níveis de pcr acima de 6 mg/dL. Portanto o conhecimento do perfil laboratorial e epidemiológico de crianças com PAC pode contribuir para minimizar os fatores de riscos relacionados ao processo de infecção de PAC.

DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.

MARTINS, Ana Carla Privado*; CECÍLIA, Jéssica; SILVIA, Di Leli; MACHADO, Patrícia; PACHECO, Ivanilde; SANTOS, Verianne; VASQUES, Júlia Soares

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: ana.cpmartins@hotmail.com

Modalidade: Painel

A intenção desse projeto de intervenção psicossocial foi a realização de uma experiência terapêutica aplicada pelos alunos do curso psicologia da Universidade CEUMA do 6º período, com mulheres dependentes químicas da Comunidade Terapêutica no município de São Luís – MA. A intervenção psicossocial tem um caráter de pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, organizações e/ou comunidade (Neiva, 2010). O objetivo deste trabalho consiste em contribuir para o resgate de suas histórias de vida, o autoconhecimento, bem estar, promoção da cidadania, e a viabilização da manutenção dos seus laços sociais. Assim, entendemos que a realidade dessas mulheres, aponta para uma necessidade de práticas terapêuticas capazes de atender a tais pressupostos. Foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica, o levantamento das necessidades das internas através de pesquisa semi-estruturada e a intervenção, que foi realizada utilizando, como instrumentos terapêuticos,

algumas técnicas de dinâmicas de grupos auxiliadas por recursos audiovisuais. Após a intervenção, foi observado que elas estavam à vontade, o que as incentivou a relatarem de forma verbal e escrita, através de registros de desenhos, o que sentiam, falando sobre suas dificuldades, compartilhando ideias e, refletindo acerca de suas histórias de vida. Expressaram-se muito esperançosas e confiantes, afirmando o desejo de profissionalizarem-se e reconstruírem suas famílias. Portanto, diante do que foi proposto, a presente intervenção o promoveu que essas mulheres, desenvolvessem alguma percepção sobre si mesmas, lançando um olhar para o futuro com mais expectativas, sonhos e projetos, além de possibilitar reflexões sobre os seus direitos de cidadania.

MONITORAMENTO TEMPO E TEMPERATURA DE REFEIÇÕES DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino*; ARAÚJO, Marylana Ferreira; AIRES, Lisiane Silva Cruz; CANTANHEIDE, Nadya Vanessa; MORAIS, Jeane Cristina; ROCHA, Marina Sousa

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Modalidade: Painel

e-mail: jeanecrys@hotmail.com

Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por um intenso processo de transformação devido ao desenvolvimento industrial. As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) desempenham papel fundamental na saúde da população por meio da qualidade do alimento que produzem. Um dos fatores que pode prevenir alguns problemas de saúde é a temperatura do alimento, podem influir no crescimento dos microrganismos. O trabalho objetivou verificar a relação entre tempo e temperatura das refeições prontas para o consumo em um restaurante de alimentação coletiva. A avaliação do tempo e da estrutura dos alimentos aconteceu no mês de agosto de 2014. Foram escolhidos três tipos de preparações, as quais são servidas diariamente (arroz, feijão, proteína). Foi utilizado um termômetro tipo espeto digital para tal procedimento. Os dados obtidos foram transferidos em planilha no Microsoft Excel®, e comparados o binômio tempo e temperatura encontrados, com os recomendados pela legislação. A temperatura do início, meio e fim da preparação de arroz e feijão apresentaram temperatura adequada segundo a RDC (ANVISA, 2004) que padroniza que os alimentos quentes devem ser mantidos acima de 60°C por até seis horas já carne chegou ao balcão térmico na temperatura inadequada, e continuou ao longo da distribuição, sua temperatura teve uma alta no horário de 11:30 com 62,86°C. Os resultados apresentados mostraram que a carne necessita de medidas corretivas para melhoria da qualidade de temperatura. O controle de tempo e temperatura deve ser realizado diariamente através de termômetros em todas as fases do processo de produção.

PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA

SOUSA, Francisco Ferreira Júnior*; CARVALHO, Laise Neves; DUARTE, Jornande da Silva; LIMA, Marcus Vinícius; MADEIRA, Hellyne Gisele.

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: ffsousajunior_@hotmail.com

Modalidade: Painel

Este estudo objetivou descrever o perfil clínico de pacientes oncológicos atendidos em um Hospital Estadual de referência. Foi realizado um estudo observacional, descritivo transversal. Sendo que a amostra foi composta por 1396 pacientes oncológicos que foram atendidos entre 2010 e 2011, onde 733 pacientes eram homens e 663 mulheres que estiveram no registro do hospital, a maioria dos indivíduos estão na faixa etária de 65 a 79 anos, sem critérios de exclusão. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário de confecção própria no Sistema de Registro Hospitalar de Câncer. A análise dos dados foi feita através do programa Microsoft Excel 2007®, utilizando a estatística descritiva. Os dados obtidos mostraram que a prevalência de câncer no hospital pesquisado é maior no gênero masculino com 53% e o gênero feminino com 47%, sendo os cânceres de próstata e mama os mais frequentes, com relação ao estadiamento clínico do câncer, os mais frequentes foram estágio IV 309 (22,13%), estágio II 211 (15,11%), estágio III 175 (12,53%). Esses dados possibilitam concluir que o câncer de próstata, mama e colo de útero são os mais encontrados e o perfil de atendimento do hospital pode ter influenciado na maior prevalência de câncer no gênero masculino.

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE PESCADOS COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA LIVRE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO

CHAGAS, Lucas Almeida das*; CARDOSO, Raissa Saraiva; DUARTE, Rita de Cássia Lucena; HORTEGAL, Elane Viana; JANSEN, Maria do Socorro Mendes; REIS, Virgínia Nunes Lima; ROCHA, Marina Souza

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: jansensocorro@hotmail.com

De acordo com o Ministério da Pesca e Agricultura, o consumo per capita de peixes no Brasil é de 9,03 kg por ano, índice considerado baixo em relação ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 12 kg por pessoa por ano. Por ser altamente perecível, exige muitos cuidados especiais, desde a manipulação até a comercialização, passando por armazenamento, conservação e transporte. Em geral, o peixe é vendido inteiro e pode estar in natura, (conhecido como “peixe fresco”) refrigerado ou congelado. O objetivo foi avaliar a qualidade dos peixes de água doce e água salgada comercializados em uma feira pública em São Luís do Maranhão. Foram avaliadas as características sensoriais de compras, preconizadas pelo ministério da saúde dos pescados localizados em uma feira pública de São Luís do Maranhão no mês de Agosto de 2014, foram selecionados seis boxes que funcionavam diariamente das seis horas da manhã até cinco e meia da tarde. Os indicadores utilizados na análise dos pescados foram a pele brilhante e úmida com tonalidade viva; muco ausente; escamas unidas entre si; carne firme aderida aos ossos; opérculo (membrana que reveste guelras) rígido, oferecendo resistência a sua abertura; guelras vermelhas; órgãos internos bem definidos; olhos salientes e brilhantes; odor suave ou ausente. Portanto, todos os grupos de peixes analisados estavam dentro dos padrões de qualidade para serem comercializados e consumidos.

CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE EGRESSOS E FORMANDOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICUMAL - MA

SOUSA, Ingrid Mendonça*; MARINHO, Sílvia Carvalho Marinho; MOTA, Jessayne Larissa Mulat; RABELO, Hérica Polyana Silva Martins; TEIXEIRA, Joelma Ximenes Prado Teixeira; ROCHA, Marina Souza

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: ingrid.mend.di@gmail.com

Modalidade: Paineis

Conhecer o nível de compreensão e de interesse que os alunos têm sobre as informações nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos é uma análise sobre a qualidade da alimentação e saúde desses indivíduos. O estudo objetivou comparar o nível de conhecimento sobre informação nutricional entre alunos do 1º e 8º períodos do curso de Nutrição de uma Universidade particular em São Luís-MA. Trata-se de um estudo descritivo realizado em 2014, foram entrevistados 57 alunos. Os dados foram obtidos através de um questionário semiestruturado, composto por catorze perguntas fechadas. A maioria dos entrevistados foram mulheres. Os alunos reconheciam a relevância da informação nutricional veiculada pela rotulagem dos alimentos. Porém apenas 46,5% dos alunos do 1º período dizem conhecer o suficiente para entender os rótulos, no 8º período este percentual foi de 93%. Questionados sobre a compreensão dos rótulos, mais de 90% dos alunos do 1º período afirmaram compreender apenas parcialmente, já a maioria do 8º período (57,2%) relatou compreender tudo sobre o tema. O aspecto que mais dificulta esta compreensão segundo os alunos do 1º período é a utilização de linguagem técnica/abreviatura/siglas, enquanto que alunos do 8º período (71,4%) são o tamanho das letras nos rótulos. Portanto houve diferença no nível de conhecimento entre as turmas. Alunos do 1º período apresentaram déficit de compreensão das informações nutricionais. Já os alunos do 8º período afirmaram ter domínio do tema.

CUIDANDO DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA

SILVEIRA, Francisca Moraes da*; ALVES, Candida Helena Lopes; MELO, Marina Da Silva e; LIMA, Suely Costa; SERRA, Melina; OLIVEIRA, Crhisthianny Valente de

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: francmor@globo.com

Modalidade: Paineis

Trata-se de um Projeto de pesquisa que assiste cuidadores, em: atendimentos individuais, com avaliação cognitiva básica; treinamento em cuidadores de idosos com demência com orientação individual, de grupo e oficinas terapêuticas.

O objetivo geral é identificar as necessidades dos cuidadores. Os específicos são: avaliar os procedimentos desenvolvidos pelo cuidador; buscar atividades voltadas para a inserção de serviços entre idosos e seus cuidadores, visando um atendimento integral que assista as partes em questão; conscientizar sobre as necessidades de auto-estimulação para atender a si e ao idoso na condição atual; possibilitar ao cuidador a capacidade para aceitar críticas, superar impasses e frustrações; verificar a real importância da inserção do psicólogo no contexto diário do trabalho do cuidado com os idosos acometidos de demência. Metodologia baseada no estudo exploratório-descritivo em encontros grupais com os cuidadores. Coleta de dados com questionários com temas de interesse e técnica de atendimento com idosos e aplicação da Escala de Hamilton, para avaliar o estresse. Análise dos dados é estatística descritiva, pela qual analisamos os resultados. Resultados: O projeto está em andamento, mas os resultados são surpreendentes. Os cuidadores já aprenderam a abordar situações conflitivas com maior maturidade, superando com maior segurança as críticas, impasses e frustrações no decorrer de suas tarefas. O Projeto está em início de funcionalidade, mas é possível verificar a importância das intervenções psicológicas no trabalho com cuidadores de idosos, minimizando os possíveis entraves na eficácia do binômio cuidador e idoso.

PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA

NASCIMENTO, Thanieri Dos Santos*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; DIAS, Rosane da Silva; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: thannyere_nascimento@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de asma em um grupo de escolares da rede pública de ensino. Asma é uma doença inflamatória crônica associada à hiperresponsividade das vias aéreas. Estima-se que atualmente existam 300 milhões de pessoas com esta doença no mundo. Embora essa patologia possa ocorrer em qualquer fase da vida, é mais comum que os primeiros sintomas apareçam na infância. Foi realizado estudo transversal no período de agosto e setembro de 2013 em uma escola da rede pública de ensino de São Luís – MA. Foram incluídos no estudo 78 alunos, de ambos os gêneros. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Na análise bivariada, foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo estabelecido nível de significância de 5%. A prevalência de asma na amostra estudada foi de 42,3%, sendo que entre 9 a 11 anos, 24 (72,7%) escolares apresentaram asma e entre 12 e 14 anos, apenas 9 (27,3) tiveram. A mediana do pico de fluxo dos indivíduos com asma foi de 410 (260-590) L/min. Não foi verificada associação estatisticamente significativa entre aspectos sociodemográficos e asma. Este estudo evidenciou que escolares de uma rede pública de ensino mostram uma alta prevalência de asma, dessa forma medidas educativas devem ser instituídas para minimizar o impacto dessa doença nessa população.

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOs NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

SCHERR, Jéssica Torres*; CALISTO, Mariana Martins; SANTANA, Renata Karissa Pessoa; VIEIRA, Kelly Luana Rodrigues; CARVALHO, Laíse Neves; SILVA, Anieli Aranha

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: kluanavieira@hotmail.com

Esse trabalho tem como objetivo verificar a influência da idade e escolaridade materna sobre o planejamento familiar. Segundo o Ministério da Saúde vários aspectos sociodemográficos, como idade, escolaridade, estado civil e ocupação influenciam no planejamento familiar. Estudos descrevem que as famílias mais numerosas pertencem a mães mais jovens e analfabetas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, do tipo corte transversal, realizado com 48 gestantes. O estudo foi realizado em quatro unidades básicas de saúde: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, no período entre setembro de 2013 a março de 2014. Para coleta de dados foi utilizado um questionário formulado por preceptores do PET-saúde Redes da Universidade Ceuma, sendo sua aplicação realizada por alunos voluntários e bolsistas do programa. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Uniceuma com número de parecer 743094. Apenas 35,4% (17) das mulheres planejaram a gestação. Entre estas, 17,6% (3) tem abaixo de 18 anos, 41,2% (7) entre 18 e 28 anos e 41,2% (7) acima de 28 anos. A maioria 52,9% (9) são casadas e 41,25% (7) são analfabetas, porém, 17,6% (3) cursaram

até 8ª série do ensino fundamental, 11,8% (2) o ensino médio incompleto e 23,5% (4) ensino médio completo. Embora a adolescência interfira negativamente no planejamento familiar, isso não foi verificado. Com relação ao nível de escolaridade, esse aspecto influenciou no planejamento familiar da amostra estudada.

AValiação Nutricional de Pacientes em Hemodiálise: Utilização da ASG 7 Escalas

Sousa, Jaicara Melo De Araújo*; BACELAR, Jerciane Dos Santos Costa; DA SILVA, Rayara Cristinna Viana; MACHADO, Keliny Kelem Costa; MESQUITA, Patricia De Souza ROCHA, Marina Souza; HORTEGAL, Elane Viana

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: jaicaramelo@hotmail.com

A DRC é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais com impacto no estado nutricional dos pacientes. A avaliação nutricional subjetiva é um método capaz de avaliar o estado nutricional e considera não apenas alterações da composição corporal, mas também alterações funcionais dos pacientes. A avaliação subjetiva global (ASG) 7 escalas é um método adaptado aos pacientes renais crônicos, capaz de detectar um maior número de pacientes com desnutrição, podendo ser utilizada para intervenção precoce. Avaliar de forma correta o estado nutricional destes é de fundamental importância, pois a desnutrição energética- proteica (DEP) na hemodiálise é um fator de risco para mortalidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional utilizando a ASG 7 escalas em pacientes em tratamento hemodialítico de uma clínica particular de São Luis, Maranhão. Foram entrevistados 27 pacientes com idade de 26 a 92 anos. Além da ASG 7 escalas, foi realizada avaliação antropométrica após a sessão de diálise onde incluía o peso seco em quilogramas e a altura em centímetros para calcular o índice de massa corporal (IMC), classificado de acordo com o preconizado pela OMS. Observou-se que 59,2% apresentaram eutrofia, 33,33% sobrepeso e apenas 7,4% desnutrição pelo IMC. Quando o estado nutricional foi avaliado pela ASG 7 escalas, constatou-se que mais 60% dos indivíduos apresentou algum grau de desnutrição. Desta forma, a ASG parece ser um método que detecta melhor a desnutrição nestes pacientes.

EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS

ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima*; DE SOUZA, Marina Batista; RIBEIRO, Wallyson Martins; SOARES, Julia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: liviaguedesandrade@gmail.com

A música está presente na vida do homem desde seu nascimento. É, por exemplo, pela via das canções de ninar que o sujeito humano faz sua entrada na cultura. Stern e Trevarthen são autores que apresentam estudos da presença da ritmicidade desde as primeiras interações mãe-bebê, contribuindo os estudos que confirmam a importância dos ritmos para a estruturação psíquica do sujeito. O Projeto intenciona verificar o potencial do ritmo e da música no desenvolvimento das crianças com ou sem entraves no processo de constituição psíquica, no que tange sua relação com o outro e sua entrada no mundo simbólico. O objetivo é avaliar os efeitos de um atelier musical como intervenção terapêutica em crianças com desenvolvimento típico e atípico, averiguando a percepção dos afetos, o desenvolvimento da linguagem e a potencialidade de enlaçamento com o outro. A importância do presente estudo justifica-se principalmente pelo fato de haverem poucos estudos no Brasil que abordem este tipo de intervenção na perspectiva apresentada, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade da assistência a crianças com TID, especialmente nos serviços da rede pública de saúde, uma vez que não exige grandes recursos materiais e pode ser facilmente executada pelos profissionais especialistas. O projeto será desenvolvido com crianças de desenvolvimento típico e atípico, de 2 a 4 anos, em um ateliê Mix Musical, que funciona semanalmente no CIAMM – instituição sediada em São Luís desde 2004. Após os encontros, será analisado o desempenho individual das crianças participantes com relatórios transcritos e supervisionado pelas coordenadoras do projeto.

DISTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SÃO LUÍS – MA

CASTRO JÚNIOR, Webster Silva *; CARVALHO, Guilherme Larilho de Sena; DUTRA, Izamara Lira de Sousa; Mendes, Márcia Cuenca Campos

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: webstercastro@hotmail.com

Resumo: Consiste no levantamento das unidades de saúde do município de São Luís – MA para atenção de baixa, média e alta complexidade em 2014 localizando sua distribuição geográfica e realizando pesquisa de campo em cada uma delas, valendo-se de observações e entrevistas, visando contribuir para a melhoria dos Serviços de Saúde deste município. Identifica os serviços de saúde oferecidos, os recursos humanos disponíveis para a Odontologia e a capacidade instalada para a prestação de assistência odontológica, tendo como referência os princípios do Sistema Único de Saúde.

EQUILÍBRIO POSTURAL E PROCESSAMENTO COGNITIVO EM IDOSOS SUBMETIDOS A ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA.

LIMA, ANTÔNIO ALMIR JÚNIOR *; OLIVEIRA, Laricy Dias; VIANA, Alef Salgado Viana; LIMA, Alysso Kennedy Sales; SAUAIA, Bismarck Ascar; Soares, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: fisioterapia

Categoria: graduação

Email: JRLIMAA@GMAIL.COM

Resumo: O envelhecimento implica alterações físico-funcionais, entre elas, alterações do equilíbrio corporal, frequentemente associado ao declínio de capacidades físico/cognitivas. Objetivou-se aqui analisar o efeito do protocolo de dupla tarefa no equilíbrio postural de idosos. Realizou-se um ensaio clínico randomizado realizado em São Luís-Ma, em 2014. Amostra constituída por 40 idosos, com idade entre 70 e 75 anos. Na coleta de dados utilizou-se a Versão Timed up And Go para avaliar a mobilidade e o equilíbrio corporal dinâmico, além do risco de quedas, aplicado antes e após a intervenção de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa com duração de três meses, com a frequência de duas vezes por semana 50 minutos/dia. O tratamento estatístico realizou-se usando o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas utilizou-se média e desvio padrão convertido em escores, e o teste de contingência para variáveis independentes sendo considerado significativo $p < 0,05$. Os resultados mostraram maiores frequências, considerando-se o risco de cair em idosos, para antes, médio risco com um $n=40$ (100% da amostra) e, para depois, baixo risco com $n = 36$ (90% da amostra). Na análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se leve variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (Antes = 23,09 e Depois = 19,73), o que indica maior dispersão de valores antes da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência para variáveis independentes definiu-se $p < 0,0001$. Os resultados permitem concluir que existe uma relação altamente significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do risco de cair.

Palavras-chave: Controle postural, Atividades Cognitivas, Idosos, Risco de cair, Tarefa dupla.

GRUPO OPERATIVO COM GESTANTES: Uma ótica na qualidade de vida

MELO, Emanuelle Ferreira *; Mendonça, Thais Andres

Curso: Terapia Ocupacional

Categoria: graduação

Email: emanuellemelo.to@gmail.com

Resumo: o período gravídico demanda suporte não só de seu aspecto biológico, por meio do pré-natal, mais também de outras questões subjetivas, visto que, essa situação pressupõe de plenitude e bem-estar, desta forma a pesquisa procura avaliar a qualidade de vida das gestantes através de um grupo operativo ofertado pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida das gestantes que participam de um grupo operativo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vicente Fialho do município de São Luís no estado do Maranhão.

Método: A opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa do tipo exploratório/descritivo e foi utilizado como instrumento para coleta de dados o WHOQOL – BREF desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os sujeitos da pesquisa foram uma amostra de conveniência de 20 gestantes.

Resultados: A avaliação da qualidade de vida na primeira aplicação nos mostrou que 50% avaliaram sendo ruim e regular a outra metade considera satisfatória sua qualidade de vida de forma geral. Quanto aos domínios analisados obteve um escore alto para o domínio físico de 85% que estão entre péssimas e ruins, já o domínio psicológico a escore obtida foi 80% que se dividem entre ruins e regular no escore no domínio das relações sociais 55% estão razoáveis este domínio foi o que obteve menor escore, porém o domínio do meio ambiente com 95% estão entre ruim e regular.

Conclusão: O estudo mostra que o grupo operativo promove a qualidade de vida durante a gestação através dos fatores que as influenciam diretamente. Quanto à segunda avaliação da qualidade de vida geral obteve-se 25% de aumento favorável,

no domínio físico 25% de aumento benéfico mediante suas facetas, já o domínio psicológico 15% aumentaram proveitosamente suas escores, no escore do domínio das relações sociais 15% desenvolveram positivamente, porém o domínio do meio ambiente houve um aumento de 25% favorável nesse aspecto então, constatou-se que houve um aumento significativo 90% nos domínios e nas suas respectivas facetas.

USO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DO CUIDADO E ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.

OLIVEIRA, Viviane Cardoso Lima *; CAMPOS, Beatriz Galdino de Sousa; TORRES, Carla Gardênia do Rego Brandão; SANTOS E SANTOS, Leandro; MENEZES, Pedro Valdo Lucena; Reis, Waneska Ferreira Cavalcante de Albuquerque

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: vivi_cslm@hotmail.com

Resumo: Os indicadores de saúde representam instrumentos epidemiológicos que contribuem para avaliação e monitoramento dos resultados alcançados em relação à assistência e organização do cuidado odontológico. O advento do Pacto pela Saúde institui diretrizes, metas e prioridades que devem nortear as ações e serviços em saúde no Brasil. Considerando que as políticas públicas de saúde bucal devam ser otimizadas, permitindo maior efetividade e equidade social, o objetivo do estudo é descrever o acesso ao cuidado odontológico e monitoramento das necessidades de saúde nas zonas urbanas e rurais do estado do Maranhão através do uso de indicadores. Trata-se de um estudo descritivo a partir de observações de fontes secundárias envolvendo dados coletados do Sistema de Informação da Atenção Básica. Foram utilizados indicadores de desempenho (cobertura de 1ª consulta odontológica programada e escovação dental supervisionada) e monitoramento (instalação de prótese dentária e diagnóstico de alteração da mucosa oral). Os resultados evidenciam que apenas 37% da população da zona rural do estado do Maranhão é beneficiada pelas ações de escovação dental, visando à prevenção de doenças bucais e que o acesso a tratamento odontológico aconteceu em maior proporção na zona urbana. Em relação à demanda de reabilitação protética, a zona rural demonstra menor percentual de população assistida, bem como ações para diagnóstico precoce das lesões de mucosa e câncer bucal. Os indicadores epidemiológicos demonstram uma relação desigual na produção do cuidado em saúde bucal, com existência de localidades que não conseguem usufruir completamente das estratégias de promoção da saúde.

INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO FÍSICO E COGNITIVO NO MEDO DE QUEDAS EM IDOSOS

VIANA, Alef Salgado*; LIMA, Alysso Kennedy Sales; LIMA, Antônio Almir Junior; SAUAIA, Bismarck Ascar; DO NASCIMENTO, Eline Lima; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: allef_nunes@hotmail.com

Além dos problemas físicos, o medo de cair é um fator limitante e depressor da qualidade de vida de idosos. Estudos defendem a prática de atividade física como ferramenta na manutenção da saúde funcional de idosos, melhora do equilíbrio postural e a diminuição do medo de cair. Este estudo objetivou avaliar o efeito de um protocolo de dupla tarefa no medo de cair em idosos. Tratou-se de um ensaio clínico randomizado realizado em São Luís - MA em 2014, 40 idosos (70-75 anos). Na coleta de dados, utilizou-se o questionário FES-Brasil que avalia o medo de cair em idosos através de 16 perguntas relacionadas a atividades diárias. Aplicou-se o teste antes e depois da intervenção do protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa durante três meses, duas vezes por semana (50 minutos/dia). No tratamento estatístico, utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas, empregou-se média e desvio padrão e o teste de contingência sendo considerado significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se o medo de cair em idosos, para Antes e Depois da intervenção, com um medo leve, respectivamente ($n=22$; 55%); ($n=27$; 67,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se pequena variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (AAP=10,26) e (DAP=12,34), o que indica maior dispersão de valores depois da aplicação do protocolo; com a utilização do teste de contingência para variáveis independentes verificou-se $p=0,0006$. Os resultados obtidos permitem afirmar que existe uma relação significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do medo de cair.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES OSTOMIZADOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SÃO LUÍS – MA NO ANO DE 2013

SAUAIA, Cleres Helena Santos*; PRADO, Rosa de Paula e Silva; SILVA, Maryjom Venicius Teixeira; FILHO, Euler Nicolau Sauaia; DOS SANTOS, Orlando José.

Curso: Medicina
Categoria: Graduação
E-mail: rosinhadp@gmail.com

Os estomas são aberturas cirúrgicas feitas na parede do intestino no caso de enfermidades em que haja a necessidade do desvio do trânsito intestinal para o meio externo. Nesse contexto, conhecer a casuística de cada grupo de pacientes é relevante para se planejar atendimento adequado e equânime. Dessa forma, avaliou-se o perfil epidemiológico dos pacientes estomizados assistidos pelo Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Presidente Dutra (HUUPD). A metodologia consistiu no estudo observacional, descritivo, retrospectivo e individuado em que foram coletados dados de 101 pacientes com estomas intestinais de eliminação cadastrados no referido programa de janeiro a dezembro de 2013, com análise das variáveis: idade, sexo e procedência dos pacientes, indicação, tipo e caráter temporal dos estomas. Após coleta dos dados, foi realizada sua análise descritiva pelo Bioestat 5.0. Dos 101 pacientes, 65,3% eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi 43,15 anos. A maior parte dos pacientes (67,4%) era procedente de São Luís-MA, e 32,6% do interior do estado. Com relação ao tipo de estoma, 77,3% eram colostomias e 22,7% ileostomias, sendo que 81,18% deles eram temporários e 18,82% definitivos. A causa principal de indicação dos estomas foi o trauma abdominal (27,7%), com atenção para o trauma por arma de fogo (71,5%); a segunda causa mais frequente foi a neoplasia maligna do trato gastrointestinal, seguido pelo abdômen agudo inflamatório. Conclui-se que o perfil dos pacientes ostomizados sugere a realização de intervenções na prevenção e promoção da saúde e na construção das estratégias de enfrentamento das enfermidades.

ACESSIBILIDADE ORGANIZACIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL À REABILITAÇÃO MOTORA EM SÃO LUÍS: COMO ESTAMOS?

NASCIMENTO, Leia Ribeiro do*; COSTA, Jéssica Bianca Pinheiro; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; PEREIRA, Eugênia Aires; ALMEIDA, Natália Fernanda Gaspar de; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia
Categoria: Graduação
E-mail: leiaribeiro-20111@hotmail.com

Caracterizar a acessibilidade organizacional de crianças com Paralisia Cerebral à reabilitação motora no Sistema Único de Saúde na cidade de São Luís – MA. A Paralisia Cerebral refere-se a uma síndrome de caráter não progressivo, que acomete o sistema nervoso central imaturo e em desenvolvimento, ocasionando desordens motoras. O difícil acesso das pessoas com deficiência aos serviços necessários tende a potencializar a deterioração provocada pelo agravo, levando ao aparecimento de condições secundárias que contribuem para a diminuição da qualidade de vida. Foi realizado estudo observacional, descritivo, transversal na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Luís – MA, no período entre janeiro e abril de 2014. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário modificado de Torres (2010). Os dados são apresentados em frequência relativa e percentual. A amostra foi constituída por 21 crianças, sendo 90,5% (19) encaminhada para fisioterapia por indicação do serviço de saúde. Para marcação da avaliação, 76,2% (16) relatam que foram ao local pessoalmente. Quando questionados sobre dificuldades em relação esse primeiro contato, 95,2% (20) relatam que não houve nenhuma e 52,4% (11) referem satisfeitos. Após a marcação da avaliação, 52,4% (11) esperaram até 7 dias para o atendimento, porém, para 47,6% (10) dos responsáveis, esse tempo não pareceu nem grande nem pequeno. Apenas 19,0% (4) relatam que encontraram dificuldades para continuar a fisioterapia motora e 61,9% (13) referem estar satisfeitos com o tratamento recebido. Observaram-se avaliações positivas em relação à acessibilidade organizacional aos serviços de reabilitação em São Luís.

COMPARAÇÃO DAS CONDUTAS DE SAÚDE ENTRE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO LUÍS

SILVA, Joice Penha*; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; PEREIRA, Eugênia Aires; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; CARVALHO, Laíse Neves; DIAS, Rosane da Silva

Curso: Fisioterapia
Categoria: Graduação
E-mail: joicepenha2010@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar as condutas de saúde entre universitários de uma universidade privada de São Luís. As frequentes trocas de experiências realizadas ao longo da vida acadêmica podem se caracterizar como um agrupamento de ações que estimulam e apresentam ao jovem universitário possibilidades de obtenção de novos com-

portamentos, incluindo os comportamentos de risco. Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, realizado entre abril e agosto de 2013 na Universidade Ceuma. Foram incluídos no estudo, 354 discentes da área de saúde de ambos os sexos, regularmente matriculados em períodos com disciplinas teóricas. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para o Brasil. Na comparação das condutas de saúde entre os alunos dos diversos cursos, foi utilizado o teste Qui-Quadrado interpretado ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA com parecer 372.391. Foi verificada diferença estatisticamente significativa entre os cursos com relação a prática de atividades físicas ($p < 0,01$), consumo de frutas ($p < 0,01$), consumo de hambúrguer ($p = 0,05$) e consumo de biscoitos ($p = 0,02$). O curso que menos pratica atividade física é o de enfermagem e com relação ao consumo de fruta, o que menos consome são farmácia e fisioterapia. Diante dos resultados apresentados, faz-se necessário estimular os universitários da área de saúde a adotarem práticas saudáveis, uma vez que eles se tornarão orientadores e conselheiros de pacientes nas estratégias de prevenção de doenças.

A FLEXIBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A AUTONOMIA FUNCIONAL EM IDOSOS

DE SOUZA, Thaisa Nunes*; HAIDAR, Adelizir Malheiros

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: thaisanunes17@hotmail.com

Verificar a relação entre flexibilidade e autonomia funcional em idosos. Trata-se de um estudo Analítico com delineamento transversal que foi realizado no Posto de Saúde - Paço do Lumiar, entre março e abril de 2014. Foi obtida uma amostra de conveniência com 30 idosos. Para coleta de dados, foi utilizado o protocolo do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a Maturidade – GDLAM, o flexômetro (banco de Wells) e a ficha de avaliação inicial com as características sócio-demográficas. Os dados foram digitados e analisados no SPSS 18.0. Na estatística descritiva, as variáveis quantitativas são apresentadas em mediana, mínimo e máximo, enquanto as variáveis qualitativas são descritas através de frequências absolutas e relativas. Na correlação entre autonomia funcional e flexibilidade, foi utilizada a correlação de Spearman, sendo considerado significativo $p < 0,05$. A amostra estudada obteve tais resultados relacionados às características sócio-demográficas: sendo a maioria (60%) do gênero feminino; estado civil, 66,7% são casados; 33,33% tem 1º grau completo. No último ano apenas 17% refere ter sofrido queda; Quanto à autonomia funcional 33,3% foi fraco e a flexibilidade 33,3% foi excelente. Na análise da relação entre flexibilidade e autonomia funcional, a correlação foi de 0,16 ($p = 0,39$). Dessa forma, verifica-se que não existe relação entre o grau de flexibilidade e a autonomia funcional de idosos. Não houve relação entre a flexibilidade e autonomia funcional entre os idosos. A falta de significância estatística pode estar relacionada a variabilidade do grupo de não praticantes de atividade física.

TDAH - FIQUE ALERTA AO DIAGNÓSTICO!

DE MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes*; SERRA, Melina

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: elianeek2@hotmail.com

Diversos especialistas têm criticado o excesso de diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e, sobretudo, a crescente utilização de psicofármacos em crianças como solução para problemas de comportamento na escola, provocando a chamada medicalização do ensino. Este trabalho está sendo realizado por meio de pesquisa bibliográfica e objetiva alertar para problemas escolares que estão repercutindo no âmbito da saúde, enquanto deveriam ser tratados com estratégias de ensino mais dinâmicas, porém a escola, muitas vezes, usa métodos que não atingem todos os alunos os quais se desinteressam, apresentando hiperatividade e situações conflitantes. Não se pode correr o risco de transformar a desobediência, a desatenção e outras características indesejadas em transtornos ou patologias, já que se deve considerar a influência do meio social e de fatores econômicos e pedagógicos sobre o modo como o aluno age, pois o seu comportamento poderá ter distintas causas: personalidade, história particular, situações pelas quais estão passando, imaturidade, aulas desestimulantes. Diante da complexidade e falta de evidências científicas que sustentem uma etiologia única, o diagnóstico deve ser clínico, verificando se as características do TDAH estão mesmo presentes na criança para excluir outros transtornos, sendo imprescindível a colaboração familiar, dos psicólogos e dos professores, porque, embora haja excessos de diagnósticos, há casos graves do transtorno que precisam de medicação, tratamento com profissionais e educadores especializados, com capacidade para lidar com esse fenômeno, além do envolvimento e colaboração da família.

CONTROLE DA ANSIEDADE POR MEIO DE FITOTERÁPICOS NA ODONTOLOGIA

DE SOUZA, Izabella CAMPOS, Cinthia; Gimenes*; ARAÚJO, Lucian; PEREIRA, Priscila Silva; SOUSA, Carolina; MACIEL, Francisco; MACIEL, Andrezza

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lza_gimenes@hotmail.com

A fitoterapia vem ganhando espaço no campo odontológico, sendo cada vez mais utilizada para tratamentos de psicopatologias, a fim de ser uma alternativa a drogas como os benzodiazepínicos; pois os fitoterápicos apresentam melhor custo benefício e menos efeitos adversos a saúde dos pacientes quanto ao outro grupo. Devido a essa importância, o trabalho abordará os temas fitoterápicos que agem no sistema nervoso central auxiliando no combate da ansiedade de pacientes que sofrem de tal transtorno quando se deparam com procedimentos odontológicos. Partindo do pressuposto, que há uma positiva eficácia da fitoterapia no combate ao medo, a ansiedade e até mesmo a depressão, iremos expor em forma de banner, suas indicações, vantagens, desvantagens, posologia, as possíveis consequências e interações medicamentosas nas formas de plantas medicinais mais eficientes, como a Passiflora, Valleriana dentre outras. Pois estas serão nossas aliadas ao combate à consequências da ansiedade no tratamento odontológico que cercam os cirurgiões-dentistas nos consultórios, proporcionando um atendimento menos agitado e traumático para ambos.

INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS

SILVA, Larissa Arani Coleta Ramos da*; SILVA, Ana Nilza Lins; CARVALHO, Laíse Neves Carvalho; CAVALCANTE, Mirella Araújo;

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: larissaarani@hotmail.com

O objetivo do trabalho é avaliar a quantidade de consultas pré-natais realizadas por gestantes que foram atendidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A assistência pré-natal visa avaliar a condição materna e fetal de forma precoce com o intuito de prevenir ou atenuar prováveis complicações, assim sendo de significativa importância tanto para a gestante, quanto para o conceito. A metodologia baseia-se em um estudo quantitativo, descritivo, observacional, de corte transversal, realizado com 46 gestantes atendidas em quatro unidades básicas de saúde, de São Luís - Maranhão: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, nos meses de setembro de 2013 a março de 2014, com informações coletadas, através de um questionário formulado pelos preceptores do Pet-Saúde da Universidade Ceuma. Os resultados obtidos mostraram que, das 46 gestantes incluídas na amostra, apenas 36,9% (17) planejaram a gestação. Destas, 17,6% (3) não realizaram nenhuma consulta médica, 29,4% (5) uma consulta, 23,5% (4) duas, 5,9% (1) três, 5,9% (1) quatro, 5,9% (1) cinco, 5,9% (1) seis e apenas 5,9% (1) nove consultas. Através da análise dos resultados, percebe-se que mesmo entre gestantes que planejaram a gravidez, há um elevado número de mulheres que não realizaram consulta durante a gestação, o que indica um relevante risco para a saúde materna e fetal. Assim, considera a maior necessidade de orientação sobre a importância dos cuidados pré-natais, intensificando as campanhas voltadas para a explicação dos benefícios e da essencialidade da realização de consultas pré-natais.

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE DUPLA TAREFA NA FLUÊNCIA VERBAL DOS IDOSOS

DO NASCIMENTO, Eline Lima;* LIMA, Alysson Kenedy Sales; SAUAIA, Bismarck Ascar; VIANA, Alef Salgado; LIMA, Antônio Almir Junior; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: elinelima33@hotmail.com

A cognição dos idosos apresenta um declínio natural e gradual. Estudos indicam que a atividade física regular retarda essa perda, mas poucos referem utilização de exercícios de dupla tarefa, envolvendo funções físicas e cognitivas. Objetivou-se aqui avaliar a fluência verbal de idosos, após treinamento com dupla tarefa através de um estudo realizado em São Luís - MA em 2014, com amostra constituída por 40 idosos (entre 70-75 anos). Na coleta de dados utilizou-se o teste de fluência verbal na categoria animais, que fornece informações acerca da memória semântica, habilidade de recuperar informação memorizada e processamento das funções executivas. O teste foi aplicado antes e após a intervenção de um protocolo de dupla tarefa com

duração de três meses, duas vezes por semana 50 minutos/dia. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas empregou-se média e desvio padrão, e teste de contingência sendo significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se a habilidade de recuperar informações de memória, para antes baixa e alta capacidade de valores equitativos ($n=20$; 50%) e, para depois, alta capacidade, com $n=37$ (92,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se estatística descritiva observou-se leve variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (Antes=0,0; Depois=2,82), o que indica maior dispersão de valores depois da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência para variáveis independentes ficou definido um (p) 0,4352. Os resultados permitem afirmar que estatisticamente não existe relação significativa entre a aplicação do protocolo e o aumento da capacidade de recuperar informações.

INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.

AMORIM, Adalberto Paulo Varella*; COSTA, Jocilene de Lima; RIZZI, Cláudia do Castro; TEXEIRA, Larissa Barbosa; CÂMARA, Vanda Silva

Orientador: LEAL, Adriana

Co-Orientador: GASPARG, Tânia

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: adalbertopaulofilho@hotmail.com

Sabe-se que a adequada esterilização do instrumental de trabalho é uma condição essencial para que seja mantida a cadeia asséptica e se atinja o sucesso da terapia endodôntica. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência dos diferentes métodos de limpeza na efetividade do processo de esterilização de limas endodônticas. Para o estudo, foram coletadas 50 limas endodônticas, que foram distribuídas em cinco grupos: G1 – limas novas sem processo de esterilização; G2 – utilizadas previamente e autoclavadas; G3 – utilizadas previamente e realizada a limpeza com água e sabão, secas, embaladas e autoclavadas; G4 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, secas, embaladas e autoclavadas; G5 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, lavadas, secas, embaladas e autoclavadas. Para a análise microbiológica, as limas foram inseridas, individualmente, em tubos de ensaio, contendo meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI) e levadas à estufa bacteriológica a 37°C onde permaneceu por 48 horas sendo a leitura feita em 72 horas. Resultados: Após o período de incubação as limas submetidas ao processo de esterilização independente do método de limpeza utilizado não apresentaram crescimento microbiano, no entanto, observou-se crescimento microbiano em 10% das amostras do G1 e 20% do G2. Conclusão: Pode-se concluir que as limas que não passaram pelo processo de limpeza prévia apresentaram contaminação microbiológica mesmo após a esterilização por calor úmido.

AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.

LIMA, Alysson Kenedy Sales*; SAUAIA, Bismarck Ascar; VIANA, Alef Salgado; LIMA, Antônio Almir Junior; NASCIMENTO, Eline Lima do

Orientador: SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Co-Orientador: ALVES, Cândida Helena Lopes

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: alyssonkenedysaleslima@gmail.com

Envelhecimento implica alterações físicas e mentais que podem remeter para uma incapacidade em realizar tarefas básicas potencializando o risco de cair. A atividade física parece minimizar este quadro promovendo ajustes posturais em situações de desequilíbrio e prevenindo quedas. Estudos indicam a realização de exercício envolvendo tarefas físico/cognitivas simultaneamente para potencializar este efeito. Objetivou-se analisar o desempenho do protocolo de dupla tarefa no risco de queda em idosos. O estudo decorreu em São Luís-Ma, em 2014, amostra constituída por 40 idosos, 70 a 75 anos. Na coleta de dados utilizou-se o teste de Tinetti, versão adaptada ao Brasil, que avalia a mobilidade e equilíbrio em idosos correlacionando-os ao risco de cair. O teste foi aplicado antes e após a intervenção de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa que durou três meses, duas vezes por semana 50 minutos/dia. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva da capacidade atencional empregou-se média e desvio padrão e teste de contingência, sendo significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se o risco de cair em idosos, para

antes da intervenção para médio risco (n=28; 70%) e, para depois da intervenção, baixo risco (n=39; 97,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se maior desvio padrão para antes (22,23) relativamente à depois (13,65), indicando maior dispersão de valores antes da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência sendo significativo $p < 0,0001$. Os resultados indicam uma relação altamente significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do risco de queda.

INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?

PEREIRA, Eugênia Aires*; LIRA, Marcela de Araújo; FERREIRA, Patricia Rodrigues;
SILVA, Joice Penha; NASCIMENTO, Leia Ribeiro

Orientador: DIAS, Rosane da Silva

Co-Orientador: CARVALHO, Laise Neves

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: eugeniaapereira@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar as informações sobre comportamento de risco para saúde entre graduandos de saúde uma universidade privada de São Luís. A adoção de comportamentos de risco à saúde como inatividade física, fumo, dieta inadequada e abuso de bebidas alcoólicas é responsável por uma parcela significativa de mortes prematuras, sendo o conhecimento a melhor forma de prevenção. Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, realizado no período entre abril e agosto de 2013 na Universidade Ceuma. Foram incluídos no estudo 354 discentes da área de saúde de ambos os sexos, com idade entre 18 e 28 anos, regularmente matriculados em períodos com disciplinas teóricas. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para o Brasil. Na comparação do conhecimentos dos alunos dos diversos cursos foi utilizado o teste Qui-Quadrado interpretado ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA com parecer 372.391. Os alunos que mais relataram informações sobre comportamento de risco para saúde foram os de medicina ($p < 0,01$), perdendo apenas para enfermagem no que alude a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (79,2%) e a gravidez (66,7%), para o curso de nutrição no que se refere a dados dietéticos e nutricionais (71,9%) e para o curso de educação física nas informações sobre atividade física (78,6%). Existem deficiências relacionadas aos conhecimentos sobre comportamento de risco entre os diferentes cursos de saúde.

RISCO CARDIOVASCULAR DE IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO

FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento*; CÂMARA, Thalita De Albuquerque Veras; DUTRA, Adriana Dos Santos;
MORAES, Florinda Maria De Freitas; SILVA, Juliana Moreira Da; BARBOSA, José Bonifácio; SOUSA, Rosângela Maria Lopes De

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: suzanne.carolyne@hotmail.com

Objetivos Comparar os dados antropométricos de risco cardiovascular de idosos praticantes de atividade física (PAF) e não praticantes de atividade física (não-PAF) atendidos em ambulatório cardiológico. Estudo transversal, realizado com população idosa, > 60 anos, atendida em ambulatório de cardiologia de São Luís -MA. Foi avaliado o índice de conicidade (IC), seguindo o ponto de corte de 1,18 para mulheres e 1,25 para homens como discriminador de risco cardiovascular elevado, a circunferência da cintura (CC), a razão cintura/estatura (RCEst) e o índice de massa corporal (IMC). As variáveis foram comparadas pelo teste t de Student. A relação entre o IC e as variáveis foi estimada através da correlação de Pearson (r), adotando-se o nível de significância de 5% ($p < 0,05$) para ambos. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº 33104- 0241. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram incluídos 116 pacientes, com média de idade de $68,7 \pm 7,34$ anos. Não foram encontradas diferenças com significância estatística entre os grupos para o IMC ($p = 0,068$), IC ($p = 0,542$), RCEst ($p = 0,239$) e CC ($p = 0,407$). Na análise de correlação de Pearson os dados demonstraram correlação positiva e significativa entre os indicadores antropométricos, no entanto a maior correlação foi entre a CC e o RCEst ($p < 0,05$; $r = 0,924$). Quanto ao risco cardiovascular avaliado entre os grupos, percebeu-se que não houve diferença significativa entre as variáveis. Ao serem comparadas entre si, as variáveis apresentam correlação positiva e significativa

CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO

FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento*; CÂMARA, Thalita De Albuquerque Veras; MORAES, Florinda Maria de Freitas; SANTOS, Alexsandro Ferreira dos; SILVA, Juliana Moreira Da; BARBOSA, José Bonifácio; SOUSA, Rosângela Maria Lopes De

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: suzanne.carolyne@hotmail.com

Verificar relação do índice de conicidade (IC) com os níveis pressóricos para risco cardiovascular elevado em mulheres adultas assistidas em ambulatório de cardiologia. Estudo transversal, realizado com população feminina adulta, maior ou igual a 20 anos, atendidas em ambulatório de cardiologia de um hospital de São Luís -MA. Foi avaliado o IC, seguindo o ponto de corte de 1,18 para mulheres como discriminador de risco cardiovascular elevado e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Foi utilizada a correlação de Pearson entre IC, PAS e PAD com nível de significância de 5%. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob o nº 33104- 0241. O grupo de estudo (n=372) apresentou idade média de $35,6 \pm 11,34$ anos. O valor encontrado da média do IC foi de $1,25 \pm 0,11$, onde 20,7% da população encontram-se dentro dos padrões de normalidade e 79,3% com IC elevado. A média da PAS foi de $116,14 \pm 16,88$ mmHg e PAD de $75,41 \pm 10,15$ mmHg. Tanto o IC com a PAS ($r=0,219$; $p<0,001$), quanto o IC com a PAD ($r=0,172$; $p=0,001$) apresentaram correlação positiva. Constatou-se que a população estudada em sua maioria possui risco cardiovascular elevado a partir do IC. Apesar da correlação entre as variáveis ter sido pequena, o valor da análise estatística foi significativo, indicando que à medida que o IC aumenta a PA também o acompanha

AValiação IN VITRO DA RESISTÊNCIA ADESIVA DE NOVO SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL

DINIZ, Ana Carolina Soares*

*1 Universidade CEUMA

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: carol_diniz5@hotmail.com

Avaliar in vitro a resistência adesiva de um novo sistema adesivo universal ao esmalte dental em relação aos sistemas autocondicionante e convencional. Foram utilizadas as metades mesial e distal de 35 incisivos bovinos, hígidos, recém-extraídos que foram divididos em 5 grupos experimentais (n=13). O esmalte dental foi tratado de acordo com as seguintes condições experimentais; G1- Sistema Universal (SU) - Futurabond U (VOCO) com condicionamento ácido; G2 - SU - Futurabond U (VOCO) sem condicionamento ácido; G3 - Sistema Convencional (SC) - Adper Single Bond 2 (3M); G4 - Sistema Autocondicionante (SA) - Clearfil SE Bond (KURARAY) com condicionamento ácido; G5 - SA - Clearfil SE Bond (KURARAY) sem condicionamento ácido. Os corpos-de-prova foram confeccionados utilizando a resina composta TPH spectrum (Dentsply), e armazenados em água destilada ($37 \pm 1^\circ\text{C}$) por 1 mês. O teste de microcisalhamento foi realizado utilizando a máquina de ensaio universal EMIC DL 2000 a 0,5 mm/min. Os valores de resistência adesiva foram analisados utilizando os testes estatísticos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney com conseqüente correção de Bonferroni. Observou-se diferença estatística significativa entre os grupos estudados ($p<0,05$), onde G1 ($36,83 \pm 4,9$ Mpa) apresentaram os maiores valores e G5 ($23,73 \pm 3,5$ MPa) os menores valores de resistência adesiva. A análise da interface adesiva revelou que grande parte das falhas ocorreu entre a interface resina composta/adesivo. A resistência adesiva do sistema adesivo universal utilizado no esmalte dental foi maior quando comparada aos demais sistemas adesivos, sendo que a prévia realização do condicionamento ácido no sistema universal e no autocondicionante promoveram maiores valores de resistência adesiva.

IMPACTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES

DUAILIBE, Lara Ribeiro Feitosa*; SILVA, Marcos José Custódio Neto; SOUSA, Bruna Milhomens; MELO, Thayna Lima; CAMPELO, Ricardo Gabriel Calvet; PEREIRA, Adriana de Fátima Vasconcelos.

Curso: Odontologia

*Universidade Federal do Maranhão - UFMA

Categoria: Graduação

Email: larinha_duailibe@hotmail.com

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de sensibilidade dentinária e o impacto do tratamento periodontal não cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes da clínica de Periodontia-UFMA. Foi aplicado o índice OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) em 36 pacientes, de ambos os sexos, 18 a 59 anos, para caracterizar o impacto na saúde bucal em fraco (0 a 9), médio (10 a 18) e forte (19 a 28). Foram avaliados os parâmetros: índice de placa, sangramento gengival, profundidade de sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, mobilidade dentária, envolvimento de furca e perda dentária. Para avaliar a sensibilidade dentinária, foi utilizado um explorador dental nº5 e spray ar-água, estabelecendo-se de 0 a 10 para a intensidade da dor referida pelo paciente: nenhuma/leve (0 a 3), moderada (4 a 6) e severa (7 a 10). A sensibilidade dentinária esteve presente em 18 pacientes (50%), cujos pré-molares foram os mais atingidos (55,55%) com estreita relação à recessão gengival. Percebeu-se que a maioria da amostra (86,1%) foi impactada em alguma intensidade. Contudo, nenhum paciente obteve valor de OHIP-14 forte, ficando a amostra composta apenas por impacto fraco (75%) e médio (25%). Após o tratamento, houve melhora do diagnóstico periodontal em 42,86% dos pacientes. O índice OHIP-14 foi reaplicado ao final do tratamento, resultando em redução do impacto em 100%. Conclui-se que a sensibilidade dentinária foi mais prevalente quando associada à recessão gengival e que houve uma influência positiva do tratamento periodontal não cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes.

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: IMPACTO NO CPO-D AOS 12 ANOS

CARVALHO, Guilherme Larilho De Sena*; JÚNIOR, Webster Silva Castro;
MOUCHREK, Monique Maria Melo; DA SILVA, Mariana Carvalho Batista

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: guilhermelarilho@hotmail.com

A estratégia em Saúde da Família (ESF) vem se mostrando como uma estratégia de reestruturação da atenção básica, tendo como objetivo principal a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Considerando que a saúde bucal é um componente fundamental e indissociável da saúde geral do indivíduo, portanto faz parte da Atenção Básica (AB). Somente após 4 anos da incorporação da equipe de saúde bucal no ESF foi lançado o Programa Brasil Sorridente definido oficialmente como uma política pautada no documento 'Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal'. Em meio à necessidade e o interesse em avaliar os resultados alcançados em relação à organização e provisão dos serviços, é lançado mão dos índices de saúde, sendo o CPO-D aos 12 anos o de escolha, pois considera a experiência presente e passada do ataque da cárie dental à dentição permanente. Com base no exposto, o presente trabalho tem por finalidade descrever a distribuição das equipes de Saúde bucal na estratégia de saúde da família nas macro-regiões brasileiras e impacto do crescimento no CPO-D aos 12 anos. Pesquisa descritiva com consulta ao banco de dados do Departamento de Atenção Básica (<http://dab.saude.gov.br/portaldab/siab.php>) e resultados do SB 2010—Pesquisa Nacional de Saúde Bucal e Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003. Foi possível observar que houve um aumento numérico das ESB em todas as regiões, assim como uma diminuição no CPO-D. Podemos concluir com isso, que o aumento das ESB impactou de maneira positiva para a diminuição do CPO-D.

DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.

MARTINS, Ana Carla Privado*; PACHECO, Ivaniilde Cordeiro; CECÍLIA, Jéssica;
LILI, Silvia Di; SANTOS, Verianne; VASQUES, Júlia Soares; MACHADO, Patrícia

Categoria: Graduação

Curso: Psicologia

Email: ana.cpmartins@hotmail.com

A intenção desse projeto de intervenção psicossocial foi a realização de uma experiência terapêutica aplicada pelos alunos do curso psicologia da Universidade CEUMA do 6º período, com mulheres dependentes químicas da Comunidade Terapêutica no município de São Luís – MA. A intervenção psicossocial tem um caráter de pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, organizações e/ou comunidade (Neiva, 2010). O objetivo deste trabalho consiste em contribuir para o resgate de suas histórias de vida, o autoconhecimento, bem estar, promoção da cidadania, e a viabilização da manutenção dos seus laços sociais. Assim, entendemos que a realidade dessas mulheres aponta para uma necessidade de práticas terapêuticas capazes de atender a tais pressupostos. Foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica, o levantamento das necessidades das internas através de pesquisa semi-estruturada e a intervenção, que foi realizada utilizando como instrumentos terapêuticos, algumas técnicas de dinâmicas de grupos auxiliadas por

recursos audiovisuais. Após a intervenção, foi observado que elas estavam à vontade, o que as incentivou a relatarem de forma verbal e escrita, através de registros de desenhos, o que sentiam, falando sobre suas dificuldades, compartilhando ideias e, refletindo acerca de suas histórias de vida. Expressaram-se muito esperançosas e confiantes, afirmando o desejo de profissionalizarem-se e reconstruírem suas famílias. Portanto, diante do que foi proposto, a presente intervenção promoveu que essas mulheres desenvolvessem alguma percepção sobre si mesmas, lançando um olhar para o futuro com mais expectativas, sonhos e projetos, além de possibilitar reflexões sobre os seus direitos de cidadania.

PERFIL DE HIGIENE BUCAL DE CUIDADORES DE PNE

SILVA, Bruna Leticia Rosa da*; SANTOS, Marcela de Jesus Castro; PIAZERA, Cyrene

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: brunarosa_sl@hotmail.com

Essa pesquisa propôs avaliar o perfil higiene bucal dos cuidadores dos alunos com necessidades especiais durante a 2º e 3º semana do mês de agosto de 2008, no âmbito da escola Eney Santana mantida pela Associação de Pais e Amigos dos excepcionais (APAE) em São Luís - MA, por meio de um questionário e avaliação clínica de higiene bucal, através do índice de higiene bucal simplificado (IHOS). Para análise dos dados foi utilizado o SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences), para obtenção de médias e proporções. Observou-se que há uma prevalência entre os cuidadores, do gênero feminino, mães, entre os 31 e 40 anos com o ensino médio completo e renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos. Os mesmos não possuíam halitose, nem sangramento gengival, como também que já tinham recebido informações sobre como realizar a sua higiene bucal. Eles geralmente utilizavam apenas escova e creme dental, durante 1 a 3 minutos, 2 vezes ao dia; sua higiene bucal era muito deficiente. Conclui-se que o cuidador deve ser incluído no programa de atendimento ao paciente de necessidades especiais.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM HIPERFOSFATEMIA EM HEMODIÁLISE

MESQUITA, Patrícia de Souza; SOUSA, Jaicara Melo de Araújo; JARDINS, Ana Tamires; C

OSTA, Gilmara de Sousa da; RABÊLO, Nara Lídia Diniz; ROCHA, Marina de Souza; HORTEGAL, Elane Viana

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

Email: patricia.smesquita@hotmail.com

Apesar dos avanços no tratamento da DRC, a morbimortalidade continua elevada, causada, entre outros fatores, pelo quadro de hiperfosfatemia, comum nos pacientes em hemodiálise. A intervenção e o acompanhamento nutricional são necessários e fazem parte do tratamento do paciente hiperfosfatêmico em hemodiálise. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da intervenção nutricional em pacientes hiperfosfatêmicos em hemodiálise. Trata-se de um estudo prospectivo não controlado, no qual foram avaliados pacientes em programa regular de hemodiálise em uma clínica especializada do município de São Luís – MA. Para efeito do estudo foi utilizada amostra de conveniência. Constituíram a casuística os pacientes em programa regular de hemodiálise que apresentaram média de concentração de fósforo superior a 5,5mg/dL nos três meses que antecederam a intervenção e com idade igual ou superior a 20 anos. Os pacientes hiperfosfatêmicos responderam um questionário contendo perguntas fechadas para avaliar o conhecimento sobre o fósforo e coletaram-se resultados dos exames laboratoriais para avaliar o nível sérico do fosforo antes e após a intervenção. A média da concentração sérica de fósforo dos pacientes que receberam orientação nutricional diminuiu de 6,37 (± 1,13) mg/dL para 5,51 (± 1,03) mg/dL e a quantidade de pacientes com fósforo alterado foi reduzida a metade, após a intervenção nutricional. Os resultados sugerem a importância do nutricionista na promoção da educação nutricional dos pacientes de forma a contribuir com o tratamento da hiperfosfatemia.

CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA COMPARADO AO DE OUTROS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER .

MORAES, Florinda Maria De Freitas*; DUTRA, ValériaBogéa; SILVA, Juliana Moreira da;

FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento; CHEIN, Maria Betânia da Costa; DOS SANTOS, Alexsandro Ferreira

Categoria:Graduação

Curso:Nutrição

Email:florindaaflor@hotmail.com

Objetivos: Avaliar o consumo alimentar de pacientes com câncer de mama comparado ao consumo de pacientes com outros diagnósticos de câncer. **Métodos:** Estudo transversal, caso-controle, analítico, realizado com a população feminina, com idade > 18 anos, em hospital oncológico de referência de São Luís-MA. O consumo alimentar foi avaliado por um questionário de frequência alimentar quantitativo. Utilizaram-se os valores recomendados pelas Dietary Reference Intakes para avaliar a ingestão de macronutrientes utilizando-se os intervalos aceitáveis para a sua distribuição: 45-65% (carboidratos), 10-35% (proteínas) e 20-25% (lipídios totais). Para a comparação das médias do consumo alimentar entre os grupos foi utilizado o teste “t” de Student ($p < 0,05$). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, parecer de nº 566.333. **Resultados:** Da população estudada ($n=50$), 26 apresentaram diagnóstico de câncer de mama e 24 outros diagnósticos de câncer, a idade média foi de $43,53 \pm 10,61$ anos. O consumo energético para os pacientes com câncer de mama e a distribuição dos macronutrientes foi respectivamente $938,28 \pm 267,61$ kcal e $905,01 \pm 309,71$ kcal ($p= 0,663$), $52,81 \pm 7,24$ e $51,85 \pm 8,29\%$ para carboidratos ($p= 0,64$), $17,61 \pm 1,83$ e $18,91 \pm 3,87\%$ para proteínas ($p= 0,098$) e $30,30 \pm 7,19$ e $29,79 \pm 5,76\%$ para lipídios ($p= 0,771$). **Conclusão:** O consumo de macronutrientes quanto suas distribuições mostrou-se adequado em relação às recomendações em ambos os grupos. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes quanto ao consumo de energia e macronutrientes entre os grupos de mulheres com câncer.

CORRELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM INDICADORES DE ADIPOSIDADE E EM MULHERES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA.

MORAES, Florinda Maria de Freitas*; SILVA, Juliana Moreira da; FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento; CÂMARA, Thalita de Albuquerque Veras; DOS SANTOS, Alexsandro Ferreira; BARBOSA, José Bonifácio

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

Email: florindaaflor@hotmail.com

Objetivos: Correlacionar diferentes indicadores de adiposidade com a pressão arterial em mulheres atendidas em ambulatório de cardiologia.

Métodos: Estudo transversal, composto por pacientes do sexo feminino, adultas, idade igual ou superior a 20 anos, realizado em um ambulatório particular de cardiologia em São Luís-MA. Os indicadores antropométricos utilizados foram índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e razão cintura/estatura (RCEst) e dados clínicos como pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Na análise da relação entre as variáveis do estudo, foi utilizada a correlação de Pearson adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob o nº 33104-0241/2007, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. **Resultados:** Foram incluídos 372 pacientes, o IMC de 35,75% das mulheres foi superior a $24,9$ kg/m² indicando excesso de peso. Em relação a CC e RCEst, 31,45% apresentaram $CC \geq 80$ cm e 52,69%, $RCEst \geq 0,53$ representando risco elevado para doenças cardiovasculares. Na análise de correlação de Pearson, os dados demonstraram correlação positiva entre os níveis de PAS e PAD e as variáveis IMC ($r= 0,386$ e $r= 0,427$), CC ($r= 0,387$ e $r= 0,381$) e RCEst ($r= 0,367$ e $r= 0,372$) com nível de significância de $p < 0,001$ para todas as correlações. **Conclusão:** Verificou-se que os indicadores IMC, CC e RCEst estão positivamente correlacionados com a elevação da pressão arterial, sinalizando a influência dos indicadores de adiposidade avaliados na pressão arterial.

FATORES ASSOCIADOS A PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES COM RIZOGENESE INCOMPLETA: ANÁLISE RETROSPECTIVA

SILVA, Fabíola Ayane Costa*; FERREIRA, Meire Coelho; FERREIRA, Meire Coelho

Categoria: graduação

Curso: odontologia

Email: fafa_ayane@hotmail.com

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de primeiros molares permanentes com rizogênese incompleta e fatores associados, em crianças entre 5 e 14 anos de idade, com base em arquivos de radiografias da Clínica de Odontopediatria da UNICEUMA. O estudo é transversal, do tipo retrospectivo. Foram utilizados 119 prontuários. Um total de 476 radiografias da região de primeiros molares permanentes foram avaliadas. Quatrocentos e setenta e três molares estavam presentes. A variável dependente foi rizogênese incompleta e as variáveis independentes foram gênero, idade, dente hígido, dente cariado sem envolvimento pulpar, dente cariado com envolvimento pulpar, dente restaurado, dente

pulpotomizado e dente pulpectomizado. Foi realizada análise estatística descritiva e inferencial (teste c2), ao nível de significância de 5%. Dos 161 prontuários analisados, 42 (26,09%) foram excluídos (pacientes na dentição decídua) perfazendo, assim, um total de 119 avaliados (73,91%). Dois primeiros molares permanentes com rizogênese incompleta apresentaram envolvimento pulpar (1,6%). Dente hígido e cariado, e sem envolvimento pulpar, foram associados significativamente com rizogênese incompleta. Com base nos achados, é possível concluir que dentes imaturos podem ser comprometidos precocemente por lesões cáries, o que requer o cuidado do profissional e dos pais no sentido de prevenir o acometimento desses dentes pela doença cárie.

CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO.

FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento*; SILVA, Juliana Moreira da;
MORAES, Florinda Maria De Freitas; CÂMARA, Thalita De Albuquerque Veras;
SANTOS, Alexsandro Ferreira Dos; DE SOUSA, Rosângela Maria Lopes; BARBOSA, José Bonifácio

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: suzanne.carolyne@hotmail.com

Verificar relação do índice de conicidade (IC) com os níveis pressóricos para risco cardiovascular elevado em mulheres adultas assistidas em ambulatório de cardiologia. Estudo transversal, realizado com população feminina adulta, maior ou igual a 20 anos, atendidas em ambulatório de cardiologia de um hospital de São Luís-MA. Foi avaliado o IC, seguindo o ponto de corte de 1,18 para mulheres como discriminador de risco cardiovascular elevado e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Foi utilizada a correlação de Pearson entre IC, PAS e PAD com nível de significância de 5%. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob o nº 33104- 0241.

Resultados: O grupo de estudo (n=372) apresentou idade média de $35,6 \pm 11,34$ anos. O valor encontrado da média do IC foi de $1,25 \pm 0,11$, onde 20,7% da população encontram-se dentro dos padrões de normalidade e 79,3% com IC elevado. A média da PAS foi de $116,14 \pm 16,88$ mmHg e PAD de $75,41 \pm 10,15$ mmHg. Tanto o IC com a PAS ($r= 0,219$; $p<0,001$), quanto o IC com a PAD ($r= 0,172$; $p=0,001$) apresentaram correlação positiva.

Conclusão: Constatou-se que a população estudada em sua maioria possui risco cardiovascular elevado a partir do IC. Apesar da correlação entre as variáveis ter sido pequena, o valor da análise estatística foi significativo, indicando que à medida que o IC aumenta a PA também o acompanha.

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL DE MULHERES FUMANTES

RAMALHO, Dacimar Gomes*; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima Neuenschwander ;
ARAÚJO, Ana Eugênia Ribeiro De Araújo e; BACELAR, Solange Negreiros De Almeida;
MARINHO, Erika Germana Vieira Monteiro; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; MUALEM, Michelle Villas Boas

Curso: Estética

Categoria: Graduação

Email: dacimargomes@gmail.com

O envelhecimento facial cutâneo é um processo multifatorial, que ocorre de maneira gradativa e se divide em dois tipos: cronológico (intrínseco) e fotoenvelhecimento (extrínseco), e os cofatores ambientais mais importantes para esse processo são o sol e o cigarro, respectivamente. As modificações estruturais decorrentes do envelhecimento cronológico podem ser tratadas ou adiadas com uso de cosméticos tópicos à base de vários ativos, destacando-se o ácido hialurônico. O presente trabalho objetiva avaliar os efeitos do ácido hialurônico no rejuvenescimento facial de mulheres fumantes, verificar sua atuação na hidratação da pele, comparando seu efeito entre mulheres fumantes e não fumantes. Foi realizado um estudo prospectivo com 14 mulheres, divididas em 02 grupos (7 tabagistas e 7 não tabagistas), com idade entre 35 e 55 anos, com fototipo de pele IV, V e VI. Os dados iniciais foram coletados a partir da avaliação da pele feita através da ficha de anamnese e em seguida disponibilizado um kit contendo sabonete, creme com ácido hialurônico e filtro solar. As voluntárias foram orientadas para o uso contínuo dos cosméticos em suas residências. As avaliações independentes deram-se através da análise do questionário de auto-avaliação. Entre os resultados, 50% das voluntárias consideraram melhoria das linhas de expressão e rugas e 100% delas ficaram satisfeitas com a hidratação, além de melhorias na textura, brilho e maciez. O ácido hialurônico, tratando de prevenção ou tratamento do envelhecimento facial cutâneo, mostrou portanto ter efeito benéfico para o rejuvenescimento facial proporcionando tonicidade e elasticidade à pele.

HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

COLINS, Samara Pereira*; ARAÚJO, Patrícia Helena Pereira Almeida; FERREIRA, Meire Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: samara_odontologia@hotmail.com

Os hábitos bucais nocivos em crianças podem alterar o desenvolvimento e crescimento dos maxilares, interferir diretamente na configuração dos arcos dentários, nas funções de fala, mastigação, deglutição e respiração, assim como provocar problemas estéticos. Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de hábitos bucais deletérios em pacientes atendidos nas clínicas de Odontopediatria da Universidade Ceuma. A amostra foi composta por 200 fichas clínicas de pacientes com idades entre 6 e 12 anos, documentadas no período de agosto/2012 a junho/2014. Para análise dos resultados, estatística descritiva e testes χ^2 , exato de Fisher e χ^2 de tendência linear foram realizados. Das 200 crianças avaliadas, 105 constaram do sexo feminino e 95, masculino. Noventa e três por cento das crianças apresentaram hábitos bucais deletérios, os quais se mostraram mais prevalentes nas do sexo feminino e para a idade de 6 anos. O hábito de roer unhas foi verificado em 52,0% da amostra, morder objetos em 30,5% e ranger os dentes em 27,5%. Desmame precoce foi associado significativamente com os hábitos de sucção digital ($p < 0,001$) e ranger os dentes ($p < 0,001$), tendo também influenciado na duração do uso da mamadeira ($p < 0,001$). Já o hábito de morder objetos teve associação significativa com o tipo de respiração ($p = 0,001$). Com base nos achados, conclui-se que alguns hábitos bucais deletérios apresentam alta prevalência na Clínica de Odontopediatria, justificando a necessidade de estratégias educativas serem enfatizadas sistematicamente junto ao público alvo e seus responsáveis.

MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO UTERINO EM SÃO LUÍS-MA

LEMOS, Ingrid Gonçalves de*; MONTEIRO, Patrícia Daiana de Farias;

SANTOS, Glauciane Lima dos; ARAÚJO, Jessica Mayara Mendes; ARANHA, Anieli Sila;

CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e; NORONHA, Francisca Maria de Ferreira

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: ingrid_g.lemos@hotmail.com

Mundialmente, o câncer de colo uterino promove um elevado índice de mortalidade entre mulheres. O estudo em pauta teve por objetivo estudar a ocorrência de óbitos de mulheres por câncer de colo de útero em São Luís -MA. Realizou-se uma pesquisa de caráter retrospectivo descritivo, com abordagem quantitativa de dados. A população de estudo correspondeu a todos os casos de morte por câncer de colo uterino ocorrido no ano de 2007 e 2008, totalizando 41 casos registrados no SIM-Sistema de Informação de Mortalidade e no serviço de vigilância de óbitos de, bem como no Comitê de Mortalidade Materna do Município de São Luís -MA. Diante dos resultados, verificou-se que a maioria das mulheres estava na faixa etária de 31 a 41anos (51,22%); 63,41% possuíam o ensino fundamental; 63,41 eram solteiras; 53,66 eram pardas; 46,34%, exercia a profissão "do lar"; 76,93% apresentaram complicações por metástase generalizada. Observou-se com o estudo a necessidade de uma melhor avaliação nas políticas do sistema de saúde, no sentido de alcançar melhores coberturas do exame citológico e com diagnósticos mais precoces capazes de impactar na mortalidade, com intuito de minimizar os óbitos ocasionado por essa neoplasia

PERFIL DOS PORTADORES DA TUBERCULOSE QUE ABANDONAM TRATAMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SÃO LUÍS – MA

CARNEIRO, Josiane Araújo*; ALMEIDA, Tatiana; ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira;

SANTOS, José Nazareth Barbosa Filho; SILVA, Ronald; SANTOS, Nailde Melo

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: naildems@terra.com.br

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, as condições de vida da população estão intimamente ligadas à propagação do bacilo. Seu contágio ocorre por via oral, ao tossir, espirrar ou falar, por meio de gotículas contendo bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar. Objetivou-se conhecer o perfil dos portadores da tuberculose que abandonaram o tratamento em hospital especializado em São Luís – MA. Estudo explo-

ratório-descritivo com levantamento de dados de janeiro de 2011 a janeiro de 2013. Na coleta de dados, utilizou-se uma ficha para consulta nos prontuários dos pacientes, de acordo com os objetivos propostos. Constatou-se que o abandono do tratamento ocorreu com maior percentual na população masculina (63%), na faixa etária de 30 a 59 anos (53%), (40%) tinha ensino fundamental incompleto, renda inferior a um salário mínimo (49%), sem ocupação (58%), com esquema I de tratamento (96%) e sorologia anti-HIV positiva em (42%). Verificou-se que múltiplos fatores determinaram o abandono do tratamento da tuberculose apresentando interdependência de ações relacionadas à AIDS ou à TB no campo político e técnico. As abordagens do tratamento devem constituir-se através das organizações governamentais e não governamentais relacionadas à AIDS e TB, diagnosticando o maior número de pessoas infectadas pelo HIV, objetivando a contenção e disseminação de ambas as doenças.

PREVALÊNCIA DE LESÕES OSTEOMUSCULARES NA COLUNA VERTEBRAL EM MULHERES BENEFICIADAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 2008 A 2012

FERREIRA, Raissa Andrêssa Pereira*; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar;

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: raissaandressa@yahoo.com.br

Estimar prevalência de lesões osteomusculares na coluna vertebral em mulheres beneficiadas pela Previdência Social no período de 2008 a 2012. **Materiais e métodos:** realizou-se um estudo retrospectivo, descritivo de delineamento transversal, em que foram coletadas informações das mulheres beneficiadas pela Previdência Social, cadastradas no banco de dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). As variáveis coletadas foram: nome, data de nascimento, idade, município e CID (Classificação Internacional das Doenças). A análise estatística foi realizada através da planilha eletrônica da Microsoft Office Excel 2013 para elaboração de gráficos. **Resultados:** a amostra fornecida pelo Banco de Dados do INSS foi de 1398 mulheres, todas residentes de São Luís -MA. A prevalência de lesões osteomusculares na coluna vertebral na amostra foi de 32%. A lesão osteomuscular mais predominante da coluna vertebral foi a dor lombar, com 41% dos casos. As mulheres estavam na faixa etária entre 18 e 69 anos, na amostra desse estudo a prevalência maior está entre 41 a 50 anos (32%). **Conclusão:** o estudo mostrou que a coluna vertebral é um dos segmentos mais acometidos por patologias osteomusculares, com predomínio da dor lombar, a idade pode ser um dos fatores associados a essa prevalência, assim como também o fato da mulher estar vivendo uma dupla jornada de trabalho.

INTERAÇÕES FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES ANTISSOCIAIS DE COMPORTAMENTO

ROMA, Lígia Fernanda Nascimento*; AZEVEDO, Yanne Luna de

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: roma.fernanda@gmail.com

As relações parentais foram enfatizadas neste trabalho, visto que essas interações podem proporcionar a manutenção de comportamentos adequados ou não. Dentre os comportamentos inadequados influenciados pelo ambiente familiar, foram selecionados para análise os padrões antissociais de comportamento, caracterizados pelas manifestações comportamentais agressividade, conduta delitativa, oposicionismo. Todavia, a perspectiva analítico-comportamental adotada para a compreensão do comportamento antissocial no presente trabalho, considera-o resposta ao contexto onde o indivíduo está inserido, sendo explicado pelos níveis de variação e seleção, necessitando da investigação da história de vida da criança para identificação dos fatores a ela relacionados, dentre eles as interações parentais. Essa pesquisa trata-se de um estudo de caso envolvendo uma mãe cujo filho do sexo masculino com nove anos de idade apresenta protótipos de comportamento antissocial (agressividade, birras). A pesquisa enfatiza a investigação das Habilidades Sociais Educativas Parentais, pois esta análise permite a observação das práticas parentais mais frequentes no caso analisado, buscando a identificação de um estilo parental e apontando relações entre este estilo e padrões antissociais. Como instrumento, utilizou-se o Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais. Os resultados demonstraram déficit habilidades sociais em mãe e filho, uso frequente de práticas coercitivas de educação, escore clínico para problemas de comportamento infantil e classificação em estilo parental autoritário da interação materna. Intervenções que possibilitem o aumento de habilidades sociais na criança e na mãe e a orientação parental visando à diminuição das práticas educativas negativas são consideradas eficazes para a promoção da qualidade na relação parental e desenvolvimento satisfatório da criança.

AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DOS MÉDICOS NO USO DE VASOCONSTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS.

CORTEZ, GUILHERME DE AZEVEDO*; SANTOS, Mayanne Squeira

Orientador: MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: guicortez@gmail.com

Atualmente no mercado brasileiro existem diversas soluções anestésicas em diferentes concentrações de vasoconstritores e outros componentes. Diante disso muitos obstáculos são criados por falta de conhecimento quanto sua utilização em pacientes cardiopatas. Este trabalho pretende expor a carência de conhecimento médico no que diz respeito ao parecer em relação aos vasoconstritores e pacientes cardiopatas, além de buscar uma forma de conciliar o uso dessas soluções nestes pacientes a fim de conseguir segurança e eficácia sem interferência no tratamento ou riscos a vida do indivíduo. Respaldados pela revisão literária pode-se concluir que anestésicos com vasoconstritores podem ser empregados adequadamente em diversos pacientes inclusive nos cardiopatas se feitos respeitando as condições sistêmicas e realizando uma correta anamnese por parte do profissional, afim de selecionar as corretas concentrações e posologias das soluções anestésicas. Esta pesquisa visa avaliar uma amostra de 100 médicos maranhenses por meio de questionários aplicados. Foi observado a falta de conhecimento dos mesmos quando confrontados à literatura, visto estudos mais recentes realizados.

PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM

AQUINO, Tiago da Conceição*; CARVALHO, Lara Regina do Nascimento de; GOMES, Rosângela Alves Moraes Gereissat; SOUSA, Vanessa Patricia Lima; SANTOS, Glauciane Lima dos

Orientador: CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho

Co-Orientador: NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Categoria: Graduação

Curso: Enfermagem

E-mail: aquino.tiago88@hotmail.com

O paciente portador do Diabetes Mellitus (DM) tem vida delimitada para usufruir algumas regalias, necessitando mudar seu estilo de vida, e ter consciência de que a doença necessita de cuidado integral. A adoção de um estilo de vida apropriado, com a prática regular de atividades físicas e a ingestão de dieta adequada, é praticamente duas vezes mais efetiva que o tratamento farmacológico no controle do DM. O objetivo do estudo foi conhecer o perfil dos pacientes diabéticos atendidos na consulta de Enfermagem do Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo no município de São Luis - MA. Estudo de caráter descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, cuja amostra foi composta por 70 pacientes diabéticos. Utilizou-se um questionário com perguntas fechadas contendo informações referentes a dados socioeconômicos, conhecimento sobre a patologia e fatores de risco associados ao Diabetes Mellitus. Constatou-se que 45,71% pacientes tinham mais de 60 anos, sendo 61,43% do sexo feminino. O estudo nos mostra que ainda existe analfabetismo no nosso país, de modo que foi encontrado 7,15% participantes sem grau de instrução. Quanto ao estado civil desses participantes, 65,71% são casados e 77,14% apresentam renda salarial entre 1 a 2 salários mínimos. O estudo evidencia que os participantes pesquisados tem conhecimento sobre a doença que é acometido e entendem que a educação em diabetes é parte imprescindível do tratamento, associado ao controle metabólico adequado, atividade física e dieta.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Perfil. Cuidados. Conhecimento.

PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MOTORAS EM ADULTOS PORTADORES DE HANSENÍASE ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM SÃO LUÍS – MA

SOARES, Taniela Maria Ferraz*; NASCIMENTO Ana Lourdes Avelar

Orientador: NASCIMENTO Ana Lourdes Avelar

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: alei_nat@hotmail.com

Estimar a prevalência de disfunções motoras em adultos portadores de Hanseníase atendidos uma unidade de saúde especializada em São Luís – MA. **Materiais e métodos:** Realizou-se um estudo do tipo descritivo e transversal, em que foram revisados os prontuários de pacientes atendidos no período de setembro de 2012 à setembro de 2013, buscando dados como: idade, gênero, forma clínica, segmento de maior comprometimento funcional, grau de comprometimento funcional, tempo de tratamento (classificação operacional). Inicialmente foi realizada uma análise descritiva. A análise estatística foi obtido e organizada em planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2007 para elaboração dos gráficos e tabelas. **Resultados:** Foram encontrados um total de 121 prontuários, onde não houve uma diferença significativa entre homens e mulheres diagnosticados com hanseníase, com 60 (49,59%) e 61 (50,41%), respectivamente. 111 (90,90%) dos pacientes são residentes no município de São Luís –MA. Com relação às formas clínicas da Hanseníase, a maioria dos pacientes apresentou a forma clínica Dimorfa (59,50%), seguido da forma Virchowiana (27,27%), Tuberculóide com (10,75%), e Indeterminada (2,48%) e no grau de incapacidade destacou-se o Grau 1 onde houve a diminuição e/ou perda da sensibilidade e o segmento de maior comprometimento funcional foi em MMII (membros inferiores) com 52 pacientes. **Conclusão:** No estudo presente, foi concluído que, os pacientes hansenianos atendidos em uma unidade de saúde especializada em São Luís – MA, são predominantemente do sexo feminino, na sua maioria trabalhadoras domésticas, foram pacientes prevalentes do município de São Luís, com faixa etária acima dos 31 anos. Houve prevalência da forma clínica Dimorfa, apresentando o Grau 1 de incapacidade funcional com os MMII mais acometidos.

AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA DE JOVENS ESCOLARES: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRATICANTES DE BASQUETE E NATAÇÃO

MONTEIRO, Thiago Carvalho*

Orientador: NUNES, Luiz Alexandre de M.

Categoria: Graduação

Curso: Educação Física

E-mail: tcarvalhom@yahoo.com.br

A adolescência é um período de mudanças biopsicossociais, onde ocorre o aumento da força motora. Dessa forma, é importante avaliar o desempenho motor dos alunos, dentre eles a potência muscular. Assim, o professor pode traçar estratégias para aprimorar o rendimento esportivo e a saúde dos indivíduos. O presente estudo teve por objetivo comparar o desempenho da potência muscular de membros inferiores, em valores absolutos, de escolares que praticam as modalidades de basquete e natação. A amostra foi composta por 24 jovens com treze anos de idade, todos do sexo masculino, sendo doze de cada modalidade. Para coleta de dados foi utilizado o protocolo de salto em distância “parado”, (GUEDES e GUEDES, 2006). A mensuração dos saltos foi feita através de uma trena métrica inelástica da marca Sanny. Os dados coletados foram analisados e comparados através do Teste t de student para amostras independentes, adotando-se nível de significância ($p \leq 0,05$). Foi utilizado o programa estatístico BioEstat, versão 5.3. Os nadadores saltaram em média 1,66m ($\pm 0,14$), enquanto que os praticantes de basquete, 1,76m ($\pm 0,23$). Os resultados mostraram não existir diferença entre os grupos ($p = 0,11$), o que provavelmente pode estar relacionado ao tempo de treino muito reduzido das modalidades. Outras possíveis hipóteses, poderíamos citar os fatores motivação, compreensão do trabalho e nível de maturação sexual dos avaliados.

HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

COLLINS, Samara Pereira*; PHP, Araújo; MC, Ferreira

Orientador: ARAÚJO, Patrícia Helena Pereira Almeida

Co-Orientador: FERREIRA, Meire Coêlho

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: samara_odontologia@hotmail.com

Os hábitos bucais nocivos em crianças podem alterar o desenvolvimento e crescimento dos maxilares, interferir diretamente na configuração dos arcos dentários, nas funções de fala, mastigação, deglutição e respiração, assim como provocar problemas estéticos. Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de hábitos bucais deletérios em pacientes atendidos nas clínicas de Odontopediatria da Universidade Ceuma. A amostra foi composta por 200 fichas clínicas de pacientes com idades entre 6 e 12 anos, documentadas no período de agosto/2012 a junho/2014. Para análise dos

resultados, estatística descritiva e testes χ^2 , exato de Fisher e χ^2 de tendência linear foram realizados. Das 200 crianças avaliadas, 105 constaram do sexo feminino e 95, masculino. Noventa e três por cento das crianças apresentaram hábitos bucais deletérios, os quais se mostraram mais prevalentes nas do sexo feminino e para a idade de 6 anos. O hábito de roer unhas foi verificado em 52,0% da amostra, morder objetos em 30,5% e ranger os dentes em 27,5%. Desmame precoce foi associado significativamente com os hábitos de sucção digital ($p < 0,001$) e ranger os dentes ($p < 0,001$), tendo também influenciado na duração do uso da mamadeira ($p < 0,001$). Já o hábito de morder objetos teve associação significativa com o tipo de respiração ($p = 0,001$). Com base nos achados, conclui-se que alguns hábitos bucais deletérios apresentam alta prevalência na Clínica de Odontopediatria, justificando a necessidade de estratégias educativas serem enfatizadas sistematicamente junto ao público alvo e seus responsáveis.

DESCONFORTO FÍSICO EM CUIDADORES DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS

FONSECA, Hayanna Souza*; CARVALHO, Laise Neves

Orientador: ALMEIDA, Natalia Gaspar

Co-Orientador: CARVALHO, Laise Neves

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: hay.fonseca@hotmail.com

Estimar a prevalência de desconforto físico de cuidadores de crianças e adolescentes com disfunções neurológicas. **Materiais e métodos:** Participaram desse estudo observacional descritivo e transversal cuidadores de crianças e adolescentes com disfunções neurológicas da organização não governamental, Centro Dialético de Pais e Amigos dos Especiais. A coleta de dados consistiu em uma entrevista pessoal com aplicação de dois questionários, a escala para desconforto corporal para as diferentes partes do corpo, um instrumento de 4 itens usado para avaliar varias parte do corpo dos pacientes com regiões dolorosas, outro instrumento foi questionário desconforto corporal composto de 17 questões, que é um instrumento de avaliação, que avaliou o desconforto físico destes cuidadores. A análise estatística dos dados foi realizada usando o programa SPSS 18.0. **Resultados:** A maioria, 94,7% (18) eram mulheres e apenas um cuidador era do gênero masculino. A prevalência de desconforto foi de 94,7%. Entre os que sentem desconforto, a maioria, 47,4%, sente há mais de 8 anos e 26,3% entre 2 e 4 anos. Quanto à localização da dor, 78,9% dos cuidadores referem dor nos membros inferiores (MMII) e 73,68% na coluna. No que alude à intensidade da dor, a coluna é a região sentida com mais intensidade.

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS, MA

CASTRO, Emmanuelle Elky Costa*; MAGALHÃES, Bruna Cruz; CABRAL, Nayra Anielly Lima

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: elkyhta@hotmail.com

Avaliar a educação nutricional em escolas públicas de São Luís, MA. A infância apresenta importantes aspectos para a formação de hábitos e práticas alimentares. A educação nutricional pode ser considerada um componente decisivo na promoção da saúde (GABRIEL, 2008). **Metodologia:** Para avaliação utilizou-se duas estratégias de intervenção: intervenção nutricional (A) realizadas na comunidade escolar pelo pesquisador; e intervenção nutricional (B) desenvolvidas por professores que frequentaram oficinas de capacitação. Avaliou-se o conhecimento das crianças através de dois instrumentos sobre pirâmide dos alimentos e higiene pessoal; e os professores através de um questionário do tipo verdadeiro ou falso. Avaliou-se 425 alunos de duas escolas, 64,7% foram submetidos à intervenção A e 35,3% à intervenção B. No instrumento sobre a pirâmide alimentar foi observada maior diferença nos percentuais de acertos relativos aos grupos de carnes e ovos e ao de pães, cereais e massas. No instrumento que avaliou a higiene das mãos antes da realização das refeições verificou-se diferença de percentual de 1,1%. O questionário para avaliação dos professores foi aplicado em 11 professores que receberam a intervenção nutricional A e em 7 que receberam a intervenção B; dos nove itens avaliados, quatro apresentaram diferença significativa entre os percentuais de acertos nos dois tipos de intervenção. As duas intervenções têm importâncias semelhantes para avaliação do processo de educação nutricional, sendo que se torna viável a capacitação dos professores através do nutricionista para transmissão dos conhecimentos de alimentação e nutrição, para promoção de saúde.

PREVALÊNCIA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RIBEIRO, Kerly Madeira*; DA SILVA, Danielle Bezerra; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: kerly_ribeiro@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é estimar a prevalência de doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos assistidos no ambulatório de DPOC de um hospital universitário em São Luís - MA. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal. A amostra foi coletada utilizando-se os prontuários de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica entre o período de 2011 a 2014. Foram efetuadas cópias dos prontuários selecionados juntamente com os exames espirométricos dos mesmos. Os dados foram digitados e analisados no SPSS 18.0. Resultados: A prevalência da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) entre os pacientes assistidos no ambulatório de DPOC de um Hospital Universitário foi de 6%, sendo 68,8% (22) pertencente ao gênero masculino e 31,3% (10) ao gênero feminino. Atualmente apenas 3,1% (1) faz uso de cigarro, mas 91% (29) já fumaram em algum momento de suas vidas, sendo o tempo mediano de uso do cigarro de 40 (15-60) anos. O tempo mediano que esses indivíduos abandonaram o cigarro foi de 10 (0-23) anos. Concluiu-se que, a prevalência de DPOC em indivíduos assistidos no ambulatório de DPOC entre os últimos três anos foi de 6%. Observou-se que, a maior prevalência de DPOC é no sexo masculino, porém, a quantidade de mulheres com DPOC vem aumentando ao longo dos anos. Um fato a destacar é que houve uma queda na prevalência de DPOC no ambulatório do hospital universitário, que pode ter ocorrido pela criação de dois novos centros de assistência a pacientes com distúrbios respiratórios em São Luís - MA.

PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE

MORAES, Valkiria Kerly Almeida*; ALMEIDA, Mônica Danielle de Sousa;

DE SANTANA, Tatiana Cristina Fonseca Soares; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: vk.almeida@hotmail.com

Objetivo: Estimar a prevalência de escoliose e fatores associados em acadêmicos de odontologia de uma Universidade. Materiais e métodos: Participaram da pesquisa descritiva observacional transversal 63 acadêmicos com 22 ± 2 anos de idade, que atuavam na clínica escola de odontologia, cursando entre os 4º e 8º períodos e em regime especial do curso de odontologia de uma Universidade em São Luís - MA. Os universitários foram avaliados por 6 dias consecutivos. Foi realizada uma avaliação postural para verificar a presença de escoliose e aqueles que foram detectados com tal deformidade, foram submetidos ao teste de Adams para identificar a presença ou não de gibosidade. Utilizou-se um questionário para identificação da dor mediante a Escala de dor percebida CR 10 de Borg e um goniômetro para verificar o grau de flexibilidade da cadeia muscular posterior. O tratamento estatístico utilizado foi o programa SPSS 18.0. A análise descritiva das variáveis quantitativas assimétricas foi realizada através da mediana com valores mínimos e máximos. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens. Para análise dos fatores associados com a escoliose foi utilizado o Mann-Whitney. Resultados: Foi identificada prevalência significativa de escoliose. Conclusão: Pode-se verificar a identificação de escoliose, estrutural e não-estrutural, e dores associadas à escoliose não-estrutural.

RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE AS ALTERAÇÕES POSTURAIS E VISUAIS

REIS, Irla Nunes*; PINHEIRO, Raphaella Arouche; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: irla_reis@outlook.com

Verificar a intrínseca relação entre as alterações posturais e visuais. Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo com abordagem quantitativa. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: um protocolo adaptado de KENDALL (2007), simetrógrafo, máquina fotográfica e receituário médico do participante especificando o tipo de comprometimento

visual. As avaliações posturais dos 50 indivíduos foram realizadas por meio de fotografias na vista posterior, observando aspectos referentes quanto à escoliose. Na vista lateral direita e esquerda, os indivíduos permaneceram de perfil para o examinador com o simétrógrafo lateralmente ao corpo, observando aspectos referentes à cifose torácica e/ou hiperlordose lombar. Resultados: Foram avaliados 70% (35) do gênero feminino e 30% (15) do gênero masculino, com média de idade de 34,42 ($\pm 12,84$) anos. Na relação entre tipo de alteração postural e comprometimento visual, só foi verificado resultado estatisticamente significativo para presbiopia. Na amostra estudada, 17 (34%) apresentaram presbiopia, 17 (34%) miopia, 9 (18%) astigmatismo e 7 (14%) hipermetropia. Nesses indivíduos, foi verificada alterações posturais em 76% (38), sendo a mais frequente a cifose (17), seguida da hiperlordose (15). Nos indivíduos com hiperlordose foi mais comum a presbiopia (58,85%) e nos que apresentaram hiperlordose, a miopia (83,3%). Os participantes que apresentaram ambas as alterações, hiperlordose e hipermetropia tiveram mais presbiopia (46,7%). A avaliação postural realizada nestes indivíduos com comprometimentos visuais é essencial para a identificação de alterações posturais, e dessa forma, tornar extremamente importante a elaboração de um programa de tratamento que vise à prevenção das alterações de postura.

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL

ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes*; DE LEMOS, Ingrid Gonçalves; LIMA, Glauciane; MESQUITA, Leandro Dantas; PALUDO, Lodovico; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessicamendesaraujo1@hotmail.com

O pré-natal é um serviço que visa manter a saúde da gestante e do seu filho durante a gestação e no puerpério. O enfermeiro é fundamental neste serviço, pois ele está presente desde o início da gestação dando assistência completa as pacientes, principalmente através da consulta de enfermagem. A pesquisa objetivou avaliar a importância da consulta de enfermagem no pré-natal realizada em um Centro de Saúde do município de São Luís. Trata-se de um estudo de caráter descritivo exploratório com abordagem quantitativa, com amostra de 50 gestantes, onde se utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário contemplando informações sobre dados socioeconômicos, anamnese, exame físico, exames de rotina e ações complementares. Das 50 gestantes, 42% estavam entre 18 e 25 anos, 42% eram solteiras e 70% delas ganhavam entre 1 e 2 salários mínimos. Todas as pesquisadas afirmaram que realizaram exames laboratoriais de rotina, 82% asseguraram que confiam na conduta de enfermagem, 84% informaram que receberam orientações sobre alimentação adequada na gestação e 44% consideraram como boa a consulta realizada pelo profissional enfermeiro. Percebe-se que a consulta de enfermagem no pré-natal tem grande importância na evolução da gravidez, muitas são as dimensões com as quais o enfermeiro está comprometido, e muitos são os desafios quando se assume a responsabilidade de lidar com o ser humano, ficando evidente que tão importante quanto os resultados é todo o processo que envolve o pré-natal.

PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA

ALMEIDA, Mônica Danielle De Sousa*; MORAES, Valkíria Kerlly Almeida; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: monica_danielle_1@hotmail.com

Estimar a prevalência de escoliose e fatores associados em acadêmicos de odontologia de uma Universidade. Materiais e métodos: Participaram da pesquisa descritiva observacional transversal 63 acadêmicos com 22 ± 2 anos de idade, que atuavam na clínica escola de odontologia, cursando entre os 4º e 8º períodos e em regime especial do curso de odontologia de uma Universidade em São Luís - MA. Os universitários foram avaliados por 6 dias consecutivos. Foi realizada uma avaliação postural para verificar a presença de escoliose e aqueles que foram detectados com tal deformidade, foram submetidos ao teste de Adams para identificar a presença ou não de gibosidade. Utilizou-se um questionário para identificação da dor mediante a Escala de dor percebida CR 10 de Borg e um goniômetro para verificar o grau de flexibilidade da cadeia muscular posterior. O tratamento estatístico utilizado foi o programa SPSS f 18.0. A análise descritiva das variáveis quantitativas assimétricas foi realizada através da mediana com valores mínimos e máximos. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens. Para análise dos fatores associados com a escoliose foi utilizado o Mann-Whitney. Foi identificada prevalência significativa de escoliose. Pode-se verificar a identificação de escoliose, estrutural e não-estrutural, e dores associadas a escoliose não- estrutural.

PERFIL DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO BAIRRO MARACANÃ EM SÃO LUÍS – MA

SOUSA, Luzia Laila Almeida*; BORGES, Taise Ribeiro; RODRIGUES, Cianna Nunes; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; DINIZ, Marinete Rodrigues de Farias; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; KOMARSSON, Sandra

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: laila.asousa@hotmail.com

A adolescente grávida, devido suas características, requer uma atenção especial, pois, é um momento de profundas mudanças de ordem biológica, psicológica e social ainda imaturas. Diante deste cenário, o estudo tem como objetivo traçar um perfil dessas adolescentes, detalhar um perfil socioeconômico desta população, caracterizar suas condições de moradia e conhecer os métodos contraceptivos já usados por elas. Por meio de um estudo de caráter descritivo exploratório, com abordagem quantitativa, com levantamento de dados através da abordagem diretamente com as adolescentes, aplicando-se um questionário de perguntas fechadas e abertas. Os resultados da pesquisa foram representados através de tabelas, mostrando que as adolescentes grávidas residentes do bairro maracanã da zona rural de São Luís – MA, se caracterizam por garotas humildes que vivem com uma renda de um salário mínimo, sendo que 47,5% na faixa etária de 14 a 16 anos de idade 31,5% solteiras, 42% estudantes, 63% cursando o ensino médio, 58%, moram em casas de alvenaria, 79% com pais ou sogros, 58%, porém, sem nenhuma forma de saneamento básico. Com toda essa realidade presente, só mostra a suma importância desse problema para a sociedade, devendo ser considerado como um problema de saúde pública.

NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DE SÃO LUÍS- MA

COSTA, Onier do Carmo*; COSTA, Míriam Li Brandão; SOARES, Pollyanna de Jesus Pinto; LOBATO, Yuri Moreira; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

E-mail: onier28@hotmail.com

Primeiros socorros são definidos como uma série de procedimentos simples que têm como meta resolver situações de emergência. O objetivo desse estudo foi verificar o nível de conhecimento em primeiros socorros dos professores de Educação Física das escolas de São Luís – MA. A pesquisa foi feita com 15 professores de ambos os sexos de escolas privadas, públicas-municipais e públicas-estaduais, e realizada de fevereiro a maio de 2014. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado. Dentre os participantes do estudo 20% eram do sexo feminino 80% eram do sexo masculino; 66,7% trabalhavam em escolas privadas; 20% em escolas públicas-municipais e 13,3% em escolas públicas-estaduais; Dentre os resultados, 66,7% afirmaram estar pouco satisfeitos com o curso de primeiros socorros visto na graduação e 80% responderam errado quanto à preocupação com a segurança na situação de emergência. Diante disto, conclui-se que a maior parte dos professores não possui conhecimento suficiente com relação ao uso de primeiros socorros no ambiente escolar, necessitando de cursos de reciclagem para melhor aprendizado e atendimento.

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS, MA

CASTRO, Emmanuelle Elky Costa*; MAGALHÃES, Bruna Cruz; CABRAL, Nayra Anielly Lima

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: elkyhta@hotmail.com

Avaliar a educação nutricional em escolas públicas de São Luís, MA. A infância apresenta importantes aspectos para a formação de hábitos e práticas alimentares. A educação nutricional pode ser considerada um componente decisivo na promoção da saúde (GABRIEL, 2008). Metodologia: Para avaliação utilizou-se duas estratégias de intervenção: intervenção nutricional (A) realizadas na comunidade escolar pelo pesquisador; e intervenção nutricional (B) desenvolvidas por professores que frequentaram oficinas de capacitação. Avaliou-se o conhecimento das crianças através de dois instrumentos sobre pirâmide dos alimentos e higiene pessoal; e os professores através de um questionário do tipo verdadeiro ou falso. Avaliou-se 425 alunos de duas escolas, 64,7% foram submetidos à intervenção A e 35,3% à intervenção B. No instrumento sobre a pirâmide alimentar foi observada maior diferença nos percentuais de acertos relativos aos grupos de carnes e ovos e ao de pães, cereais e massas. No instrumento que avaliou a higiene das mãos antes da realização das refeições verificou-se

diferença de percentual de 1,1%. O questionário para avaliação dos professores foi aplicado em 11 professores que receberam a intervenção nutricional A e em 7 que receberam a intervenção B; dos nove itens avaliados, quatro apresentaram diferença significativa entre os percentuais de acertos nos dois tipos de intervenção. As duas intervenções têm importâncias semelhantes para avaliação do processo de educação nutricional, sendo que se torna viável a capacitação dos professores através do nutricionista para transmissão dos conhecimentos de alimentação e nutrição, para promoção de saúde.

PREVALÊNCIA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RIBEIRO, Kerly Madeira*; DA SILVA, Danielle Bezerra; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: kerly_ribeiro@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é estimar a prevalência de doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos assistidos no ambulatório de DPOC de um hospital universitário em São Luís - MA. **Materiais e métodos:** Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal. A amostra foi coletada utilizando-se os prontuários de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica entre o período de 2011 a 2014. Foram efetuadas cópias dos prontuários selecionados juntamente com os exames espirométricos dos mesmos. Os dados foram digitados e analisados no SPSS 18.0. **Resultados:** A prevalência da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) entre os pacientes assistidos no ambulatório de DPOC de um Hospital Universitário foi de 6%, sendo 68,8% (22) pertencente ao gênero masculino e 31,3% (10) ao gênero feminino. Atualmente apenas 3,1% (1) faz uso de cigarro, mas 91% (29) já fumaram em algum momento de suas vidas, sendo o tempo mediano de uso do cigarro de 40 (15-60) anos. O tempo mediano que esses indivíduos abandonaram o cigarro foi de 10 (0-23) anos. Concluiu-se que, a prevalência de DPOC em indivíduos assistidos no ambulatório de DPOC entre os últimos três anos foi de 6%. Observou-se que, a maior prevalência de DPOC é no sexo masculino, porém, a quantidade de mulheres com DPOC vem aumentando ao longo dos anos. Um fato a destacar é que houve uma queda na prevalência de DPOC no ambulatório do hospital universitário, que pode ter ocorrido pela criação de dois novos centros de assistência a pacientes com distúrbios respiratórios em São Luís - MA.

PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE

MORAES, Valkiria Kerly Almeida*; ALMEIDA, Mônica Danielle de Sousa; DE SANTANA, Tatiana Cristina Fonseca Soares; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: vk.almeida@hotmail.com

Objetivo: Estimar a prevalência de escoliose e fatores associados em acadêmicos de odontologia de uma Universidade. **Materiais e métodos:** Participaram da pesquisa descritiva observacional transversal 63 acadêmicos com 22 ± 2 anos de idade, que atuavam na clínica escola de odontologia, cursando entre os 4º e 8º períodos e em regime especial do curso de odontologia de uma Universidade em São Luís - MA. Os universitários foram avaliados por 6 dias consecutivos. Foi realizada uma avaliação postural para verificar a presença de escoliose e aqueles que foram detectados com tal deformidade, foram submetidos ao teste de Adams para identificar a presença ou não de gibosidade. Utilizou-se um questionário para identificação da dor mediante a Escala de dor percebida CR 10 de Borg e um goniômetro para verificar o grau de flexibilidade da cadeia muscular posterior. O tratamento estatístico utilizado foi o programa SPSS f 18.0. A análise descritiva das variáveis quantitativas assimétricas foi realizada através da mediana com valores mínimos e máximos. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens. Para análise dos fatores associados com a escoliose foi utilizado o Mann-Whitney. **Resultados:** Foi identificada prevalência significativa de escoliose. **Conclusão:** Pode-se verificar a identificação de escoliose, estrutural e não-estrutural, e dores associadas à escoliose não- estrutural.

RELAÇÃO INTRÍNSECA ENTRE AS ALTERAÇÕES POSTURAIS E VISUAIS

REIS, Irla Nunes*; PINHEIRO, Raphaella Arouche; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: irla_reis@outlook.com

Verificar a intrínseca relação entre as alterações posturais e visuais. Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo com abordagem quantitativa. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: um protocolo adaptado de KENDALL (2007), simétrógrafo, máquina fotográfica e receituário médico do participante especificando o tipo de comprometimento visual. As avaliações posturais dos 50 indivíduos foram realizadas por meio de fotografias na vista posterior, observando aspectos referentes quanto à escoliose. Na vista lateral direita e esquerda, os indivíduos permaneceram de perfil para o examinador com o simétrógrafo lateralmente ao corpo, observando aspectos referentes à cifose torácica e/ou hiperlordose lombar. Resultados: Foram avaliados 70% (35) do gênero feminino e 30% (15) do gênero masculino, com média de idade de 34,42 ($\pm 12,84$) anos. Na relação entre tipo de alteração postural e comprometimento visual, só foi verificado resultado estatisticamente significativo para presbiopia. Na amostra estudada, 17 (34%) apresentaram presbiopia, 17 (34%) miopia, 9 (18%) astigmatismo e 7 (14%) hipermetropia. Nesses indivíduos, foi verificada alterações posturais em 76% (38), sendo a mais frequente a cifose (17), seguida da hiperlordose (15). Nos indivíduos com hiperlordose foi mais comum a presbiopia (58,85%) e nos que apresentaram hiperlordose, a miopia (83,3%). Os participantes que apresentaram ambas as alterações, hiperlordose e hiperlordose tiveram mais presbiopia (46,7%). A avaliação postural realizada nestes indivíduos com comprometimentos visuais é essencial para a identificação de alterações posturais, e dessa forma, tornar extremamente importante a elaboração de um programa de tratamento que vise à prevenção das alterações de postura.

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL

ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes*; DE LEMOS, Ingrid Gonçalves; LIMA, Glauciane; MESQUITA, Leandro Dantas; PALUDO, Lodovico; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessicamendesaraujo1@hotmail.com

O pré-natal é um serviço que visa manter a saúde da gestante e do seu filho durante a gestação e no puerpério. O enfermeiro é fundamental neste serviço, pois ele está presente desde o início da gestação dando assistência completa as pacientes, principalmente através da consulta de enfermagem. A pesquisa objetivou avaliar a importância da consulta de enfermagem no pré-natal realizada em um Centro de Saúde do município de São Luís. Trata-se de um estudo de caráter descritivo exploratório com abordagem quantitativa, com amostra de 50 gestantes, onde se utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário contemplando informações sobre dados socioeconômicos, anamnese, exame físico, exames de rotina e ações complementares. Das 50 gestantes, 42% estavam entre 18 e 25 anos, 42% eram solteiras e 70% delas ganhavam entre 1 e 2 salários mínimos. Todas as pesquisadas afirmaram que realizaram exames laboratoriais de rotina, 82% asseguraram que confiam na conduta de enfermagem, 84% informaram que receberam orientações sobre alimentação adequada na gestação e 44% consideraram como boa a consulta realizada pelo profissional enfermeiro. Percebe-se que a consulta de enfermagem no pré-natal tem grande importância na evolução da gravidez, muitas são as dimensões com as quais o enfermeiro está comprometido, e muitos são os desafios quando se assume a responsabilidade de lidar com o ser humano, ficando evidente que tão importante quanto os resultados é todo o processo que envolve o pré-natal.

PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA

ALMEIDA, Mônica Danielle De Sousa*; MORAES, Valkíria Kerlly Almeida; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: monica_danielle_1@hotmail.com

Estimar a prevalência de escoliose e fatores associados em acadêmicos de odontologia de uma Universidade. Materiais e métodos: Participaram da pesquisa descritiva observacional transversal 63 acadêmicos com 22 ± 2 anos de idade, que atuavam na clínica escola de odontologia, cursando entre os 4º e 8º períodos e em regime especial do curso de odontologia de uma Universidade em São Luís - MA. Os universitários foram avaliados por 6 dias consecutivos. Foi realizada uma avaliação postural para verificar a presença de escoliose e aqueles que foram detectados com tal deformidade, foram submetidos ao teste de Adams para identificar a presença ou não de gibosidade. Utilizou-se um questionário para identificação da dor mediante a Escala de dor percebida CR 10 de Borg e um goniômetro para verificar o grau de flexibilidade da cadeia muscular posterior. O tratamento estatístico utilizado foi o programa SPSS f 18.0. A análise descritiva das variáveis quantitativas assimétricas foi realizada através da mediana com valores mínimos e máximos. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e

porcentagens. Para análise dos fatores associados com a escoliose foi utilizado o Mann-Whitney. Foi identificada prevalência significativa de escoliose. Pode-se verificar a identificação de escoliose, estrutural e não-estrutural, e dores associadas a escoliose não- estrutural.

PERFIL DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO BAIRRO MARACANÃ EM SÃO LUÍS – MA

SOUSA, Luzia Laila Almeida*; BORGES, Taise Ribeiro; RODRIGUES, Cianna Nunes; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; DINIZ, Marinete Rodrigues de Farias; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; KOMARSSON, Sandra

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: laila.asousa@hotmail.com

A adolescente grávida, devido suas características, requer uma atenção especial, pois, é um momento de profundas mudanças de ordem biológica, psicológica e social ainda imaturas. Diante deste cenário, o estudo tem como objetivo traçar um perfil dessas adolescentes, detalhar um perfil socioeconômico desta população, caracterizar suas condições de moradia e conhecer os métodos contraceptivos já usados por elas. Por meio de um estudo de caráter descritivo exploratório, com abordagem quantitativa, com levantamento de dados através da abordagem diretamente com as adolescentes, aplicando-se um questionário de perguntas fechadas e abertas. Os resultados da pesquisa foram representados através de tabelas, mostrando que as adolescentes grávidas residentes do bairro maracanã da zona rural de São Luís – MA, se caracterizam por garotas humildes que vivem com uma renda de um salário mínimo, sendo que 47,5% na faixa etária de 14 a 16 anos de idade 31,5% solteiras, 42% estudantes, 63% cursando o ensino médio, 58%, moram em casas de alvenaria, 79% com pais ou sogros, 58%, porém, sem nenhuma forma de saneamento básico. Com toda essa realidade presente, só mostra a suma importância desse problema para a sociedade, devendo ser considerado como um problema de saúde pública.

NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DE SÃO LUÍS- MA

COSTA, Onier do Carmo*; COSTA, Míriam Li Brandão; SOARES, Pollyanna de Jesus Pinto; LOBATO, Yuri Moreira; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

E-mail: onier28@hotmail.com

Primeiros socorros são definidos como uma série de procedimentos simples que têm como meta resolver situações de emergência. O objetivo desse estudo foi verificar o nível de conhecimento em primeiros socorros dos professores de Educação Física das escolas de São Luís – MA. A pesquisa foi feita com 15 professores de ambos os sexos de escolas privadas, públicas-municipais e públicas-estaduais, e realizada de fevereiro a maio de 2014. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado. Dentre os participantes do estudo 20% eram do sexo feminino 80% eram do sexo masculino; 66,7% trabalhavam em escolas privadas; 20% em escolas públicas-municipais e 13,3% em escolas públicas-estaduais; Dentre os resultados, 66,7% afirmaram estar pouco satisfeitos com o curso de primeiros socorros visto na graduação e 80% responderam errado quanto à preocupação com a segurança na situação de emergência. Diante disto, conclui-se que a maior parte dos professores não possui conhecimento suficiente com relação ao uso de primeiros socorros no ambiente escolar, necessitando de cursos de reciclagem para melhor aprendizado e atendimento em situações de emergência.

MORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA POR HIV-AIDS EM SÃO LUÍS-MA

SOUSA, Nayanna Láyza Oliveira*; SILVA, Aniele Aranha; MOURA, Fanael Almeida ; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; PALUDO, Ludovico; DINIZ, Marinete R. de Farias

Curso: enfermagem

Categoria: graduação

Email: nanalayza@hotmail.com

Resumo: A feminização do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) / Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), reflete o aumento do número de casos da doença no sexo feminino acontecido ao longo dos anos e tem sido um

fator importante na contribuição para o aumento das estatísticas de óbitos de mulheres por esta síndrome. O objetivo desse estudo foi investigar a mortalidade por HIV/AIDS de mulheres com faixa etária entre 10 e 49 anos, residentes no município de São Luís - MA, ocorridas durante o ano de 2010. Estudo descritivo, retrospectivo com variáveis quantitativas. Os dados foram coletados no Comitê de Prevenção da Mortalidade Materno Infantil do município de São Luís, através das fichas de investigação de óbito e declaração de óbito. A população do estudo foi constituída por 29 mulheres que evoluíram a óbito por complicações do HIV/AIDS. Após a análise dos dados evidenciou-se que, 48% encontravam-se na faixa etária de 30-39 anos; quanto ao estado civil 86% eram solteiras, 41% apresentavam ensino fundamental incompleto. Dentre as principais complicações da síndrome que culminaram com as mortes das mulheres, destacaram-se Insuficiência Respiratória Aguda (31%), Pneumonia por *Pneumocystis carinii* (15%) e Toxoplasmose cerebral (10%). Apesar das imprecisões e falhas que podem ocorrer no preenchimento das declarações de óbito, os dados de morbimortalidade obtidos por meio das fontes do estudo, trouxeram subsídios para conhecimento aproximado das causas de morte por HIV/AIDS, despertando, a necessidade de um número maior de pesquisas com o objetivo de reduzir a mortalidade materna.

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL ENTRE USUÁRIAS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

RODRIGUES, Samara Bráz*; FREIRE, Grabiella Saviratinne Gonçalves; SOUSA, Nayanna Láyza Oliveira; SOUSA, Vanessa Patrícia Lima; NASCIMENTO, Shaiane Cunha; Noronha, Francisca Maria Ferreira

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: samarabrazrodrigues@gmail.com

Resumo: A gravidez, o parto e o puerpério constituem-se em eventos fisiológicos que se desenvolvem em um contexto social e cultural que influencia e determina a evolução da gravidez, sendo o pré-natal fundamental para a preparação da maternidade segura e saudável. Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar a assistência pré-natal entre usuárias de uma Unidade de Saúde da Família no município de São Luís – MA. Trata-se de uma pesquisa descritiva, prospectiva e analítica quantitativa, realizada em uma UBS de São Luís – MA, onde foram coletados dados de 50 gestantes, através de um questionário com questões abertas e fechadas. Observou-se que (60%) das gestantes não tinham escolaridade básica completa e (4%) eram analfabetas; (56%) só haviam realizado 2 a 3 consultas durante toda a gestação e (10%) nunca haviam feito nenhuma consulta; (24%) tinham mais de 3 filhos, mas durante o pré-natal somente (3%) tiveram informações sobre planejamento familiar; (57%) da população tinha antecedentes de infecção urinária, no entanto apenas (2%) das mulheres foram orientadas quanto à higiene pessoal e (1%) sobre DST's. A partir da análise foi possível observar que a assistência pré-natal ainda apresenta deficiências, visto que alguns requisitos preconizados na Política da Saúde da Mulher tem tido pouco alcance por parte das gestantes, e esse quadro só irá mudar quando houver investimentos na capacitação dos profissionais, na compra de material necessário e o compromisso, dos mesmos, em serem os agentes da mudança para a sua realidade local.

CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA

PINTO, Thaysa Fernandes*; SANTOS, Maurílio Dias; Da Silva, Mariana Carvalho Batista

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

Email: thaysafp@gmail.com

Resumo: Dentro da família é possível observar o papel de liderança assumido pela mãe em relação aos cuidados com a saúde, sobretudo a saúde bucal das crianças. Avaliar o significado do processo saúde-doença para mães torna-se importante para definição de políticas de saúde que influenciam os cuidados com a saúde bucal (SB) de crianças. Com o objetivo de demonstrar o conhecimento materno sobre cuidados com a dentição decídua foi aplicado um questionário com dados sócio-demográficos e questões sobre conhecimento de SB para mães de crianças de 0 a 5 anos de idade usuárias da Unidade de Saúde da Família do Pirapora, na cidade de São Luís(MA). A análise das questões relacionadas ao nível de conhecimento foi determinada por uma matriz de resposta. Definiram-se dois parâmetros: conhecimento adequado – para um número de acertos entre 13 e 20; e conhecimento não adequado – menos de 13 acertos. Foi realizada estatística descritiva e teste do Qui-Quadrado e Exato de Fischer ($\alpha=0.05$). Estudo aprovado pelo CEP/Uniceuma (199.537 /12). 84 mães foram entrevistadas. 64,29% apresentou nível adequado de conhecimento. Em relação à condição socioeconômica a maioria (53,7%) era da classe C, com idade superior a 20 anos (85,71%), com escolaridade

maior que 12 anos (40,48%). A variável classe socioeconômica foi significativa ($p = 0,01$). Idade ($p=0,27$), escolaridade ($p=0,06$), cor da pele ($p= 0,43$), acesso a serviço odontológico ($p=0,06$) e recebimento de orientação de higiene bucal da criança ($p=0,26$) não foram significantes. Os dados mostram que, o fator socioeconômico é o principal fator que interferiu no conhecimento materno.

CONHECIMENTO E PRÁTICA SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA ENTRE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

SILVA, Ronalde*; CARNEIRO, Josiane Araújo; SANTOS FILHO, José Nazareth Barbosa; ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira; SANTOS, Nailde Melo

Curso: Enfermagem

Categoria: graduação

Email: naildems@terra.com.br

Resumo: Introdução: O graduando em enfermagem, a partir de sua inserção em campos de ensino prático, está exposto aos mesmos riscos que a equipe assistencial. Objetivo: analisar o conhecimento e prática sobre as medidas de segurança e proteção por acadêmicos de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior em São Luís/MA. Material e métodos: Estudo exploratório-descritivo, com levantamento de dados quantitativo no período de fevereiro a outubro de 2014, na população de 42 acadêmicos, através de questionário com perguntas abertas e fechadas. Resultados e discussão: Quanto às características gerais da amostra estudada, 22 (52,4%) eram do 8º período, 37 (88,1%) pertenciam ao sexo feminino e 20 (47,6%) tinham entre 19 a 29 anos. Quanto à vacinação, 31 (73,8%) apresentavam esquema completo contra hepatite B; 25 (59,5%) contra difteria e tétano; 27(64,3), tríplice viral e 40 (95,2%) da febre amarela. 20 (47,6%) responderam que existem fatores ambientais na ocorrência de acidentes. 24 (57,2%) referiram saber a conduta imediata a ser seguida em caso de acidente. 29 (69%) sugerem o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Quanto ao uso de EPIs, 30 (71,4%) o faziam sempre; os mais utilizados são: jaleco, sapato fechado e luvas. Conclusão: A abordagem desse conteúdo visa promover uma cultura prevencionista aos acadêmicos por meio da adoção de medidas de práticas seguras.

A ACURACIDADE DE DOIS LOCALIZADORES APICAIS ELETRÔNICOS: ESTUDO IN VITRO

ALBUQUERQUE, Jôse Ana Carvalho*; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: joseanaalbuquerque@hotmail.com

Resumo: Verificar in vitro a acurácia dos localizadores foraminiais Root ZX II e Romiapex A-15 na determinação do comprimento de trabalho. Métodos. Foram selecionados catorze dentes extraídos de humanos, superiores e inferiores, com única raiz (incisivos e caninos) com ápices completamente formados. As coroas dentárias foram removidas e o comprimento anatômico do dente (Medida Real) foi realizado visualmente através da inserção de uma lima K número 10 até que a ponta do instrumento pudesse ser observada no forame apical com auxílio de um microscópio clínico em um aumento de 20X. Os dentes foram fixados em um modelo de resina e embebidos em alginato utilizado como meio de condução para a localização eletrônica. Utilizando uma lima tipo K, conectada ao aparelho localizador, os canais radiculares foram medidos eletronicamente utilizando os dois localizadores apicais. Os resultados obtidos para cada localizador foram comparados com as medidas reais. A média das diferenças entre as medidas utilizando o Root ZX II foi 0,277mm maior que as medidas reais, enquanto que para o aparelho Romiapex A-15 essa diferença foi de 0,308mm. A média das diferenças entre as medidas obtidas com o Root ZX II e o Romiapex A-15 foi de 0,030mm. Não houve diferença significativa entre as medidas com o Root ZX II das obtidas utilizando Romiapex A-15 ($p>0,05$). Conclusão. O aparelho Romiapex A-15 apresentou acurácia semelhante ao aparelho Root ZX II.

GESTANTES HIPERTENSAS DETECTADAS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA

SOUSA, Luzia Laila Almeida*; AROUCHA, Shirliane dos Santos; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; RODRIGUES, Cianna Nunes; DINIZ, Marinete Rodrigues de Farias; SANTIAGO, Lília de Cássia Piedade

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: laila.asousa@hotmail.com

Resumo: A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é cotada entre as patologias obstétricas mais banais e mais graves, causando morte materna no Brasil e determinando um grande número de mortes perinatais. Por isso, o tema Enfermagem e a DHEG tornou-se uma necessidade para o conhecimento dos profissionais de saúde como um todo, se destacando pelo crescente aumento da Hipertensão arterial em gestantes. Passando para a área do nosso conhecimento, destaca-se o objetivo do estudo em conhecer as gestantes hipertensas detectadas na consulta de enfermagem de uma Unidade de Saúde Pública do Município de Zé Doca – MA. Optou-se por uma pesquisa de caráter retrospectivo, com variáveis quantitativas. A pesquisa aconteceu no período de março a abril de 2012, onde foram analisados 42 prontuários de mulheres que desenvolveram a doença variando entre 15 a 31 anos de idade, totalizando 100%. Destas, 62% estavam entre 21 a 30 anos; 59% estavam no 2º trimestre de gestação; quanto ao número de consultas, foi observado que 45% frequentaram de 6 ou mais consultas; 14% das colaboradoras apresentavam pré-eclâmpsia leve, sendo que 50% tem conhecimento sobre DHEG, através de pessoas que tiveram a doença e 76% receberam assistência de enfermagem, o que comprova que a atuação do enfermeiro frente à prevenção da DHEG deve ser efetivada através da conscientização de cada gestante para que ela procure o pré-natal com seriedade e responsabilidade.

COBERTURA VACINAL DO ESQUEMA BÁSICO EM MENORES DE UM ANO EM UM CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

FONTENELE, Rafael Mondego*; CORDEIRO, Sandra Komarsson; SOUZA, Nayana Láyza Oliveira; CARVALHO; SILVA, ANIELI ARANHA; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Categoria: graduação

Email: fhaelmondego@gmail.com

Resumo: A vacinação das crianças menores de um ano é fundamental para a prevenção de várias doenças transmissíveis e é um dos fatores associados com a redução da taxa de mortalidade infantil. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a cobertura vacinal do esquema básico em menores de um ano em um Centro de Saúde do município de São Luís-MA. Estudo de caráter descritivo, prospectivo, com análise quantitativa de dados, no período de abril a maio de 2012. Realizou-se a pesquisa no setor de imunização de um Centro de Saúde do município de São Luís-MA, os dados foram coletados em formulários, livro de registros e questionários. Do total de 50 crianças, observou-se que 52% eram do sexo feminino; 32% estavam na faixa etária entre 6 a 8 meses. Em relação à frequência da cobertura vacinal das crianças, a vacina BCG apresentou uma cobertura de 100%, em que 88% estavam com a situação vacinal em dia e 12% em atraso vacinal. Quanto ao conhecimento do responsável sobre as vacinas que devem ser administradas em menores de um ano e qual proteção essas conferem, 56% mencionaram a vacina hepatite B. Quanto ao conhecimento do responsável sobre o esquema vacinal das crianças, 84% afirmaram que as mesmas estão com a vacinação em dia e 72% receberam orientações do profissional de saúde sobre a importância da vacinação. Conclui-se que, apesar da alta cobertura vacinal, há a necessidade de intervenções de educação em saúde com a comunidade.

CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRAUMA EM PACIENTES DE UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA

LIMA, Antônio Almir Júnior*; FILHO, Agêge Haidar

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: jrlimaa@gmail.com

O trauma é considerado como um complexo problema de saúde pública no Brasil, pois constitui a terceira causa de mortalidade geral. É responsável, anualmente, por mais de 125 mil mortes. Gera altos custos diretos e indiretos com a assistência, perfazendo um valor superior à dívida externa do país e constitui problema de saúde em consequência das mudanças sociais, econômicas e políticas, como o desemprego, a marginalização e o desenvolvimento automobilístico. O objetivo deste trabalho é descrever as características dos traumas em pacientes atendidos em uma clínica escola de fisioterapia. O estudo teve delineamento transversal, descritivo. A pesquisa foi realizada de Janeiro a Maio de 2014 na Clínica Integrada Prof.^a Ada Maria Viana, na cidade de São Luís-Ma, tendo como base de dados, às fichas dos pacientes atendidos na clínica-escola. A amostra inclui 50 pacientes. A coleta de dados deu-se através de entrevista ao final de cada atendimento na clínica, aplicando-se um questionário elaborado com o objetivo de colher dados sócio-demográficos, variáveis clínicas e história do trauma. A maioria dos participantes são adultos, solteiros, em idade produtiva, do sexo masculino, condutores de motocicleta, acometidos por acidentes em vias públicas e tendo como regiões corpóreas mais acometidas, o ombro e as múltiplas regiões. Na relação entre gênero e ao mecanismo de trauma, determinou-se que homens estão mais envolvidos

em acidentes de motocicleta e as mulheres estão mais envolvidas em queda da própria altura e ambos apresentam fratura do tipo fechada. Os dados encontrados são condizentes com outros citados na literatura e nos oferecem um panorama da situação dos traumas acometidos por pacientes atendidos em uma clínica escola de fisioterapia de São Luís.

AMPUTAÇÕES DE MEMBROS INFERIORES DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA

DE SOUSA, Diná Pereira*; FIGUEREDO, Patrícia de Maria Silva; DE SANTANA, Tatiana Cristina Fonseca Soares.

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: tatiana_iann@hotmail.com

O presente estudo objetivou descrever a frequência absoluta e os tipos de amputações de membros inferiores de pacientes diabéticos. Tratou-se de um estudo descritivo transversal, realizado em um Hospital de Urgência e Emergência do município de São Luís - MA no período de março a abril de 2014. Foram incluídos os pacientes amputados de membros inferiores, sendo excluídas, crianças, pessoas com amputações de membros superiores, pacientes com amputações em decorrência de neoplasias, acidentes de trabalho e automobilísticos e traumas em geral. Realizou-se a aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas, onde foram colhidas informações de gênero, idade, nível de amputações e histórico sobre o diabetes. Participaram da amostra 20 indivíduos com idade entre 50 e 94 anos. Os homens correspondiam a 55% do total, sendo que a maior parte das amputações estava na faixa etária de 60 a 69 anos, correspondendo 40% do total de entrevistados. Quanto a escolaridade, constatou-se que 55% dos pacientes eram analfabetos. Os níveis de amputações mais frequentemente encontrados foram as de hálux e metatarsofalangeanas, num total de 50%, seguidos das amputações transtibiais com 20%. Concluiu-se que a maior incidência dos pacientes com amputações de membros inferiores são do gênero masculino, sendo a principal etiologia, as doenças vasculares ocasionadas por diabetes.

A VISÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO À INCLUSÃO DA CAPOEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR EM SÃO LUÍS- MA

LOBATO, Yuri Moreira*; BARROS, Sheperd Fúlvio Souza; COSTA, Onier do Carmo; SOUSA, Valeriano Almeida; CORDEITO, Thadeu de Jesus Viegas; PINTO, Juliana Gomes; OLIVEIRA, Lúcio Carlos Dias

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

E-mail: yurilobato_89@hotmail.com

A capoeira no contexto escolar vem ano a ano crescendo e buscando forma de se afirmar como educação cultural e pedagógica, se infiltrando cada vez mais nos espaços escolares. O objetivo do estudo foi verificar a visão dos professores de Educação Física em relação à inclusão da capoeira no ambiente escolar na cidade de São Luís– MA. Estudo quantitativo, descritivo, transversal, com 16 professores, ambos os sexos, de escolas privadas, públicas-municipais e públicas-estaduais. A pesquisa foi realizada de fevereiro a maio de 2014. Para a coleta de dados, usou-se questionário usado na pesquisa de Castro (2012). Os dados foram coletados através de pesquisa de campo. Dentre os participantes do estudo, 68,75% eram do sexo masculino e 31,25% eram do sexo feminino, onde 43,75% trabalhavam em escolas privadas, 25% em escolas públicas-municipais e 31,25% em escolas públicas-estaduais; onde 100% afirmaram serem conhecedores da história da capoeira, assim como, a importância da capoeira no ambiente escolar. 50% afirmaram que a capoeira estava inserida como componente curricular na escola onde atuavam. Dentre as dificuldades encontradas para o trabalho com a capoeira nas escolas, 87,5% marcaram a alternativa que dizia que era a falta de professor habilitado/capacitado. Pode-se concluir que a maior parte dos professores não se sentem capacitados ou habilitados para trabalharem com a capoeira, já que não se sentem capacitados para tal ensino, apesar de terem afirmado serem conhecedores da história e da importância da capoeira no ambiente escolar.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE MÉIS DE ABELHA COMERCIALIZADOS EM FEIRAS DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO

CAVALCANTE, Amália Sousa*; MARTINS, Hérika Pollyana S.; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino; SOUSA, Martha Reis; SOUSA, Talyne Nayara Viana; AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro de; NUNES, Gilbert Silva

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: amaliacavalcante93@gmail.com

Mel é um produto de origem animal, produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores, é um alimento nutritivo e com propriedades terapêuticas. O trabalho buscou avaliar a qualidade de méis vendidos em feiras livres de São Luís. Foram coletadas cinco amostras, na feira do João Paulo sendo três méis da espécie *Apis mellifera* e dois de *Melipona Fasciculata*. Foram analisados os parâmetros físico-químicos: cor, pH, acidez total e o teor de umidade. Os resultados foram comparados com a Instrução normativa nº11 de 2000 e mostraram que as amostras estavam com níveis dentro do permitido pela legislação, com apenas duas amostras com níveis de umidade elevados. Além dos resultados obtidos, ficou claro a necessidade de uma regulamentação que inclua méis de *Melipona fasciculata* e a rotulagem no mel vendido em feiras para garantir o direito de o consumidor saber qual é o produto que está consumindo.

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E ASMA - ESTUDO COMPARATIVO

DE BRITO, Shirley Barbosa*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; ARAÚJO, Maria Erivânia; CARVALHO, Laise Neves; ARAÚJO, Maria Erivânia; FERREIRA, Patricia Rodrigues;

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: shirleybritofisio@hotmail.com

Introdução: O impacto do binômio asma e DPOC sobre a qualidade do indivíduo é importante e tem despertado o interesse de pesquisadores. **Objetivo:** Comparar o nível de qualidade de vida entre os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e pacientes asmáticos. **Materiais e métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, analítico do tipo de corte transversal realizado em um ambulatório de DPOC e asma do Hospital Universitário do Maranhão (UFMA) entre os meses de abril e maio de 2014. Foram incluídos 30 indivíduos, sendo 15 com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 15 com asma, acima de 40 anos de idade ambos os gêneros. Para a Coleta de dados foi desenvolvido pela pesquisadora responsável um formulário constituído de nove perguntas clínico e sociodemográfico posteriormente foi aplicado o questionário Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ). As variáveis quantitativas são apresentadas em mediana, mínimo e máximo, enquanto as variáveis qualitativas são descritas através de frequências absolutas e relativas. Na comparação da qualidade de vida entre os grupos doença pulmonar obstrutiva crônica e asmático foi utilizado o Mann-Whitney, sendo considerado significativo $p < 0,05$. Os dados coletados foram analisados pelo programa estatístico SPSS 18.0. Os resultados do modelo foram interpretados ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. **Resultados:** Quanto a classificação da doença pulmonar obstrutiva crônica, 93,3% (14) eram do tipo moderada e 6,7% (1) leve. No grupo asmático 93,3% (14) apresentaram asma moderada e 6,7% (1) leve. Não foi verificada diferença em nenhum dos domínios do questionário de qualidade de vida entre os indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. **Conclusão:** Constatou-se que não houve diferença na qualidade de vida entre os grupos avaliados. **Palavras-chave:** Doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma. Qualidade de vida.

PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA

NASCIMENTO, Thanieri dos Santos*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; CARVALHO, Laise Neves; DIAS, Rosane da Silva

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: thannyere_nascimento@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de asma em um grupo de escolares da rede pública de ensino. Asma é uma doença inflamatória crônica associada à hiperresponsividade das vias aéreas. Estima-se que atualmente existam 300 milhões de pessoas com esta doença no mundo. Embora essa patologia possa ocorrer em qualquer fase da vida, é mais comum que os primeiros sintomas apareçam na infância. Foi realizado estudo transversal no período de agosto e setembro de 2013 em uma escola da rede pública de ensino de São Luís – MA. Foram incluídos no estudo 78 alunos, de ambos os gêneros. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Na análise bivariada, foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo estabelecido nível de significância de 5%. A prevalência de asma na amostra estudada foi de 42,3%, sendo que entre 9 a 11 anos, 24 (72,7%) escolares apresentaram asma e entre 12 e 14 anos, apenas 9 (27,3) tiveram. A mediana do pico de fluxo dos indivíduos com asma foi de 410 (260-590) L/min. Não foi verificada associação estatisticamente significativa entre aspectos sociodemográficos e asma. Este estudo evidenciou que escolares de uma rede pública de ensino mostram uma alta prevalência de asma, dessa forma medidas educativas devem ser instituídas para minimizar o impacto dessa doença nessa população.

IMPACTO DA CÁRIE NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA

BRITO, Marcelle Luanna Oliveira*; MORAES, Tallita Ferreira; FERREIRA, Meire Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: marcelle_ma09@hotmail.com

A cárie precoce da infância é uma das principais causas de dor, desconforto e dificuldade na alimentação, bem como causa de comprometimento do desenvolvimento social e psíquico de crianças pré-escolares. É altamente destrutiva e debilitante, requerendo a atenção por parte dos profissionais da saúde e familiares. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da cárie dentária na qualidade de vida de crianças pré-escolares e seus familiares de São Luís/MA. A amostra foi composta por 60 crianças de creches particulares. Foi realizado exame clínico para avaliação da cárie dentária, segundo os critérios da OMS (1999) e aplicada a versão brasileira do Early Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS) no formato de entrevista. Estatística descritiva, de concordância e teste de Mann-Whitney ($p < 0,05$) foram realizados. A média de idade das crianças foi de 3,58 ($\pm 1,05$) anos, sendo 34 (56,7) do gênero masculino e 26 (43,3) do gênero feminino. Os grupos de estudo foram: crianças com 0 a 3 dentes cariados (G1) e crianças com 4 ou mais dentes cariados (G2). Houve diferença significativa entre os grupos tanto para o escore total do B-ECOHIS ($p = 0,001$), quanto para os domínios sintoma, função, psicológico, interação social/auto-imagem, impacto na criança, estresse, função familiar e impacto na família ($p = 0,000$; $p = 0,003$; $p = 0,004$; $p = 0,013$; $p = 0,001$; $p = 0,007$; $p = 0,031$ e $p = 0,008$ respectivamente). A partir dos resultados, é possível concluir que crianças acometidas por mais lesões cáries têm um maior impacto na qualidade de vida.

O CONSUMO DE FIBRAS ALIMENTARES EM POPULAÇÃO ADULTA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO

MAGALHÃES, Bruna Cruz*; CASTRO, Emmanuelle Elky Costa; CABRAL, Nayra Anielly Lima

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: brunacmagalhaes@bol.com.br

Estimar o consumo de fibras da população adulta de São Luís – MA. Revisão de literatura: o consumo adequado de fibras viabiliza uma melhor qualidade de vida, pois são capazes de prevenir a obesidade e o ganho de peso (LIU, et al., 2003). Os maus hábitos e práticas alimentares levam ao baixo consumo de fibras (JONES, LINEBACK, LEVINE, 2006). Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de 2002 a 2003, o consumo de fibras pela população brasileira é baixo, acompanhado pela elevada ingestão de gorduras e proteínas (AACC, 2003). Metodologia: trata-se de estudo transversal, realizado em supermercados da capital maranhense, cujo 133 clientes participaram voluntariamente. Foram avaliadas características econômicas, grau de instrução e o consumo de fibras. O instrumento utilizado foi o questionário de BLOCK, já validado na literatura e um questionário sobre a Classificação Econômica do Brasil. Os dados foram apresentados por meio de frequências e porcentagens. Resultados: 60,9% dos clientes avaliados eram mulheres, 32% tinham idade 41 a 50 anos, mais de 50% possuíam ensino médio e 24% pertenciam a classe C1. Quanto ao consumo de fibras 40% mantinham um consumo razoável, porém insatisfatório. O consumo total de fibras apresentou diferença significativa com o sexo ($p = 0,001$), idade ($p < 0,001$), com escolaridade ($p = 0,002$) e com a classificação econômica ($p < 0,001$). Conclusão: O consumo de fibras ainda é baixo na população adulta, sendo necessário encorajar seu consumo com ênfase a promoção de políticas dirigidas para estimular a ingestão de frutas, verduras e cereais integrais.

CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO HIPERTENSÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO ESTADO DO MARANHÃO

DE OLIVEIRA, Elane Carvalho*; RAMOS, Vanessa Kelveny da Silva; SANTIAGO, Lilia de Cássia Piedade; NUNES, Djayna Serra; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; RODRIGUES, Cianna Nunes

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: elanecarvalho1987@hotmail.com

As doenças crônicas Hipertensão Arterial e Diabetes representam um problema de Saúde Pública devido ao seu impacto na saúde e na qualidade de vida da população. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar os usu-

ários do Hiperdia em um município do Estado do Maranhão no ano de 2010. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de caráter retrospectivo com dados fornecidos pela própria unidade básica de saúde. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um formulário elaborado a partir da ficha de cadastramento do sistema Hiperdia. A amostra foi constituída por 120 usuários sendo que 85 (70,8%) são do sexo feminino, 90 (75%) foram diagnosticados com HAS, 107 (89,2%) estão agrupados na faixa etária de 50 anos e mais, 58 (48,3%) são de cor parda, 59 (49,2%) são analfabetos e 69 (57,5%) mencionaram ser casados. Em relação às complicações crônicas decorrentes das doenças, 1 (0,83%) referiu infarto agudo do miocárdio, 5 (4,2%) outras coronariopatias, 3 (2,5%) AVC, 2 (1,7%) doença renal e 1 (0,83%) sofreu de pé diabético. Considerando os fatores de risco, observou-se um alto índice de massa corporal com 56 (46,7%) dos indivíduos com sobrepeso, 8 (6,7%) eram tabagistas e 69 (57,5%) admitiram ser sedentários. Conclui-se que os fatores relacionados aos hábitos de vida, a exemplo da obesidade e do sedentarismo, têm influencia direta com HAS e DM, e têm sido considerados fatores de risco para a morte prematura. Dessa, forma fica evidenciada a relevância do estabelecimento de atividades educativas com a população estudada, com o objetivo de estimular a prática de atividade física regular e a ingestão calórica adequada buscando a melhor qualidade de vida dos usuários.

PERFIL DOS GESTORES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM SÃO LUÍS-MA

DE OLIVEIRA, Elane Carvalho; COELHO, Emanuely Sousa; RODRIGUES, Cianna Nunes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes; CORTEZ, Denise Carneiro Machado;

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: elanecarvalho1987@hotmail.com

A gestão em saúde é um dos temas que tem convergido a partir das mudanças preconizadas pelo movimento da Reforma Sanitária e que desembocaram na construção do Sistema Único de Saúde enfocando principalmente na qualidade da gestão dos serviços. Objetivou-se conhecer o perfil dos gestores de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em São Luís-MA. Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa, realizado no período de abril e maio de 2012 nessas UBS, sendo a mostra constituída por 32 gestores dessas unidades. A coleta de dados foi feita através da aplicação de um questionário contendo perguntas objetivas. Identificou-se neste estudo que 59% dos gestores eram do sexo feminino; quanto a faixa etária 44% estavam entre 31 e 40 anos, 44% são casados/união estável; quanto à formação acadêmica 69% eram enfermeiros; 34% estavam formados entre 6 e 10 anos; 72% dos gestores não participaram de treinamentos para assumir a gerência; 34% já haviam participado de cursos que contribuíram para o desenvolvimento de suas atividades gerenciais; 64% informaram cursos de Gestão, 38% dos gestores estão à direção da UBS entre 4 e 6 anos; 81% dos gestores das UBS informaram cargo por indicação política e 66% nunca tiveram experiências anteriores com administração/gerência. A complexidade do setor exige conhecimento de gestão específica, objetivando uma tendência a tornar o setor mais profissional ensejando uma melhora na prestação de serviços.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS E BIOMECÂNICOS EM NADADORES JOVENS: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS ESPAÇO-TEMPORAIS E LACTATO

JÚNIOR, Fernando César Pestana Trovão; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes *

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: fernandotrovao@hotmail.com

O êxito em modalidades esportivas individuais e cíclicas depende, dentre outros fatores, do treinamento de parâmetros fisiológicos e biomecânicos. O objetivo deste estudo foi identificar as variáveis espaço-temporais, nomeadamente a velocidade de nado (VN), a frequência de braçadas (FB) e a distância do ciclo (DC), e a concentração sanguínea de lactato (CSL) em nadadores jovens e, verificar as possíveis relações existentes. A amostra foi constituída por quatro atletas de 15 a 17 anos de idade, sendo 3 de sexo feminino e 1 de sexo masculino, representantes nacionais da técnica de crawl em suas respectivas categorias. O protocolo utilizado foi o teste de 6x400 em intensidades progressivas, (MAGLISCHO, 2003). O homem apresentou maiores CSL, VN e DC que as mulheres, provavelmente pelo fato de possuir maior potência muscular. A FB não apresentou diferenças estatisticamente significativas. Em relação à associação entre as variáveis, foi identificada uma diminuição na DC, consoante o incremento da VN, FB e CSL em todos os atletas, o que pode parecer lógico, devido o teste ser realizado em velocidades crescentes de nado. É fundamental a verificação e análise destas relações durante as competições de natação, tendo em vista que em algumas provas, a VN pode diminuir no final do percurso às custas da fadiga crescente.

PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM

AQUINO, Tiago da Conceição*; CARVALHO, Lara Regina do Nascimento de; GOMES, Rosângela Alves Moraes Gereissat; SOUSA, Vanessa Patricia Lima; SANTOS, Glauciane Lima dos

Orientador: CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho

Co-Orientador: NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Categoria: Graduação

Curso: Enfermagem

E-mail: aquino.tiago88@hotmail.com

O paciente portador do Diabetes Mellitus (DM) tem vida delimitada para usufruir algumas regalias, necessitando mudar seu estilo de vida, e ter consciência de que a doença necessita de cuidado integral. A adoção de um estilo de vida apropriado, com a prática regular de atividades físicas e a ingestão de dieta adequada, é praticamente duas vezes mais efetiva que o tratamento farmacológico no controle do DM. O objetivo do estudo foi conhecer o perfil dos pacientes diabéticos atendidos na consulta de Enfermagem do Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo no município de São Luis - MA. Estudo de caráter descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, cuja amostra foi composta por 70 pacientes diabéticos. Utilizou-se um questionário com perguntas fechadas contendo informações referentes a dados socioeconômicos, conhecimento sobre a patologia e fatores de risco associados ao Diabetes Mellitus. Constatou-se que 45,71% pacientes tinham mais de 60 anos, sendo 61,43% do sexo feminino. O estudo nos mostra que ainda existe analfabetismo no nosso país, de modo que foi encontrado 7,15% participantes sem grau de instrução. Quanto ao estado civil desses participantes, 65,71% são casados e 77,14% apresentam renda salarial entre 1 a 2 salários mínimos. O estudo evidencia que os participantes pesquisados tem conhecimento sobre a doença que é acometido e entendem que a educação em diabetes é parte imprescindível do tratamento, associado ao controle metabólico adequado, atividade física e dieta.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Perfil. Cuidados. Conhecimento.

HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA UNIVERSIDADE CEUMA

COLLINS, Samara Pereira*; PHP, Araújo; MC, Ferreira

Orientador: ARAÚJO, Patrícia Helena Pereira Almeida

Co-Orientador: FERREIRA, Meire Coêlho

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: samara_odontologia@hotmail.com

Os hábitos bucais nocivos em crianças podem alterar o desenvolvimento e crescimento dos maxilares, interferir diretamente na configuração dos arcos dentários, nas funções de fala, mastigação, deglutição e respiração, assim como provocar problemas estéticos. Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de hábitos bucais deletérios em pacientes atendidos nas clínicas de Odontopediatria da Universidade Ceuma. A amostra foi composta por 200 fichas clínicas de pacientes com idades entre 6 e 12 anos, documentadas no período de agosto/2012 a junho/2014. Para análise dos resultados, estatística descritiva e testes χ^2 , exato de Fisher e χ^2 de tendência linear foram realizados. Das 200 crianças avaliadas, 105 constaram do sexo feminino e 95, masculino. Noventa e três por cento das crianças apresentaram hábitos bucais deletérios, os quais se mostraram mais prevalentes nas do sexo feminino e para a idade de 6 anos. O hábito de roer unhas foi verificado em 52,0% da amostra, morder objetos em 30,5% e ranger os dentes em 27,5%. Desmame precoce foi associado significativamente com os hábitos de sucção digital ($p < 0,001$) e ranger os dentes ($p < 0,001$), tendo também influenciado na duração do uso da mamadeira ($p < 0,001$). Já o hábito de morder objetos teve associação significativa com o tipo de respiração ($p = 0,001$). Com base nos achados, conclui-se que alguns hábitos bucais deletérios apresentam alta prevalência na Clínica de Odontopediatria, justificando a necessidade de estratégias educativas serem enfatizadas sistematicamente junto ao público alvo e seus responsáveis.

AVALIACAO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DOS MEDICOS NO USO DE VASOCONTRICTORES EM PACIENTES CARDIOPATAS.

CORTEZ, GUILHERME DE AZEVEDO*; SANTOS, Mayanne Squeira

Orientador: MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: guicortez@gmail.com

Atualmente no mercado brasileiro existem diversas soluções anestésicas em diferentes concentrações de vasoconstrictores e outros componentes. Diante disso muitos obstáculos são criados por falta de conhecimento quanto sua utilização em pacientes cardiopatas. Este trabalho pretende expor a carência de conhecimento médico no que diz respeito ao parecer em relação aos vasoconstrictores e pacientes cardiopatas, além de buscar uma forma de conciliar o uso dessas soluções nestes pacientes a fim de conseguir segurança e eficácia sem interferência no tratamento ou riscos a vida do indivíduo. Respaldados pela revisão literária pode-se concluir que anestésicos com vasoconstrictores podem ser empregados adequadamente em diversos pacientes inclusive nos cardiopatas se feitos respeitando as condições sistêmicas e realizando uma correta anamnese por parte do profissional, afim de selecionar as corretas concentrações e posologias das soluções anestésicas. Esta pesquisa visa avaliar uma amostra de 100 médicos maranhenses por meio de questionários aplicados. Foi observado a falta de conhecimento dos mesmos quando confrontados à literatura, visto estudos mais recentes realizados.

DESCONFORTO FÍSICO EM CUIDADORES DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS

FONSECA, Hayanna Souza*; CARVALHO, Laise Neves

Orientador: ALMEIDA, Natalia Gaspar

Co-Orientador: CARVALHO, Laise Neves

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: hay.fonseca@hotmail.com

Estimar a prevalência de desconforto físico de cuidadores de crianças e adolescentes com disfunções neurológicas. **Materiais e métodos:** Participaram desse estudo observacional descritivo e transversal cuidadores de crianças e adolescentes com disfunções neurológicas da organização não governamental, Centro Dialético de Pais e Amigos dos Especiais. A coleta de dados consistiu em uma entrevista pessoal com aplicação de dois questionários, a escala para desconforto corporal para as diferentes partes do corpo, um instrumento de 4 itens usado para avaliar varias parte do corpo dos pacientes com regiões dolorosas, outro instrumento foi questionário desconforto corporal composto de 17 questões, que é um instrumento de avaliação, que avaliou o desconforto físico destes cuidadores. A análise estatística dos dados foi realizada usando o programa SPSS 18.0. **Resultados:** A maioria, 94,7% (18) eram mulheres e apenas um cuidador era do gênero masculino. A prevalência de desconforto foi de 94,7%. Entre os que sentem desconforto, a maioria, 47,4%, sente há mais de 8 anos e 26,3% entre 2 e 4 anos. Quanto à localização da dor, 78,9% dos cuidadores referem dor nos membros inferiores (MMII) e 73,68% na coluna. No que alude à intensidade da dor, a coluna é a região sentida com mais intensidade.

AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA DE JOVENS ESCOLARES: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRATICANTES DE BASQUETE E NATAÇÃO

MONTEIRO, Thiago Carvalho*

Orientador: NUNES, Luiz Alexandre de M.

Categoria: Graduação

Curso: Educação Física

E-mail: tcarvalhom@yahoo.com.br

A adolescência é um período de mudanças biopsicossociais, onde ocorre o aumento da força motora. Dessa forma, é importante avaliar o desempenho motor dos alunos, dentre eles a potência muscular. Assim, o professor pode traçar estratégias para aprimorar o rendimento esportivo e a saúde dos indivíduos. O presente estudo teve por objetivo comparar o desempenho da potência muscular de membros inferiores, em valores absolutos, de escolares que praticam as modalidades de basquete e natação. A amostra foi composta por 24 jovens com treze anos de idade, todos do sexo masculino, sendo doze de cada modalidade. Para coleta de dados foi utilizado o protocolo de salto em distância "parado", (GUEDES e GUEDES, 2006). A mensuração dos saltos foi feita através de uma trena métrica inelástica da marca Sanny. Os dados coletados foram analisados e comparados através do Teste t de student para amostras independentes, adotando-se nível de significância ($p \leq 0,05$). Foi utilizado o programa estatístico BioEstat, versão 5.3. Os nadadores saltaram em média 1,66m ($\pm 0,14$), enquanto que os praticantes de basquete, 1,76m ($\pm 0,23$). Os resultados mostraram não existir diferença entre os grupos ($p = 0,11$), o que provavelmente pode estar relacionado ao tempo de treino muito reduzido das modalidades. Outras possíveis hipóteses, poderíamos citar os fatores motivação, compreensão do trabalho e nível de maturação sexual dos avaliados.

PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MOTORAS EM ADULTOS PORTADORES DE HANSENÍASE ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM SÃO LUÍS – MA

SOARES, Taniela Maria Ferraz*; NASCIMENTO Ana Lourdes Avelar

Orientador: NASCIMENTO Ana Lourdes Avelar

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: alei_nat@hotmail.com

Estimar a prevalência de disfunções motoras em adultos portadores de Hanseníase atendidos uma unidade de saúde especializada em São Luís – MA. **Materiais e métodos:** Realizou-se um estudo do tipo descritivo e transversal, em que foram revisados os prontuários de pacientes atendidos no período de setembro de 2012 à setembro de 2013, buscando dados como: idade, gênero, forma clínica, segmento de maior comprometimento funcional, grau de comprometimento funcional, tempo de tratamento (classificação operacional). Inicialmente foi realizada uma análise descritiva. A análise estatística foi obtida e organizada em planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2007 para elaboração dos gráficos e tabelas. **Resultados:** Foram encontrados um total de 121 prontuários, onde não houve uma diferença significativa entre homens e mulheres diagnosticados com hanseníase, com 60 (49,59%) e 61 (50,41%), respectivamente. 111 (90,90%) dos pacientes são residentes no município de São Luís –MA. Com relação às formas clínicas da Hanseníase, a maioria dos pacientes apresentou a forma clínica Dimorfa (59,50%), seguido da forma Virchowiana (27,27%), Tuberculóide com (10,75%), e Indeterminada (2,48%) e no grau de incapacidade destacou-se o Grau 1 onde houve a diminuição e/ou perda da sensibilidade e o segmento de maior comprometimento funcional foi em MMII (membros inferiores) com 52 pacientes. **Conclusão:** No estudo presente, foi concluído que, os pacientes hansenianos atendidos em uma unidade de saúde especializada em São Luís – MA, são predominantemente do sexo feminino, na sua maioria trabalhadoras domésticas, foram pacientes prevalentes do município de São Luís, com faixa etária acima dos 31 anos. Houve prevalência da forma clínica Dimorfa, apresentando o Grau 1 de incapacidade funcional com os MMII mais acometidos.

UTILIZAÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO EM DENTES DECÍDUOS: RELATO DE CASO CLÍNICO

COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro; LEAL, Adriana Mara Araújo; RIZZI, Cláudia De Castro; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia/Odontopediatria

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

A determinação do comprimento real de trabalho é uma etapa fundamental para o sucesso da terapia endodôntica, especialmente nos dentes decíduos, com intuito de minimizar injúrias periapicais e evitar alterações no germe dos dentes permanentes sucessores. O exame radiográfico é empregado na prática clínica para realização da odontometria, no entanto a determinação precisa do comprimento do canal radicular é dificultada devido variações anatômicas, sobreposição de estrutura, distorções, erros técnicos ou erros de projeção. Os localizadores eletrônicos foraminais vêm sendo vastamente empregados para realização da odontometria em dentes permanentes. Ultimamente, esses aparelhos têm sido indicados, também, para dentes decíduos, diminuindo a exposição do paciente infantil a radiação e o tempo de trabalho clínico. Esse trabalho tem por finalidade o relato de um caso clínico realizado na clínica de Odontopediatria da Universidade Ceuma, no qual observou-se a precisão na odontometria com a utilização de localizador apical, bem como uma redução no tempo de trabalho e principalmente a menor exposição da criança à radiação.

USO DA TOXINA BOTULÍNICA A (BONTA) NA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL

JUNIOR, Uruguay Matos Silva*; ALVERNE, Breno Mont'

Orientador: GONÇALVES, Leticia Machado

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: junior_ums2@hotmail.com

A aplicação da Toxina Botulínica tipo A (BontA) tornou-se muito útil na Odontologia em lesões orais e maxilofaciais, disfunções temporomandibulares e alterações do equilíbrio estético, como por exemplo, o sorriso gengival. O sorriso gengival é caracterizado pela exposição excessiva do periodonto durante a atividade muscular. Este desequilíbrio ocorre por causas multifatoriais, podendo estar presente excesso de crescimento vertical da maxila, contração labial excessiva, lábio supe-

rior curto, excesso gengival e extrusão dos dentes anteriores, sendo necessária uma avaliação criteriosa para o correto tratamento. Este trabalho relata dois casos clínicos de sorriso gengival que foram tratados com BontA. A primeira paciente apresentava-se com exposição de 4,0 mm de periodonto acima do incisivo central durante a atividade muscular do sorriso, sendo a etiologia explicada pela contração labial excessiva. Neste caso foi aplicado o protocolo de 4 Unidades de Botox® em cada lado do músculo elevador do lábio superior. A segunda paciente apresentou-se com sorriso assimétrico, tendo como etiologia o lábio superior curto. Devido à assimetria, foi aplicado o protocolo de 6 Unidades de Botox® no músculo elevador do lábio superior direito, e 4 Unidades de Botox® no lado esquerdo. Através destes casos clínicos, é possível concluir que a BontA, quando bem indicada e empregada, passa a ser uma alternativa terapêutica com resultados satisfatórios para o paciente, tornando o sorriso mais harmonioso.

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS -MA.

SILVA, Neusa de Paula Mendes Silva*; COELHO, Duciana de Melo; Cordeiro, Geovanne dos Santos; ASSUNÇÃO, Marcos Vinícius de Ferreira de.; OLIVEIRA, Lucio dias

Curso: Educação Física

Categoria: Graduação

Email: neusa.dpaula@gmail.com

A dança oferece um campo pedagógico amplo, por ser uma atividade coletiva e lúdica, acredita-se que seja um instrumento de facilitação nos relacionamentos interpessoais, no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. O objetivo desse estudo foi conhecer as características dos integrantes do projeto de dança dentro de uma universidade particular em São Luís - MA. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, onde buscou-se traçar um perfil das pessoas que procuram a dança como forma de atividade física. A pesquisa realizou-se na Universidade Ceuma - Campus Renascença, com alunos integrantes do projeto "Medida Certa" na modalidade de dança. A população de estudo corresponde a 71 pessoas, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada contendo 06 questões, que foram coletadas no próprio local onde são realizadas as aulas de dança. Identificou-se neste estudo que 63% dos integrantes eram do sexo feminino; quanto a faixa etária, 50% estavam entre 20 a 29 anos; 74% são dos cursos da área de Ciências Biológicas; 100% são discentes da instituição, sendo que 79% tem estudante como profissão; 31% nunca tiveram contato com a dança; os ritmos de maior interesse foram forró, zouk e samba, com 81%, 63% e 53%, respectivamente. Observou-se neste trabalho, que a maioria das pessoas que procuram o projeto são mulheres com idade entre 20 a 29 anos, que cursam na área de Ciências Biológicas e tem o intuito de aprender a dançar visando a saúde através da prática da atividade física.

CIRURGIA DE TOROS MANDIBULAR: RELATO DE CASO

COSTA, Hugo Costa e*; SOAUSA, Wennya Karollyny Moreira; FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros; GOMES, Isadora Carvalho.; Correa , Silvan

Categoria: Graduação

Email: hugocostaecosta@hotmail.com

Curso: Odontologia

Muitos pacientes da clínica odontológica possuem toros mandibulares e palatinos. Estes geralmente são assintomáticos, ocasionalmente, interferem na planejamento de reabilitação do paciente e necessitam ser removidos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico e quais as técnicas cirúrgicas são indicadas.

USO DO EXTRATO DE CAPIM-LIMÃO COMO SUBSTÂNCIA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE ASSOCIADA À PRÓTESE: EFEITO ANTIFÚNGICO E CITOTÓXICO.

MADEIRA, Petrus Levid Barros*;TORRES, Letícia Carvalho; GONSALVES, Eduardo Martins de; MACHADO, Letícia; CORINGA, Ricardo; PASCHOAL, Marco Aurélio Beninni; TORRES, Letícia Carvalho .

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: petrusbmf@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do extrato de capim-limão sobre biofilmes de *Cândida albicans* desenvolvido em resina acrílica para prótese dental, bem como o efeito citotóxico em células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC). Foi investigada a susceptibilidade de *C. albicans* ATCC18804 ao extrato de capim-limão através dos testes de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima (CFM). Para avaliar os biofilmes, foram confeccionados discos de resina acrílica, e, sobre estes, biofilmes foram desenvolvidos por 72h. Os biofilmes foram expostos por 8h em água destilada (controle), extrato na CIM ou 5xCIM e, em seguida foi realizada a contagem das colônias. Para avaliar o efeito citotóxico, células PBMC foram expostas ao meio DMEM, PBS (controles) ou concentrações distintas do extrato por 24h. A viabilidade celular foi avaliada pelo teste do MTT. Os dados foram analisados por ANOVA seguido de Tukey ($p < 0,05$). O valor de CIM foi de 625 $\mu\text{g/mL}$, enquanto o valor de CFM foi de 2500 $\mu\text{g/mL}$. Tanto o extrato na CIM quanto 5xCIM reduziram em até 80% as células do biofilme quando comparado ao controle ($p < 0,001$), não havendo diferença entre estas concentrações ($p > 0,05$). O extrato na CIM manteve a viabilidade celular semelhante ao controle PBS ($p > 0,05$), enquanto as demais concentrações resultaram em viabilidade significativamente menor ($p < 0,05$). Os resultados apontam que a exposição da resina acrílica ao extrato de capim-limão foi um método eficiente para a redução de biofilmes de *C. albicans*, e que a CIM apresentou-se como uma concentração segura em testes com células humanas & nb sp.

AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES HIPERTENSOS DE UMA UBS EM SÃO LUÍS -MA.

LEMOS, Ingrid Gonçalves de*; CAMPOS, Gabriela Sellen Lima; CAMPOS, Gabriela Sellen Lima; MENDES, Jessica Mayara; ARANHA, Araujo Aniele Silva; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e; NORONHA, Francisca Maria de Ferreira.

Categoria: Graduação

Curso: Enfermagem

Email: ingrid_g.lemos@hotmail.com

A Hipertensão Arterial é uma enfermidade de origem multicausal e multifatorial decorrente da interação de vários fatores que foram surgindo com a evolução da Humanidade, assim como o ambiente em que vive, sua cultura, seu relacionamento e suas condições socioeconômicas. Objetiva-se com esse artigo descrever a utilização de automedicação por pacientes portadores de Hipertensão Arterial, na faixa etária entre 35 a 70 anos, em uma unidade básica de saúde no município de São Luís -MA. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritiva, exploratória, com variáveis quantitativas. Os dados foram coletados através de um questionário no total de 85 pacientes portadores de Hipertensão, sendo que 62% eram do sexo feminino e 38% do masculino. Quanto ao uso de medicamentos 60% utilizam hidroclorodiazida, 18% enalapril, 12% propranolol e 4% captopril e Atenolol. Quanto a prescrição médica 70% informam que não as tem e 45% compram os medicamentos sem prescrição do medicamento. Quanto aos efeitos colaterais 15% dores de cabeça, 35% náuseas, 10% vômitos, 11% tontura, 18% alteração na pressão arterial e 11% outros. Conclui-se que apesar dos programas de sensibilização a respeito da automedicação, ainda há o uso indiscriminado de medicamento sem prescrição médica.

Palavras-chave: Automedicação. Hipertensão Arterial. Pacientes Hipertensos.

EFEITO DO CINEMALDEÍDO NA HEMÓLISE DAS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923 E ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC19443 .

PINTO, Bruna Lorrana dos Santos*; ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes; SANTOS, Jéssica Silva dos Santos; FERRO, Thiago Azevedo Feitosa; SOUZA, Eliene Batista

Categoria: Graduação

Curso: Enfermagem

Email: brunalorrana_pinto@hotmail.com

Os microrganismos vêm a desenvolver novos mecanismos de resistência, a capacidade de colonizar e a patogenicidade deles está correlacionado aos fatores de virulência que apresentam entre eles a produção de toxinas que promovem a hemólise das células (SANTOS et al, 2007).

A hemólise foi avaliada conforme metodologia de Smith-Palmer et al, 2002. As bactérias foram cultivadas em 10 ml de caldo Soya Tryptone (24h) na presença ou ausência de diferentes concentrações de cinemaldeído (62,5-2.000 $\mu\text{g/ml}$) ou veículo (2% DMSO em salina). As culturas foram centrifugadas (1.600 rpm, 10 min) e o sobrenadante foi coletado. 1 ml deste foi transferido para um tubo contendo 485 μl de tampão fosfato-salina, contendo 20 mM de cisteína e 1% de eritócito de carneiro. Os tubos foram invertidos, incubados à 37°C (30 min) e centrifugados à 1.000

rpm (5 min). Os sobrenadantes foram transferidos para uma placa de 96 poços. Como controle positivo, os eritrócitos foram incubados com água deionizada. Avaliou-se pela variância (ANOVA) e teste estatístico Dunnett's ($P < 0,05$). Os resultados demonstraram que o cinemaldeído bloqueia a hemólise promovida por S.A nas concentrações de 250 e 500 $\mu\text{g/ml}$. Similarmente, o cinemaldeído apresentou um efeito inibidor na hemólise causada por E.F nas mesmas concentrações. Diante do aumento dos mecanismos de resistência das bactérias aos antibióticos, a maior compreensão destes é fundamental para o desenvolvimento de novas terapêuticas. Conclui-se que o cinemaldeído é eficaz na redução de hemólise das bactérias estudadas. Este composto pode ser uma ferramenta interessante na contenção de infecções decorrentes destes patógenos

CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.

LIMA, Valéria*; OLIVEIRA, Rafaelle Caroline da Silva; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; FILHO, Etevaldo Matos Maia; AZEVEDO, Talita de Oliveira.; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: valerialima.fono@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a resistência adesiva entre cimento ortodôntico tradicional para colagem de bráquetes e cimento autoadesivo, avaliando em adição a influência da asperização na melhora da resistência adesiva, verificando o índice de adesivo remanescente com uso do cimento autoadesivo e sem ele. Trata-se de um estudo final realizado com 72 corpos de provas, divididos em (G1 e G2) e estes subdivididos em outros 4 (G1A, G1B, G2A e G2B). Utilizando cilindros rígidos de PVC para o preenchimento com resina acrílica, onde foi inserida resina composta nanoparticulada fotopolimerizável Filtek Z350 XT em incremento único, onde receberam profilaxia com pedra-pomes fina, água destilada e taça de borracha, antes da colagem dos acessórios ortodônticos. Realizados os testes de cisalhamento na máquina de ensaio universal EMIC, onde foi operada a uma velocidade de 0,5mm/min, utilizando célula de carga de 50Kg/f, logo após foi utilizada lupa Estereoscópica com aumento de 10 vezes para determinar o IAR, através dos escores preconizados que variaram de 1 a 5, para medir o grau de concordância entre os avaliadores para os valores de IAR. O resultado de 0.954 foi altamente significativo. Os resultados mostraram que o efeito do fator tratamento de superfície foi significativo na resistência de união, enquanto que, não houve diferença para os tipos de resinas, e para a interação resina X tratamento de superfície. Isso sugere que a resistência de união foi maior no grupo em não foi utilizada a asperização.

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS QUE ADEREM A UM PROJETO DE DANÇA DENTRO DA UNIVERSIDADE EM SÃO LUÍS-MA.

SILVA, Neusa De Paula Mendes*; COELHO, Duciana De Melo; CORDEIRO, Geovanne Dos Santos; ASSUNÇÃO, Marcos Vinícius De Ferreira De.; OLIVEIRA, Lucio Dias.

Categoria: Graduação

Curso: Educação Física

Email: neusa.dpaula@gmail.com

A dança oferece um campo pedagógico amplo, por ser uma atividade coletiva e lúdica, acredita-se que seja um instrumento de facilitação nos relacionamentos interpessoais, no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. O objetivo desse estudo foi conhecer as características dos integrantes do projeto de dança dentro de uma universidade particular em São Luís - MA. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, onde buscou-se traçar um perfil das pessoas que procuram a dança como forma de atividade física. A pesquisa realizou-se na Universidade Ceuma - Campus Renascença, com alunos integrantes do projeto "Medida Certa" na modalidade de dança. A população de estudo corresponde a 71 pessoas, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada contendo 06 questões, que foram coletadas no próprio local onde são realizadas as aulas de dança. Identificou-se neste estudo que 63% dos integrantes eram do sexo feminino; quanto a faixa etária, 50% estavam entre 20 a 29 anos; 74% são dos cursos da área de Ciências Biológicas; 100% são discentes da instituição, sendo que 79% tem estudante como profissão; 31% nunca tiveram contato com a dança; os ritmos de maior interesse foram forró, zouk e samba, com 81%, 63% e 53%, respectivamente. Observou-se neste trabalho, que a maioria das pessoas que procuram o projeto são mulheres com idade entre 20 a 29 anos, que cursam na área de Ciências Biológicas e tem o intuito de aprender a dançar visando a saúde através da prática da atividade física.

CIRURGIA DE TOROS MANDIBULAR: RELATO DE CASO

COSTA, Hugo Costa e*; SOAUSA, Wennya Karollyny Moreira;
FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros; GOMES, Isadora Carvalho.; Correa , Silvan

Categoria: Graduação

Email: hugocostaecosta@hotmail.com

Curso: Odontologia

Muitos pacientes da clínica odontológica possuem toros mandibulares e palatinos. Estes geralmente são assintomáticos, ocasionalmente, interferem na planejamento de reabilitação do paciente e necessitam ser removidos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico e quais as técnicas cirúrgicas são indicadas.

AÇÃO ANTIBACTERICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE A BACTÉRIA STAPHYLOCOCCUS AREUS (ATCC 6538)

DOS SANTOS, Jéssica Silva*; ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes; NETO, Valério Monteiro; PINTO, Bruna Lorrana dos Santos; SOUZA, Eliene Batista; FERRO, Thiago Azevedo Feitosa; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessica.silvadosantos@hotmail.com

Vários estudos mostram que óleos essenciais extraídos das plantas apresentam ação antimicrobiana contra ampla variedade de micro-organismos, entre elas as bactérias, desta forma, este estudo objetivou analisar a ação antibactericida do óleo essencial cinemaldeído sobre a bactéria Staphylococcus Aureus (ATCC 6538). Para isto utilizou-se o método de microdiluição (SMÂNIA et al, 1995) adicionando 10 µl da bactéria por poço em caldo Muller-Hinton contendo diferentes concentrações de cinemaldeído (62,5-2000 µg/ml) à 37°C. Após 24h, a placa foi lida em 620 nm e absorbância tomada como índice de crescimento. Ainda, efeitos do cinemaldeído sobre a viabilidade e metabolismo bacteriano, com adição de 10 µl do reagente Presto Blue à 37°C por 90 minutos, a absorbância registrada em 550 e 620 nm. Análise foi obtida por variância (ANOVA), e teste de Dunnett's considerando $P < 0,05$ como o valor indicativo de significância. Os resultados mostraram que o cinemaldeído apresentou a concentração de 500 µg/ml como concentração inibitória mínima e 1.000 µg/ml como concentração bactericida mínima frente à bactéria Staphylococcus Aureus (ATCC 6538). Quanto à viabilidade e metabolismo bacteriano observou-se aumento de 2,34 vezes na concentração de 62,5 µg/ml de cinemaldeído e de 1,03 vezes na concentração de 125 µg/ml, já na concentração de 250 µg/ml apresentou inibição de 47% e de 100% nas concentrações de 500 µg/ml, 1.000 µg/ml e 2.000 µg/ml. Com base nos resultados conclui-se que o cinemaldeído exerce ação antibactericida significativa frente à Staphylococcus Aureus (ATCC 6538), sendo considerado um recurso promissor no tratamento de doenças e infecções ocasionadas por esta bactéria.

EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE FORMAÇÃO DE BIOFILME POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027.

ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes*; DOS SANTOS, Jéssica Silva; PINTO, Bruna Lorrana Dos Santos; SOUZA, Eliene Batista; MONTEIRO, Valério; FERRO, Thiago Azevedo Feitosa; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessica.silvadosantos@hotmail.com

O biofilme formado por bactérias constitui um elemento importante de sua patogenicidade e atualmente representa um sério desafio para a medicina. Essa estrutura assegura proteção ao crescimento, adaptação a ambientes, aumento da resistência aos agentes antimicrobianos e o sistema imunitário do hospedeiro. A pesquisa objetivou identificar o efeito inibitório do cinemaldeído na formação de biofilme por Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. No presente trabalho, utilizou-se o método proposto por Stepanovic et al. (2004), pelo qual as bactérias foram cultivadas em caldo Luria Bertani à 37°C overnight. Dez microlitros (µl) da cultura foram então incubadas na presença ou ausência de diferentes concentrações de cinemaldeído (62,5-1.000 µl/poço; 200 µl/poço) à 37 ° C. Após 24 h, os poços foram lavados três vezes com PBS e acrescentou-se 200 µl/poço de cristal violeta (5%) por 15 minutos. Em seguida, adicionou-se 200 µl/poço de metanol por 10 minutos, e a absorbância foi lida em 620 nm. Como controle negativo, utilizou-se um poço sem bactéria. A análise foi obtida por variância e teste Bonferroni's considerando $P < 0,05$. A inibição da formação de biofilme sob ação do óleo essencial foi

avaliada em diferentes concentrações frente a Gram-negativa. Neste estudo, houve uma redução de 75% na formação de biofilme por *Pseudomonas aeruginosa* quando submetida a uma concentração de 125 µg/ml e apresentou 250 µg/ml como concentração inibitória mínima (CIM). Os resultados deste estudo indicam que o óleo essencial tem um grande potencial como um inibidor de biofilme, e que pode agir como um agente terapêutico alternativo

RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LINDOSO, Gissela Santos*; DA ROCHA, Pâmella Gabriella Melo; LEITE, Felipe de Queiroz;
MARQUES, Paulo Roberto da Silva; CARVALHO, Laise Neves; CAVALCANTE, Mirella Araújo

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: gisselalindoso@hotmail.com

O objetivo do trabalho é analisar a relação entre a renda familiar e a quantidade de filhos em gestantes assistidas em Unidades Básicas de São Luís - Maranhão. A correlação entre fecundidade e renda é bastante discutida. De maneira geral, famílias com níveis de renda mais elevados têm menos filhos do que as famílias de baixa renda. Porém essa realidade vem sendo modificada e a taxa de fecundidade vem caindo, independentemente do nível socioeconômico ocupado em todos os Estados brasileiros. A metodologia empregada consistiu em estudo descritivo, transversal, com a utilização de questionários aplicados com as gestantes no período de setembro de 2013 a setembro de 2014. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário formulado pelos preceptores do Pet – Saúde Redes e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma (parecer nº. 743094). Os resultados obtidos mostraram que, das 48 gestantes estudadas, 29 (60,41%) possuíam outros filhos. Com relação à renda, famílias que recebiam até um salário mínimo e famílias com renda entre dois a quatro salários, tinham entre um e três filhos, sendo a média de apenas um filho por família. Conclui-se uma diminuição na quantidade de filhos por família a medida que o país vai se urbanizando e a população vai tendo acesso às políticas públicas de educação e saúde, conscientizando-a quanto a importância do planejamento familiar.

EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECÍPROCRANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS

SANTOS, Sara Freitas*; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramjln@hotmail.com

As limas de níquel-titânio são, atualmente, objeto de vários estudos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa Protaper quanto capacidade de modelar, de preservação da curvatura original e o transporte apical em canais radiculares curvos simulados. Trinta canais radiculares simulados em blocos de resina foram selecionados e divididos aleatoriamente em três grupos (n=10) e preparados utilizando os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa do sistema Protaper. Fotografias padronizadas foram realizadas antes e após a instrumentação dos canais. Após a superposição das imagens, a quantidade de resina removida, tanto da parede interna como da parede externa, assim como, os ângulos de máxima curvatura do canal, antes e após a instrumentação e o transporte do canal radicular foram medidos. Foi aplicado o teste Anova One-way para avaliar se havia diferença das áreas desgastadas internas, externas, total e do transporte do forame entre os grupos. O grupo Reciproc obteve maiores valores de desgaste da parte interna, a UnicOne desgastou de forma semelhante as áreas interna e externa. A Protaper atingiu os maiores valores em relação ao transporte do canal radicular. Todos os instrumentos foram seguros e capazes de manter a curvatura original do canal radicular, no entanto, os instrumentos UnicOne produziram formas mais conservadoras.

OSTOMIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 2006 A 2013

PRADO, Rosa de Paula e Silva*; DESTERRO, Vanessa Sousa; SAUAIA, Cleres Helena Santos;
SAUAIA, Euler Nicolau Filho; SANTOS, Orlando José dos

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: rosinhadp@gmail.com

As ostomias constituem uma medida terapêutica cirúrgica de caráter provisório ou permanente para muitas doenças ou situações clínicas apresentadas por crianças e adolescentes como: malformações congênitas, obstruções intestinais e traumas, com finalidade de alimentação e evacuação. O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos da qualidade de vida de pacientes ostomizados com base no levantamento epidemiológico de crianças e adolescentes portadores de estomas intestinais atendidos no Programa de Assistência aos estomizados do Serviço de Coloproctologia (PAESC) do Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra (HUPD). A metodologia utilizada contou com o estudo observacional, descritivo, retrospectivo, individuado e revisão de literatura em que foram coletados dados de 110 crianças e adolescentes com estomas intestinais de eliminação cadastrados no referido programa de janeiro de 2006 a fevereiro de 2013, no qual as variáveis consideradas foram: idade, sexo, procedência dos pacientes, indicação, tipo e caráter temporal dos estomas e a sua influência na qualidade de vida das crianças e adolescentes. Dos pacientes incluídos no estudo, obteve-se como resultados: a maioria formada pelo sexo masculino (78,2%) e idade média de 9,4 anos. A maior parte deles (55,5%) vindo do interior do Estado do Maranhão, sendo a colostomia o tipo de estoma mais comum (88%), de caráter predominantemente temporário e, como principal causa, a traumática (42,7%). Dessa forma, pode-se concluir que o estudo sugere uma abordagem diferenciada ao cuidado de crianças ostomizadas, valorizando aspectos de gênero e idade, bem como condições sociais, com necessidade de uma abordagem multidisciplinar eficiente e que valorize os aspectos biopsicossociais.

RONCO: UM SINAL DE ALERGA PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

ALVES, Raissa Neruza Santana*; LINHARES, Adiel Costa; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; PEREIRA, Eugênia Aires; CAMPOS, Hilda Thalita Jardim Lobo; CARVALHO, Laise Neves

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: raissalp17@hotmail.com

O presente estudo visa verificar a presença do ronco como um sinal de risco para apneia obstrutiva do sono em crianças assistidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio no qual o indivíduo sofre breves paradas respiratórias enquanto dorme. Levando em consideração que essa patologia em crianças é causada pela obstrução parcial, prolongada ou completa das vias aéreas estudos descrevem que a mesma causa prejuízos notáveis a saúde global dessa população. Foi realizado estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo corte transversal com crianças de ambos os sexos e idade de 0 a 5 anos, assistidas pelo programa de assistência a criança de quatro unidades básicas de saúde da cidade de São Luís/MA. Foram coletados dados referentes à presença de ronco durante o sono. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2013 a março de 2014 com um questionário formulado pelos preceptores do programa Pet-saúde Redes do Uniceuma sendo a coleta realizada pelos alunos do programa que foram previamente treinados. Dentre as 219 crianças analisadas, (58) 26,5 roncam. Levando em consideração a significativa presença dessa alteração pode-se considerar de extrema importância uma maior investigação da mesma a fim de tornar esse conhecimento uma ferramenta utilizada para facilitar o diagnóstico e intervenção dos profissionais da saúde na apneia obstrutiva do sono em crianças.

OBESIDADE INFANTIL EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE SÃO LUÍS - MA

SOUSA, Rebeca Ramos*; CÂMARA, Thalita de Albuquerque Verás; PIMENTEL, Thaíza Santos; Dos Santos, Alexsandro Ferreira

Curso: nutrição

Categoria: graduação

Email: beka_rramos@hotmail.com

Resumo: A obesidade infantil apresenta uma tendência crescente, devido essencialmente aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo. Por isso, é cada vez mais relevante determinar as causas e consequências deste fenômeno. Estimou-se as taxas de obesidade quanto ao IMC e a média de horas de atividade física em escolas pública e privada. Estudo transversal analítico. Foram avaliadas 122 escolares (62 privada e 60 pública). Foram coletados peso (kg), idade (meses) e tempo praticando atividade física. Foi aplicado o teste do Qui-quadrado para avaliar distribuição de frequências e t de student para comparar a média entre as duas escolas. Foi solicitado consentimento dos responsáveis e assentimento dos avaliados. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade CEUMA. Foram avaliados escolares de 7 a 10 anos, sendo que 50,8% foram da rede pública e 49,2% da privada. Em relação ao indicador IMC/I ocorreu prevalência de eutrofia, 53,3%, com maior frequência na rede pública, 58,5%, seguido de expressivos valores de sobrepeso e obesidade, 32,8%, sendo que esta classificação foi mais frequente na rede privada, 38,7%. A média de horas de atividade física na escola particular

foi de 2 horas e da escola pública foi de 1 hora, com significância estatística. Conclui-se que há prevalência de obesidade na escola particular e sedentarismo na escola pública. Sugere-se implantação de medidas de controle de obesidade infantil na escola privada e de estímulo a prática de atividade física, principalmente na escola pública.

OSTOMIAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 2006 A 2013

PRADO, Rosa de Paula e Silva*; DESTERRO, Vanessa Sousa; SAUAIA, Cleres Helena Santos;
SAUAIA, Euler Nicolau Filho; SANTOS, Orlando José dos

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: rosinhadp@gmail.com

As ostomias constituem uma medida terapêutica cirúrgica de caráter provisório ou permanente para muitas doenças ou situações clínicas apresentadas por crianças e adolescentes como: malformações congênitas, obstruções intestinais e traumas, com finalidade de alimentação e evacuação. O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos da qualidade de vida de pacientes ostomizados com base no levantamento epidemiológico de crianças e adolescentes portadores de estomas intestinais atendidos no Programa de Assistência aos estomizados do Serviço de Coloproctologia (PAESC) do Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra (HUPD). A metodologia utilizada contou com o estudo observacional, descritivo, retrospectivo, individuado e revisão de literatura em que foram coletados dados de 110 crianças e adolescentes com estomas intestinais de eliminação cadastrados no referido programa de janeiro de 2006 a fevereiro de 2013, no qual as variáveis consideradas foram: idade, sexo, procedência dos pacientes, indicação, tipo e caráter temporal dos estomas e a sua influência na qualidade de vida das crianças e adolescentes. Dos pacientes incluídos no estudo, obteve-se como resultados: a maioria formada pelo sexo masculino (78,2%) e idade média de 9,4 anos. A maior parte deles (55,5%) vindo do interior do Estado do Maranhão, sendo a colostomia o tipo de estoma mais comum (88%), de caráter predominantemente temporário e, como principal causa, a traumática (42,7%). Dessa forma, pode-se concluir que o estudo sugere uma abordagem diferenciada ao cuidado de crianças ostomizadas, valorizando aspectos de gênero e idade, bem como condições sociais, com necessidade de uma abordagem multidisciplinar eficiente e que valorize os aspectos biopsicossociais.

RONCO: UM SINAL DE ALERA PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMARIA.

ALVES, Raissa Neruza Santana*; LINHARES, Adiel Costa; MENDONÇA, Ana Carolina Sá;
PEREIRA, Eugênia Aires; CAMPOS, Hilda Thalita Jardim Lobo; CARVALHO, Laise Neves

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: raissalp17@hotmail.com

O presente estudo visa verificar a presença do ronco como um sinal de risco para apneia obstrutiva do sono em crianças assistidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio no qual o indivíduo sofre breves paradas respiratórias enquanto dorme. Levando em consideração que essa patologia em crianças é causada pela obstrução parcial, prolongada ou completa das vias aéreas estudos descrevem que a mesma causa prejuízos notáveis a saúde global dessa população. Foi realizado estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo coorte transversal com crianças de ambos os sexos e idade de 0 a 5 anos, assistidas pelo programa de assistência a criança de quatro unidades básicas de saúde da cidade de São Luís/MA. Foram coletados dados referentes à presença de ronco durante o sono. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2013 a março de 2014 com um questionário formulado pelos preceptores do programa Pet-saúde Redes do Uniceuma sendo a coleta realizada pelos alunos do programa que foram previamente treinados. Dentre as 219 crianças analisadas, (58) 26,5 roncam. Levando em consideração a significativa presença dessa alteração pode-se considerar de extrema importância uma maior investigação da mesma a fim de tornar esse conhecimento uma ferramenta utilizada para facilitar o diagnóstico e intervenção dos profissionais da saúde na apneia obstrutiva do sono em crianças.

ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) NA CIDADE DE BACABAL

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro de*; MARTINS, Hérika Pollyana S.; SANTOS, Natálio Lima dos;
RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino; VASCONCELOS, Adriana Araujo

Orientador: NUNES, Gilbeth Silva
Co- Orientador: MAGALHÃES, Bruna Cruz
Categoria: Graduação
Curso: Nutrição
E-mail: celeniaaguilar@hotmail.com

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é considerada como a unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha atividades relacionadas à alimentação e à nutrição. Avaliar o estado físico-funcional da área de produção de uma UAN da cidade de Bacabal, MA. Consistiu na avaliação e descrição das principais características do estabelecimento através da aplicação de check-list conforme a RDC nº275/2002 da ANVISA. A rotina da UAN foi acompanhada diariamente e assim foi possível fazer um levantamento da situação atual das áreas físicas. Constatou-se que a Unidade segue seu funcionamento de acordo com a RDC nº216/2004 da ANVISA, sendo aplicados de forma assídua os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP's) de Higiene das Instalações Físicas. Quanto à localização, possui fachada grande e ampla, pavimentada. O salão é amplo e possui paredes de cores claras, alguns espelhos e vidraça que permitem visualizar todo o ambiente. A área de produção da UAN é um local claro com piso de fácil higienização, portas lisas e livres de rachaduras possui iluminação natural e artificial, composta de ventilação natural, favorecida por exaustores. Os garçons não transitam na mesma, para que assim não haja eventuais contaminações da área externa a área de preparação. Os equipamentos que a compõe encontram-se em bom estado de conservação, a higienização das instalações, equipamentos é feita com frequência. Assim, foi possível averiguar que o estabelecimento em questão fornece uma alimentação nutritiva e equilibrada além de proporcionar refeições seguras do ponto de vista higiênico sanitárias.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE BRAQUETES COLADOS EM RESINA COMPOSTA COM E SEM ASPERIZAÇÃO

OLIVEIRA, RAFAELLE CAROLINE DA SILVA*; FILHO, Etevaldo Maia;
 SAMPAIO, Francisca Greyce; PENHA, Karla Janilee de Sousa; SILVA, Valéria Lima

Orientador: FIALHO, Melissa Proença
Co- Orientador: VERCELIN, Célia
Categoria: Graduação
Curso: Odontologia
E-mail: ccrafaelle@hotmail.com

O objetivo deste estudo experimental e randomizado foi testar a hipótese nula de que não há diferença na resistência ao cisalhamento de braquetes ortodônticos colados sobre resina composta nanoparticulada Z350 (3M) ou microhíbrida Z250 (3M), com ou sem, asperização prévia com broca diamantada. Adicionalmente, avaliou-se o índice de adesivo remanescente (IAR). Foram utilizados 72 corpos de prova, divididos em 4 grupos (n=18) : G1A- braquetes colados em resina nanoparticulada com asperização prévia; G1B- braquetes colados em resina nanoparticulada sem asperização prévia; G2A- braquetes colados em resina microhíbrida com asperização prévia; G2B - braquetes colados em resina microhíbrida sem asperização prévia. Em todos os grupos previamente a colagem foi realizado acabamento, polimento, profilaxia e o protocolo de adesão foi de acordo com os fabricantes. Os procedimentos foram realizados pela mesma operadora (Rafaelle Caroline da Silva Oliveira). Os testes de cisalhamento foram realizados na máquina de ensaio universal (EMIC) utilizando célula de carga de 50 kgf a uma velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa na resistência de união entre os tipos de resinas avaliadas ($p>0,05$), assim como a análise do IAR, entretanto, a análise revelou que o efeito principal devido ao fator tratamento de superfície foi estatisticamente significativo ($p<0,05$) e foi maior no grupo em que a asperização não foi utilizada.

BURNOUT: PREVINA-SE

MAGALHÃES, Eliane Ribeiro*; ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima; MELO, Kerlyne

Orientador: BECKMAN, Marcia
Categoria: Graduação
Curso: Psicologia
E-mail: liviaguedesandrade@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo analisar, através de pesquisas e questionários aplicados a professores de uma escola de São Luís-Maranhão, as relações entre o trabalho dos docentes e o processo de adoecimento desses profissionais que ameaça sua saúde e, conseqüentemente, o ensino-aprendizagem de seus alunos.

O foco principal é despertar nos profissionais da educação o que é, como surge, qual o melhor tratamento e como evitar a síndrome de burnout, também conhecida como doença ocupacional, visando ao uso adequado de suas atividades.

Por ser uma síndrome pouco divulgada e compreendida, seu reconhecimento só é possível através de alguns sinais: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal que podem afetar o educador, ameaçando todo o contexto escolar.

Os dados obtidos com o questionário aplicado permitiram que se tivesse uma visão da insatisfação dos docentes, pois se veem cada vez mais incumbidos de atribuições e exigências difíceis de serem alcançadas e que os levam, muitas vezes, a problemas físicos, psíquicos e sociais e impotentes para modificar tal realidade, começam as formas de evasão, como desinteresse, acomodação, abandono do emprego e até da profissão.

A prevenção continua sendo o melhor remédio, então seria viável que o psicólogo escolar, juntamente com uma equipe multidisciplinar, delineasse estratégias para evitar ou amenizar o estresse decorrente do ambiente de trabalho, incentivando os educadores a programarem melhor as atividades do dia, cuidarem do corpo e da mente e buscarem qualidade nas relações interpessoais em prol de um desenvolvimento pessoal e profissional mais saudável.

AÇÃO ANTIBACTERICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE A BACTÉRIA STAPHYLOCOCCUS AREUS (ATCC 6538)

DOS SANTOS, Jéssica Silva*; ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes; NETO, Valério Monteiro; PINTO, Bruna Lorrana dos Santos; SOUZA, Eliene Batista; FERRO, Thiago Azevedo Feitosa; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessica.silvadosantos@hotmail.com

Vários estudos mostram que óleos essenciais extraídos das plantas apresentam ação antimicrobiana contra ampla variedade de micro-organismos, entre elas as bactérias, desta forma, este estudo objetivou analisar a ação antibactericida do óleo essencial cinemaldeído sobre a bactéria *Staphylococcus Aureus* (ATCC 6538). Para isto utilizou-se o método de microdiluição (SMÂNIA et al, 1995) adicionando 10 µl da bactéria por poço em caldo Muller-Hinton contendo diferentes concentrações de cinemaldeído (62,5-2000 µg/ml) à 37°C. Após 24h, a placa foi lida em 620 nm e absorbância tomada como índice de crescimento. Ainda, efeitos do cinemaldeído sobre a viabilidade e metabolismo bacteriano, com adição de 10 µl do reagente Presto Blue à 37°C por 90 minutos, a absorbância registrada em 550 e 620 nm. Análise foi obtida por variância (ANOVA), e teste de Dunnett's considerando $P < 0,05$ como o valor indicativo de significância. Os resultados mostraram que o cinemaldeído apresentou a concentração de 500 µg/ml como concentração inibitória mínima e 1.000 µg/ml como concentração bactericida mínima frente à bactéria *Staphylococcus Aureus* (ATCC 6538). Quanto à viabilidade e metabolismo bacteriano observou-se aumento de 2,34 vezes na concentração de 62,5 µg/ml de cinemaldeído e de 1,03 vezes na concentração de 125 µg/ml, já na concentração de 250 µg/ml apresentou inibição de 47% e de 100% nas concentrações de 500 µg/ml, 1.000 µg/ml e 2.000 µg/ml. Com base nos resultados conclui-se que o cinemaldeído exerce ação antibactericida significativa frente à *Staphylococcus Aureus* (ATCC 6538), sendo considerado um recurso promissor no tratamento de doenças e infecções ocasionadas por esta bactéria.

EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL CINEMALDEÍDO SOBRE FORMAÇÃO DE BIOFILME POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027.

ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes*; DOS SANTOS, Jéssica Silva; PINTO, Bruna Lorrana Dos Santos; SOUZA, Eliene Batista; MONTEIRO, Valério; FERRO, Thiago Azevedo Feitosa; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: jessica.silvadosantos@hotmail.com

O biofilme formado por bactérias constitui um elemento importante de sua patogenicidade e atualmente representa um sério desafio para a medicina. Essa estrutura assegura proteção ao crescimento, adaptação a ambientes, aumento da resistência aos agentes antimicrobianos e o sistema imunitário do hospedeiro. A pesquisa objetivou identificar o efeito inibitório do cinemaldeído na formação de biofilme por *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027. No presente trabalho, utilizou-se o método proposto por Stepanovic et al. (2004), pelo qual as bactérias foram cultivadas em caldo Luria Bertani à 37°C overnight. Dez microlitros (µl) da cultura foram então incubadas na presença ou ausência de diferentes concentrações de cinemaldeído (62,5-1.000 µl/poço; 200 µl/poço) à 37 ° C. Após 24 h, os poços foram lavados três vezes com PBS e acrescentou-se 200 µl/poço de cristal violeta (5%) por 15 minutos. Em seguida, adicionou-se

200 µl/poço de metanol por 10 minutos, e a absorbância foi lida em 620 nm. Como controle negativo, utilizou-se um poço sem bactéria. A análise foi obtida por variância e teste Bonferroni's considerando $P < 0,05$. A inibição da formação de biofilme sob ação do óleo essencial foi avaliada em diferentes concentrações frente a Gram-negativa. Neste estudo, houve uma redução de 75% na formação de biofilme por *Pseudomonas aeruginosa* quando submetida a uma concentração de 125 µg/ml e apresentou 250 µg/ml como concentração inibitória mínima (CIM). Os resultados deste estudo indicam que o óleo essencial tem um grande potencial como um inibidor de biofilme, e que pode agir como um agente terapêutico alternativo

RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LINDOSO, Gissela Santos*; DA ROCHA, Pâmella Gabriella Melo; LEITE, Felipe de Queiroz;
MARQUES, Paulo Roberto da Silva; CARVALHO, Laise Neves; CAVALCANTE, Mirella Araújo

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: gisselalindoso@hotmail.com

O objetivo do trabalho é analisar a relação entre a renda familiar e a quantidade de filhos em gestantes assistidas em Unidades Básicas de São Luís - Maranhão. A correlação entre fecundidade e renda é bastante discutida. De maneira geral, famílias com níveis de renda mais elevados têm menos filhos do que as famílias de baixa renda. Porém essa realidade vem sendo modificada e a taxa de fecundidade vem caindo, independentemente do nível socioeconômico ocupado em todos os Estados brasileiros. A metodologia empregada consistiu em estudo descritivo, transversal, com a utilização de questionários aplicados com as gestantes no período de setembro de 2013 a setembro de 2014. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário formulado pelos preceptores do Pet – Saúde Redes e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma (parecer nº. 743094). Os resultados obtidos mostraram que, das 48 gestantes estudadas, 29 (60,41%) possuíam outros filhos. Com relação à renda, famílias que recebiam até um salário mínimo e famílias com renda entre dois a quatro salários, tinham entre um e três filhos, sendo a média de apenas um filho por família. Conclui-se uma diminuição na quantidade de filhos por família a medida que o país vai se urbanizando e a população vai tendo acesso às políticas públicas de educação e saúde, conscientizando-a quanto a importância do planejamento familiar.

AValiação DAS BOAS PRATICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro *; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino; VASCONCELOS, Adriana Araújo;
SANTOS, Natálio Lima; MAGALHAES, Bruna Cruz; Lourenço, Kátia Danielle Araujo

Curso: Nutrição

Categoria: graduação

Email: celeniaaguiar@hotmail.com

Resumo: As padarias ou panificadoras são empresas que produzem e vendem pães e produtos de confeitaria. Avaliar as condições higiênico-sanitárias, do ponto de vista das BPFs de uma panificadora localizada no município de São Luís - MA. A coleta dos dados ocorreu de fevereiro a maio de 2012. Foi realizado um diagnóstico prévio no início da pesquisa e uma avaliação três meses após a intervenção de um nutricionista para identificar as falhas e intervir nas seguintes atividades: treinamento, realização de atividades específicas de cada manipulador, elaboração de informativos sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), e descarte daqueles que não se apresentaram em condições adequadas de uso, bem como a aquisição de materiais para higienização adequada do local. Durante as visitas, o check-list foi preenchido através de observações do local, e por informações prestadas pelo proprietário do estabelecimento. Os resultados obtidos a partir da 1ª avaliação pela aplicação do check-list apontaram que, do total de 125 itens analisados, 58,4% (73 itens) não apresentaram conformidade com a legislação vigente. Os itens considerados "críticos" (31 itens), houve uma evolução expressiva, já que na primeira análise feita em fevereiro, as conformidades críticas equivaliam a 35,5%, enquanto na segunda análise feita em maio, foi observado 80,6% de conformidades. Já os aspectos gerais das Condições Ambientais e de Veículos de Transporte e Entrega mantiveram as mesmas condições na primeira e segunda análise, 50% e 100% respectivamente. O estudo evidencia a necessidade de treinamento para os manipuladores de alimentos, pois muitas das não conformidades encontradas estavam relacionadas à falta de conhecimento dos mesmos.

GRAU DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE O MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES QUE UTILIZAM BISFOSFONATOS

SOUSA, Alison Cruz de*; MOURÃO, Thaianne Polanna de Carvalho; OLIVEIRA, Gilliard Lima; SILVA, Natã Felício de Souza; MACIEL, Franscisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: alisonjc7@gmail.com

Os bisfosfonatos são medicamentos amplamente administrados a pacientes portadores de osteoporose, metástases tumorais, mieloma múltiplo, doença de paget. A droga promove apoptose dos osteoclastos e inibe seu recrutamento assim como estimula a atividade osteoblástica reduzindo a reabsorção óssea. A osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos tem sido relatada de forma crescente nos últimos anos, principalmente a pacientes submetidos à procedimentos odontológicos invasivos. O presente estudo avaliou o grau de conhecimento de cirurgiões-dentistas atuantes no município de São Luís MA sobre essa classe de medicamento e o correto manejo odontológico de pacientes que fazem uso de bisfosfonatos. Quando questionados sobre o conhecimento dos bisfosfonatos, 67,1% dos entrevistados responderam conhecer a classe de medicamento sendo que, ao responderem sobre quais procedimentos odontológicos possuem relativa contra indicação aos pacientes usuários dessa classe de medicamentos, apenas 9,6% responderam corretamente, e apenas 13,7% dos cirurgiões-dentistas responderam corretamente quando arguidos sobre o tempo de uso dos bisfosfonatos para interferência no desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares. Portanto, os cirurgiões-dentistas possuem pouco ou nenhum conhecimento desta classe de medicamentos.

EFEITO DO PREPARO BIOMECÂNICO UTILIZANDO INSTRUMENTOS QUE EMPREGAM MOVIMENTOS RECIPROCANTES EM CANAIS RADICULARES CURVOS SIMULADOS

SANTOS, Sara Freitas*; COSTA, Luzia Mayanne Oliveira; COELHO, Matheus Bandeca; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: saramjln@hotmail.com

As limas de níquel-titânio são, atualmente, objeto de vários estudos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa Protaper quanto capacidade de modelar, de preservação da curvatura original e o transporte apical em canais radiculares curvos simulados. Trinta canais radiculares simulados em blocos de resina foram selecionados e divididos aleatoriamente em três grupos (n=10) e preparados utilizando os instrumentos Reciproc, UnicOne e a sequência completa do sistema Protaper. Fotografias padronizadas foram realizadas antes e após a instrumentação dos canais. Após a superposição das imagens, a quantidade de resina removida, tanto da parede interna como da parede externa, assim como, os ângulos de máxima curvatura do canal, antes e após a instrumentação e o transporte do canal radicular foram medidos. Foi aplicado o teste Anova One-way para avaliar se havia diferença das áreas desgastadas internas, externas, total e do transporte do forame entre os grupos. O grupo Reciproc obteve maiores valores de desgaste da parte interna, a UnicOne desgastou de forma semelhante as áreas interna e externa. A Protaper atingiu os maiores valores em relação ao transporte do canal radicular. Todos os instrumentos foram seguros e capazes de manter a curvatura original do canal radicular, no entanto, os instrumentos UnicOne produziram formas mais conservadoras.

CIMENTOS AUTOADESIVOS UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRÁQUETES: UMA COMPARAÇÃO COM MÉTODO TRADICIONAL DE COLAGEM.

SILVA, Valéria Lima da*; FILHO, Etevaldo Matos Maia; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; OLIVEIRA, Rafaelle Caroline da Silva; AZEVEDO, Talita de Oliveira; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: valerialima.fono@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a resistência adesiva entre cimento ortodôntico tradicional para colagem de bráquetes e cimento autoadesivo, avaliando em adição, a influência da asperização na melhora da resistência adesiva, verificando o índice de adesivo remanescente com uso do cimento autoadesivo e sem ele. Trata-se de um estudo final, realizado com 72 corpos de provas, divididos em (G1 e G2) e estes subdivididos em outros 4 (G1A, G1B, G2A e G2B). Utilizando cilindros rígi-

dos de PVC para o preenchimento com resina acrílica, onde foi inserida resina composta nanoparticulada fotopolimerizável Filtek Z350 XT em incremento único, onde receberam profilaxia com pedra-pomes fina, água destilada e taça de borracha, antes da colagem dos acessórios ortodônticos. Realizados os testes de cisalhamento na máquina de ensaio universal EMIC, onde foi operada a uma velocidade de 0,5mm/min, utilizando célula de carga de 50Kg/f, logo após foi utilizada lupa Estereoscópica com aumento de 10 vezes para determinar o IAR, através dos escores preconizados que variaram de 1 a 5, para medir o grau de concordância entre os avaliadores para os valores de IAR. O resultado de 0.954 foi altamente significativo. Os resultados mostraram que o efeito do fator tratamento de superfície foi significativo na resistência de união, enquanto que, não houve diferença para os tipos de resinas, e para a interação resina X tratamento de superfície. Isso sugere que a resistência de união foi maior no grupo em não foi utilizada a asperização.

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO NOTIFICADA

SANTOS, Glauciane Lima dos*; ARAÚJO, Jessica Mayara Mendes; CAMPOS, Gabriela Sellen Lima; LEMOS, Ingrid Gonçalves de; SOUSA, Anna Carolyne Anchieta; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e.

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: cianebio277@gmail.com

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) representam um agravo de grande importância à saúde pública, estando entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde no mundo. Neste trabalho, teve como objetivo identificar as características da população notificada por DST em um Centro de Referência no Município de São Luís-MA, durante o ano de 2012, identificando suas características e a distribuição das principais infecções sexualmente transmissíveis. Trata-se de um estudo documental, retrospectivo com abordagem quantitativa. As informações foram coletadas através da utilização da ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), na versão impressa e analisada através de tabelas e gráficos. Os dados foram analisados e expressos na forma de gráficos. Totalizou-se 1.035 notificações por DST, e a partir dessas, constatou-se que a maior parte da população foram acometidas pelo HPV, pertenciam ao sexo feminino, com faixa etária menor ou igual à 30 anos, possuíam ensino médio completo, da raça/cor parda e residiam no Município de São Luís.

REGISTROS DE ENFERMAGEM: ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA

DOS SANTOS, Glauciane Lima*; CAMPOS, Gabriela Sellen Lima; LEMOS, Ingrid Gonçalves de; RODRIGUES, Karla Regina Costa; VELOSO, Simone Nazaré Silva; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e.

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

E-mail: cianebio277@gmail.com

Os registros de enfermagem possibilitam a mensuração da qualidade da assistência prestada. O presente trabalho teve por objetivo, avaliar os registros de enfermagem através dos prontuários de uma Unidade Básica de Saúde do Município de São Luís. Estudo descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa dos dados, no período de outubro a novembro de 2012. A população foi constituída de todos os clientes que realizaram consulta de enfermagem no período de janeiro a junho de 2012. Elaborou-se um formulário/roteiro com variáveis pertinentes aos objetivos propostos. Verificou-se que 53% dos enfermeiros não seguem o roteiro da sistematização de enfermagem, apenas o histórico de enfermagem estava presente em 94% dos prontuários. Observaram-se nos registros dos prontuários, percentuais de 56% e 75% respectivamente, para realização do diagnóstico de enfermagem e plano assistencial. A evolução de enfermagem não consta em 78% dos prontuários, o prognóstico de enfermagem em relação à letra legível e clara, 69% estavam legíveis; 44% dos erros foram corrigidos sem ocultar o modelo original; 56% apresentavam escrita objetiva; 53% com anotações completas, incluindo descrição de características e informações subjetivas entre aspas. Ressalta-se que, os registros de enfermagem garantem a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, são itens fundamentais para aplicação de uma assistência baseada em princípios éticos e técnicos científicos, devendo, portanto, estar autêntico. Conclui-se que, neste estudo, os registros são escassos e inadequados, e podem comprometer a assistência prestada ao paciente e a equipe de enfermagem.

SOROLOGIA ANTI-HIV: ACONSELHAMENTO ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DO TESTE

CAMPOS, Gabriela Sellen Lima*; DOS ANJOS, Joceli Moreira; DOS SANTOS, Glauciane Lima; DE LEMOS, Ingrid Gonçalves; SILVA, Aniele Aranha; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e.

Curso: Enfermagem
Categoria: Graduação
E-mail: gabrielasellen@gmail.com

O aconselhamento antes e após a realização do teste anti-HIV é um instrumento importante na qualidade do diagnóstico do HIV/AIDS e da atenção a saúde, e tem como componentes o apoio educativo, informativo, emocional e a avaliação de riscos. Esta pesquisa teve como objetivo analisar a prática do aconselhamento para a realização da sorologia Anti-HIV no pré e pós-teste, dos pacientes atendidos na consulta de enfermagem no setor de DST do Centro e Saúde Dr. Genésio Rêgo. Estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, desenvolvido com 70 pacientes que procuraram o serviço de enfermagem no departamento de DST. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário com perguntas fechadas de forma a considerar os objetivos da pesquisa. Os resultados foram apresentados através de tabelas e gráficos, e verificou-se que 51% dos entrevistados eram homens, a faixa etária que prevaleceu foi de 20 a 29 anos com amostragem de 40%, 61% eram casados, 40% tinham o ensino médio completo, 81% com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, um número significativo dos entrevistados, 76% diziam não conhecer as DST's antes do aconselhamento, 97% receberam aconselhamento no pré-teste e 100% dos entrevistados receberam aconselhamento no pós-teste. Ficou evidente que o aconselhamento é realizado durante a consulta de enfermagem, porém o profissional deve investir na orientação e troca de informações sobre as DST's, estimulando a adoção de práticas mais seguras para a redução de riscos.

ESTILO DE VIDA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM A PARTIR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL

CAMPOS, Gabriela Sellen Lima*; LEMOS, Ingrid Gonçalves de; PINTO, Bruna Lorrana dos Santos; SOUZA, Eliene Batista; SANTOS, Glauciane Lima dos Santos; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho e.

Curso: Enfermagem
Categoria: Graduação
E-mail: gabrielasellen@gmail.com

A hipertensão arterial representa um grave problema da saúde pública, pois atinge uma dimensão mundial e por constituir um dos fatores de risco para inúmeras doenças cardiovasculares. O desenvolvimento da HAS tem relação direta com a ausência de hábitos de vida saudáveis, como o sedentarismo, má alimentação, obesidade, etilismo, entre outros. Neste trabalho, teve-se por objetivo analisar se houve mudança no estilo de vida a partir do conhecimento adquirido sobre hipertensão arterial entre acadêmicos de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior privada em São Luís-MA. A pesquisa foi do tipo analítico-seccional, de campo, com levantamento de dados, quantitativo em uma amostragem aleatória. As informações foram coletadas através de questionários aplicados na Universidade Ceuma, com questões abertas e fechadas, elaboradas pelas próprias alunas do curso de enfermagem. Constituem a amostra do estudo, os acadêmicos do 1º e 7º período do curso de enfermagem. Na avaliação dos dados coletados, utilizou-se o teste estatístico Qui-Quadrado, com nível de significância, $\alpha=0,05$. Constatou-se nesta pesquisa, que não houve mudança significativa do estilo de vida dos acadêmicos de enfermagem mesmo com todo o aprendizado sobre a patologia, seus fatores de risco e do impacto da doença no organismo. Diante dos resultados encontrados, evidencia-se a importância de conscientizar os alunos para aquisição de um estilo de vida saudável, pois eliminando os fatores de risco modificáveis, por conseguinte, diminui-se a chance de adquirir futuramente a patologia.

O CONTEXTO SOCIAL DE VIOLÊNCIA E SUA INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO ALUNO E PROFESSOR

COSTA, Sílvia Dileli*; CAPELLI, Maria Angela; FONSÊCA, Fabíola Costa Ferreira; PAIVA, Quézia Fernandes; NUES, Wellin Adna Ferreira; BECKMAN, Márcia Valéria Reis

Curso: Psicologia
Categoria: Graduação
E-mail: dileli@oi.com.br

Este trabalho visa apresentar e discutir os resultados iniciais de uma proposta de extensão em Psicologia Escolar, cujo objetivo foi a observação do contexto social de violência e sua influência na relação aluno e professor de escola pública do município de São Luís. A escola é frequentada por adolescentes de baixa renda que convivem diariamente, com a violência de uma forma geral. O objetivo principal deste trabalho foi conhecer e discutir os limites entre a teoria e a prática das demandas reais de escolas públicas. A intervenção envolveu a utilização de entrevistas; feitas com alunos, professores e gestores, observações quanto a dinâmica de funcionamento da instituição e questionários. Os resultados

obtidos revelam a angústia dos educadores por fazer da escola um espaço que, para além de transmitir informações, conteúdos e cultura, promova uma interação social, pautada numa realidade de paz e segurança, onde seja possível identificar as potencialidades de seus alunos, estimulá-los a uma visão de construção que os possibilitem a fazer novas escolhas e a partir delas, mudar a realidade de violência que são geradores de altos índices de absenteísmo e desestruturação no desenvolvimento.

O AMBIENTE DE TRABALHO DA BIBLIOTECA DE UMA UNIVERSIDADE SOB A PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

DE OLIVEIRA, Emille Nogueira*; FERRAZ, Tanilea; SÁ, Elenide Rodrigues; FERREIRA, Raissa; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: emille.oliveira@hotmail.com

Estudo de delineamento transversal aprovado em 28/04/14 com parecer 629971, realizado na Biblioteca Presidente José Sarney, com o objetivo de avaliar o ambiente de trabalho de uma biblioteca sob a percepção dos funcionários, identificar o nível de satisfação dos funcionários quanto ao conforto de mobiliário e conforto ambiental, além de investigar o aparecimento de dores osteomusculares nos funcionários. Foram aplicados três questionários em 21 funcionários. Em relação ao conforto térmico, 51% dos funcionários consideraram a temperatura do ambiente laboral como confortável, 76% consideraram o mobiliário devidamente adequado e 95% afirmaram sentir dor. Há uma avaliação positiva em relação à satisfação dos funcionários tanto ao conforto mobiliário quanto ambiental. No entanto houve grande sintomatologia dolorosa.

ESTILO DE VIDA E HÁBITOS ALIMENTARES DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DO UNICEUMA: COMO ESTAMOS?

SILVEIRA, Maycon Tércio Pinto*; CARVALHO, Laíse Neves;

DIAS, Rosane da Silva; FERREIRA, Patricia Rodrigues; CARVALHO, Laíse Nevez.

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

Email: kekao@hotmail.com

Este trabalho tem como objetivo descrever o estilo de vida e hábitos alimentares de graduandos de fisioterapia da Universidade Ceuma. Estudos descrevem que os jovens, incluindo os estudantes universitários, apresentam alto percentual de comportamentos de risco para saúde, como o consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, o que contribui para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e metabólicas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal, observacional realizado no período entre abril e maio de 2013, na Universidade Ceuma, com 40 graduandos do curso de fisioterapia, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 28 anos, matriculados do primeiro ao oitavo período. Para coleta de dados foi aplicado o questionário National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para utilização com universitários brasileiros, composto por 52 questões. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Ceuma com número de parecer 372.391. Dentre os inclusos na pesquisa apenas 25% realizam atividade física. No que diz respeito a alimentação, 62,5% relataram uso de frutas e 60% saladas no dia anterior a pesquisa, porém, do mesmo período 50% relatam consumo de hambúrgueres e 67,5% biscoitos. Os achados desse estudo demonstram a necessidade de programas educativos específicos para população estudada.

CUIDANDO DE QUEM CUIDA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE REPERCUSSÕES NA VIDA DO CUIDADOR FAMILIAR

SOUSA, Vanessa Patricia Lima*; MONTEIRO, Luzianne Braz;

SILVA, Willkaro White Halley Soares; CORTEZ, Denise Carneiro Machado

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: vanessalima.p.s@gmail.com

O cuidador principal tem um papel fundamental no cuidar do doente, porém o ato de cuidar acarreta desgastes em sua saúde física e mental que, se não tratados, representam fatores de risco para o desenvolvimento de enfermida-

des. Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido durante o estágio supervisionado I por acadêmicas do 9º período do curso de graduação em enfermagem, através das visitas domiciliares a uma senhora que presta cuidado ao seu irmão idoso acamado sequelado pós sofrer AVC. Cuidadora D.J.S., sexo feminino, 63 anos, aposentada com um salário mínimo, ensino fundamental completo é prestadora de cuidados ao seu irmão a 08 anos, ao qual sofreu de AVC, acamado, desnutrido e com úlceras por pressão. Na residência moram 03 pessoas, sendo que a outra pessoa é seu companheiro. Através deste estudo foi identificado que esta sofre grande desgaste emocional e físico, relatou as mudanças e dificuldades enfrentadas desde que passou a ser cuidadora, sofre insônia, dores musculares e dor na coluna. Em relação à repercussão na sua vida como cuidadora, esta deixa de realizar muitas de suas atividades cotidianas, em favor dos cuidados dispensados, devido o portador necessitar de dedicação exclusiva. O estudo realizado proporcionou observar a limitações e mudanças no estilo de vida do cuidador. Além disso, verificou-se a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde do cuidador, proporcionando assim, qualidade de vida para quem é cuidado e para quem cuida.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA DISCIPLINA SAÚDE DA MULHER

DE SOUZA, Tatiana Almeida*; SANTOS, Nailde Melo

Curso: Enfermagem

Categoria: Graduação

Email: tatianaalmeida91@hotmail.com

Introdução: O processo de aprendizagem prática da disciplina de Saúde da Mulher busca o desenvolvimento de conhecimentos, técnicas, procedimentos próprios dos serviços de saúde e da assistência da mulher, do recém-nascido e da família. Oferecendo aos acadêmicos instrumentos para um melhor aprendizado na disciplina tornando-os mais preparados para atuar no período de estágio. **Objetivo:** Relatar as experiências obtidas durante a prática da disciplina Saúde da Mulher através de método observacional. **Material e Métodos:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em uma Universidade Particular, São Luís – Maranhão. Durante o período foi desenvolvido o processo ensino aprendizagem sobre o cuidar de gestantes e parturientes, com foco no papel da assistência de enfermagem e de suas funções quanto à execução do parto em condições normais e cirúrgicas. **Resultados e Discussão:** Proporcionou antecipar conhecimentos que seriam adquiridos em outro momento e, vivenciar os conhecimentos já administrados na disciplina. Permitiu também conhecer o ambiente e rotina do centro cirúrgico obstétrico, das salas de pré-parto, parto e conhecer a atuação das enfermeiras obstétricas nesse processo. **Conclusão:** Através da observação, concluiu-se que as enfermeiras exercem contribuição significativa no cuidado individual e humanizada as mulheres, juntamente com a equipe multidisciplinar.

ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

DA SILVA, Valdiney Ferreira *; DE ABREU, Osilene Carvalho; BARROS, Pâmella Deyla da Silva; NARDACI, Patrícia Figuerêdo; CUTRIM, Regina França; DA SILVA, Mae Soares *

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: valdineypsi@bol.com.br

Análise crítica do acesso à informação sobre os serviços da Atenção Básica em Saúde (ABS) no Município de São Luís-MA realizada pelo Grupo de Discussão de Temas em ABS, constituído por uma Professora Mestre em Saúde Coletiva e cinco alunos do 6º período do curso de Psicologia da Universidade CEUMA. Foi utilizado o relato de experiência de 30 alunos do 6º período, sobre visitas realizadas a dez Unidades Básicas de Saúde (UBS), situadas em seis dos sete Distritos Sanitários do Município. A análise dos relatos utilizou o princípio da Universalidade; a participação popular; a Lei No 12.527, de acesso à informação; a carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e as Políticas Nacional de Atenção Básica em Saúde e de Humanização em Saúde. Os dados foram agrupados em dois temas: o desconhecimento das ações da ABS e as barreiras de acesso à informação sobre os serviços. Verificou-se que os serviços não estão organizados para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva na atenção à saúde e o estímulo à participação popular e construção de vínculo da UBS com a comunidade é deficiente. Reconhece-se a necessidade de pesquisas que contribuam para a elaboração de estratégias de ação junto à comunidade para valorização da ABS; maior investimento na educação popular quanto às ações desenvolvidas nesse campo e capacitação dos profissionais da ABS para a aplicação da Lei de Acesso à Informação como um aspecto de humanização.

DIFICULDADES DE LEITURA E BAIXA VISÃO ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR ALUNA DO ENSINO TÉCNICO

SILVA, Sileila Alves Ramos*; MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro; FAÇANHA, Rachel Costa; FAÇANHA, Rachel Costa

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: sileila.ramos@yahoo.com.br

Este estudo tem por objetivo analisar quais estratégias utilizadas por aluna de baixa visão. A pesquisa, de cunho qualitativo do tipo estudo de caso, foi realizada no Atendimento Educacional especializado (AEE) da escola com 01 aluna. A coleta de dados foi realizada com uma aluna através de aplicação de um questionário confeccionado pelas investigadoras que continham perguntas referentes: características pessoais, uso de recursos de tecnologia assistiva na leitura, razões das atividades de leitura e frequência da leitura. Foi um estudo de caso com uma aluna com baixa visão, 18 anos, sexo feminino. Os resultados indicaram que a aluna utiliza auxílios ópticos nas atividades de leitura. Declarou utilizar a leitura para obter informações sobre assuntos que a interessa e estudar para concurso. Verificou-se que a aluna utiliza a leitura, mas não a escrita com a mesma frequência, mas que com diminuição da capacidade visual apresenta muito cansaço visual. No caso estudado mesmo com a redução do uso da escrita não comprometeu sua autonomia e independência, no entanto necessita de uma ênfase no trabalho com a linguagem escrita que poderá ser maximizado por meio da atenção fonoaudiológica.

HABILIDADES SOCIAIS COM ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DE INTERVENÇÃO EM GRUPO

CAVALCANTE, Renata Teresa Sousa*; FONSECA, Cristiane

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: renatinhatscavalcante@hotmail.com

Este estudo teve como objetivo analisar o repertório de habilidades sociais de adolescentes em cumprimentos de medidas socioeducativas e intervir, por meio de um programa terapêutico, desenvolvido em grupo, a partir do método quase experimental, com análise de dados quantitativa, no qual se buscou verificar se o procedimento utilizado poderia favorecer aos adolescentes a possibilidade de analisarem funcionalmente seus comportamentos por meio da quantificação de Comportamentos Clinicamente Relevante (CRB's) dos tipos 1, 2 e 3. Buscou-se desenvolver um trabalho de ação que pudesse favorecer ao adolescente o desenvolvimento de habilidades necessárias para a reinserção social.

Levando em consideração que os sentimentos de insegurança diante das mudanças físicas e psicológicas fazem com que os adolescentes não desenvolvam algumas habilidades sociais de forma adequada, o que pode levá-los a cometer atos infracionais. Com o despreparo frente a essas mudanças, o adolescente busca interagir socialmente, e os déficits de habilidades sociais são um dos fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos agressivos, transtorno de conduta e delinquência (Del Prette & Del Prette, 1996).

Para essa investigação, foi realizada uma pesquisa de campo, através de uma adaptação de um programa terapêutico de dinâmica de grupo desenvolvido por Fonseca (2013), composto por três fases. Como recurso adicional foi utilizado o IHSA - Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA-Del-Prette, 2009). Em todos os momentos da pesquisa, contou-se com a presença da pesquisadora e de um assistente, com a função de observar e quantificar: frequência de padrões de comportamentos assertivos, passivos e agressivos e a frequência de CRB's que estavam dentro das categorias previamente definidas. A pesquisa foi aplicada no Centro da Juventude Nova Jerusalém, a Unidade de semiliberdade da FUNAC (Fundação da Criança e do Adolescente) as atividades foram desenvolvidas com 4(quatro) adolescentes com idades entre 17 a 19 anos, as intervenções foram realizadas ao longo de 1 mês.

Constatamos que a intervenção utilizada foi efetiva, pois, em grupo observamos de fato, um ambiente semelhante ao real; e que a interação com as outras pessoas favorece a ocorrência significativa de CRB1, possibilitando a intervenção. A metodologia proposta contribuiu para a ocorrência de CRB3, ao se propor antecedentes que contribuíram para que eles analisassem funcionalmente seus comportamentos. Tal situação foi confirmada através das frequentes verbalizações observadas, compatíveis com estas classes de respostas e favorecendo também a ocorrência de CRB2. Ou seja, ensinar os adolescentes a fazerem análises adequadas dos seus comportamentos e avaliando suas possibilidades, contribuiu para a ocorrência de comportamentos mais adequados (CRB2), o que sinaliza uma possível mudança. Os adolescentes apresentaram comportamentos de melhora ao emitirem respostas assertivas e empáticas, até então não observadas durante as atividades.

Portanto, trata-se de uma intervenção que realmente pôde ser eficaz para o desenvolvimento de habilidades que contribuem para a qualidade na interação social. Melhorando os déficits observados, os adolescentes podem desenvolver

padrões de comportamentos adequados, o que pode oportunizar, a estes, acesso a reforçadores sociais e, nesse sentido, aumentar a autoestima, a autoconfiança e possibilitar a diminuição de padrões considerados antissociais.

EFEITO DO EXTRATO DE MASTRUZ SOBRE BIOFILMES DE CANDIDA ALBICANS EM SUPERFÍCIE DE RESINA ACRÍLICA

CARVALHO, Leticia Torres*; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini; DE SOUSA, Eduardo Martins; MADEIRA, Petrus Levid Barros; SILVA, Breno Mont'Alverne Hadadde; GONÇALVES, Leticia Machado; SOUSA, Eduardo Martins

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: leticiatorres_carvalho@hotmail.com

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito do extrato de mastruz sobre biofilmes de *Candida albicans* desenvolvido em superfície de resina acrílica para prótese dental. Inicialmente foi investigada a susceptibilidade de *C. albicans* ATCC 18804 ao extrato hidro-alcoólico das folhas do mastruz através dos testes de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima (CFM). Para avaliar o efeito do extrato nos biofilmes, foram confeccionados discos de resina acrílica (10x2mm), os quais tiveram sua rugosidade padronizada. Após, foi formada película de saliva sobre estes discos e, em seguida, biofilmes de *C. albicans* ATCC 18804 foram desenvolvidos por 72 horas. Os biofilmes foram imersos em um dos tratamentos por 10 minutos: água destilada, hipoclorito de sódio a 1%, extrato de mastruz na CIM ou 5xCIM. Em seguida, os biofilmes foram submetidos à contagem de células viáveis. Os dados foram analisados por ANOVA seguido do teste de Tukey ($p < 0,05$). Nos testes de susceptibilidade, os valores de CIM e CFM foram coincidentes, sendo necessário 0,25 mg/mL de extrato para inibir e/ou matar as células planctônicas de *C. albicans*. Já nos resultados para biofilmes, observou-se que a imersão na CIM foi suficiente para reduzir aproximadamente 90% das células viáveis ($p < 0,001$). O extrato na 5xCIM apresentou efeito similar ao hipoclorito a 1% ($p = 1,00$), eliminando todas as células dos biofilmes. Considerando as limitações deste estudo, os resultados apontam que a imersão da resina acrílica em extrato de mastruz foi um método eficiente para a redução de biofilmes de *C. albicans*.

PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE COM DOR ARTICULAR: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

FIGUEIREDO, Lays Azulay*; CORREA, Silvan; DA SILVA, Aldifran

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: laysazulay87@gmail.com

Estima-se que pelo menos 50% a 60% da população apresentam alguma desordem da Articulação temporomandibular (ATM), seja ela uma Disfunção Miofacial, Desarranjos Internos ou uma Doença Articular Degenerativa. A Artrite Reumatóide constitui a principal alteração articular degenerativa e é tida como um doença sistêmica autoimune do tecido conjuntivo, crônica, inflamatória, de etiologia desconhecida e de conotação multifatorial e que pode levar à deformidade e destruição das articulações em virtude da erosão óssea e da cartilagem. A probabilidade de um paciente como a Artrite Reumatóide desenvolver sintomas na ATM está correlacionada à severidade e à duração da doença sistêmica, podendo, inclusive, diminuir a expectativa de vida em cinco a dez anos. A frequência de envolvimento a ATM varia de 4,7% a 84% e os sintomas mais frequentes relatados na ATM são algias, edema, crepitação, rigidez ao abrir a boca e limitação do movimento, variando de estudo para estudo. Diante do pouco estudo sobre o assunto na literatura internacional e nacional, haja vista que no Brasil as últimas pesquisas datam de 1970 a 1979 e a crescente causa de invalidez por conta da AR -segunda no ranking, perdendo apenas para a osteoartrite periférica-, a presente pesquisa se compromete em investigar as repercussões das algias nas ATMs em pacientes portadores de Artrite Reumatóide assistidos no Hospital Santa Casa de Misericórdia em São Luís-MA.

PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE COM DOR ARTICULAR: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

FIGUEIREDO, Lays Azulay*; CORREA, Silvan; DA SILVA, Aldifran

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: laysazulay87@gmail.com

Estima-se que pelo menos 50% a 60% da população apresentam alguma desordem da Articulação temporomandibular (ATM), seja ela uma Disfunção Miofacial, Desarranjos Internos ou uma Doença Articular Degenerativa. A Artrite Reumatóide constitui a principal alteração articular degenerativa e é tida como um doença sistêmica autoimune do tecido conjuntivo, crônica, inflamatória, de etiologia desconhecida e de conotação multifatorial e que pode levar à deformidade e destruição das articulações em virtude da erosão óssea e da cartilagem. A probabilidade de um paciente como a Artrite Reumatóide desenvolver sintomas na ATM está correlacionada à severidade e à duração da doença sistêmica, podendo, inclusive, diminuir a expectativa de vida em cinco a dez anos. A frequência de envolvimento a ATM varia de 4,7% a 84% e os sintomas mais frequentes relatados na ATM são algias, edema, crepitação, rigidez ao abrir a boca e limitação do movimento, variando de estudo para estudo. Diante do pouco estudo sobre o assunto na literatura internacional e nacional, haja vista que no Brasil as últimas pesquisas datam de 1970 a 1979 e a crescente causa de invalidez por conta da AR -segunda no ranking, perdendo apenas para a osteoartrite periférica-, a presente pesquisa se compromete em investigar as repercussões das algias nas ATMs em pacientes portadores de Artrite Reumatóide assistidos no Hospital Santa Casa de Misericórdia em São Luís-MA.

ESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) NA CIDADE DE BACABAL

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro de*; MARTINS, Hérika Pollyana S.; SANTOS, Natálio Lima dos; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino; VASCONCELOS, Adriana Araujo

Orientador: NUNES, Gilbeth Silva

Co-Orientador: MAGALHÃES, Bruna Cruz

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: celeniaaguiar@hotmail.com

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é considerada como a unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha atividades relacionadas à alimentação e à nutrição. Avaliar o estado físico-funcional da área de produção de uma UAN da cidade de Bacabal, MA. Consistiu na avaliação e descrição das principais características do estabelecimento através da aplicação de check-list conforme a RDC nº275/2002 da ANVISA. A rotina da UAN foi acompanhada diariamente e assim foi possível fazer um levantamento da situação atual das áreas físicas. Constatou-se que a Unidade segue seu funcionamento de acordo com a RDC nº216/2004 da ANVISA, sendo aplicados de forma assídua os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP's) de Higiene das Instalações Físicas. Quanto à localização, possui fachada grande e ampla, pavimentada. O salão é amplo e possui paredes de cores claras, alguns espelhos e vidraça que permitem visualizar todo o ambiente. A área de produção da UAN é um local claro com piso de fácil higienização, portas lisas e livres de rachaduras possui iluminação natural e artificial, composta de ventilação natural, favorecida por exaustores. Os garçons não transitam na mesma, para que assim não haja eventuais contaminações da área externa a área de preparação. Os equipamentos que a compõe encontram-se em bom estado de conservação, a higienização das instalações, equipamentos é feita com frequência. Assim, foi possível averiguar que o estabelecimento em questão fornece uma alimentação nutritiva e equilibrada além de proporcionar refeições seguras do ponto de vista higiênico sanitárias.

BURNOUT: PREVINA-SE

MAGALHÃES, Eliane Ribeiro*; ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima; MELO, Kerlyne

Orientador: BECKMAN, Marcia

Categoria: Graduação

Curso: Psicologia

E-mail: liviaguedesandrade@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo analisar, através de pesquisas e questionários aplicados a professores de uma escola de São Luís-Maranhão, as relações entre o trabalho dos docentes e o processo de adoecimento desses profissionais que ameaça sua saúde e, conseqüentemente, o ensino-aprendizagem de seus alunos.

O foco principal é despertar nos profissionais da educação o que é, como surge, qual o melhor tratamento e como evitar a síndrome de burnout, também conhecida como doença ocupacional, visando ao uso adequado de suas atividades.

Por ser uma síndrome pouco divulgada e compreendida, seu reconhecimento só é possível através de alguns sinais: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal que podem afetar o educador, ameaçando todo o contexto escolar.

Os dados obtidos com o questionário aplicado permitiram que se tivesse uma visão da insatisfação dos docentes, pois se veem cada vez mais incumbidos de atribuições e exigências difíceis de serem alcançadas e que os levam, muitas vezes, a problemas físicos, psíquicos e sociais e impotentes para modificar tal realidade, começam as formas de evasão, como desinteresse, acomodação, abandono do emprego e até da profissão.

A prevenção continua sendo o melhor remédio, então seria viável que o psicólogo escolar, juntamente com uma equipe multidisciplinar, delineasse estratégias para evitar ou amenizar o estresse decorrente do ambiente de trabalho, incentivando os educadores a programarem melhor as atividades do dia, cuidarem do corpo e da mente e buscarem qualidade nas relações interpessoais em prol de um desenvolvimento pessoal e profissional mais saudável.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE BRAQUETES COLADOS EM RESINA COMPOSTA COM E SEM ASPERIZAÇÃO

OLIVEIRA, RAFAELLE CAROLINE DA SILVA*; FILHO, Etevaldo Maia;
SAMPAIO, Francisca Greyce; PENHA, Karla Janilee de Sousa; SILVA, Valéria Lima

Orientador: FIALHO, Melissa Proença

Co-Orientador: VERCELIN, Célia

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: ccrafaelle@hotmail.com

O objetivo deste estudo experimental e randomizado foi testar a hipótese nula de que não há diferença na resistência ao cisalhamento de braquetes ortodônticos colados sobre resina composta nanoparticulada Z350 (3M) ou microhíbrida Z250 (3M), com ou sem, asperização prévia com broca diamantada. Adicionalmente, avaliou-se o índice de adesivo remanescente (IAR). Foram utilizados 72 corpos de prova, divididos em 4 grupos (n=18) : G1A- braquetes colados em resina nanoparticulada com asperização prévia; G1B- braquetes colados em resina nanoparticulada sem asperização prévia; G2A- braquetes colados em resina microhíbrida com asperização prévia; G2B - braquetes colados em resina microhíbrida sem asperização prévia. Em todos os grupos previamente a colagem foi realizado acabamento, polimento, profilaxia e o protocolo de adesão foi de acordo com os fabricantes. Os procedimentos foram realizados pela mesma operadora (Rafaelle Caroline da Silva Oliveira). Os testes de cisalhamento foram realizados na máquina de ensaio universal (EMIC) utilizando célula de carga de 50 kgf a uma velocidade de 0,5 mm/min. Os resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa na resistência de união entre os tipos de resinas avaliadas ($p > 0,05$), assim como a análise do IAR, entretanto, a análise revelou que o efeito principal devido ao fator tratamento de superfície foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$) e foi maior no grupo em que a asperização não foi utilizada.

AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE O MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES QUE FAZEM USO DE BISFOSFONATOS

SOUSA, Alison Cruz*; Silva, SOUZA, Natã Felício; OLIVEIRA, Gilliard Lima;
MACIEL, Francisco Jose Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Os bisfosfonatos são medicamentos amplamente administrados a pacientes portadores de osteoporose, metástases tumorais, mieloma múltiplo, doença de paget. A droga promove apoptose dos osteoclastos e inibe seu recrutamento assim como estimula a atividade osteoblástica reduzindo a reabsorção óssea. A osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos tem sido relatada de forma crescente nos últimos anos principalmente a pacientes submetidos a procedimentos odontológicos invasivos. O presente estudo avaliou o grau de conhecimento de cirurgiões dentistas atuantes no município de São Luís MA sobre essa classe de medicamento e o correto manejo odontológico de pacientes que fazem uso de bisfosfonatos. Quando questionados sobre o conhecimento dos bisfosfonatos 67,1% dos entrevistados responderam conhecer a classe de medicamento sendo que, ao responderem sobre quais procedimentos odontológicos possuem relativa contra indicação aos pacientes usuários dessa classe de medicamentos apenas 9,6% responderam corretamente, e apenas 13,7% dos cirurgiões dentistas responderam corretamente quando arguidos sobre o tempo de uso dos bisfosfonatos para interferência no desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares. Portanto os cirurgiões dentistas possuem pouco ou nenhum conhecimento desta classe de medicamentos.

PAINEL CASO CLÍNICO

EXÉRESE DE TORUS BILATERAL MANDIBULAR

SOUSA, Alison Cruz*; Silva, SOUZA, Natã Felício; OLIVEIRA, Gilliard Lima; MACIEL, Francisco Jose Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Tórus, exostose óssea ou hiperostose é uma alteração de desenvolvimento relativamente comum onde ocorre crescimento ósseo protuberante e pode ser diagnosticado como palatino ou lingual. Sua etiologia é incerta, podendo ser associado fatores genéticos, alterações funcionais, e características raciais. É assintomática que, em geral, não causa danos ao paciente, todavia a sua remoção é frequentemente indicada quando há problemas funcionais como: traumas frequentes, problemas fonéticos, mastigatórios e posicionamento anormal da língua, ou impossibilitar a adaptação de trabalhos protéticos. Essa alteração apresenta-se como osso compacto interposto por osso esponjoso semelhante a estrutura óssea de sua região. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência de exérese de tórus bilateral mandibular, paciente MCA, 52 anos que procurou a clínica integrada I para tratamento odontológico. Paciente segue em acompanhamento e apresenta-se em bom estado geral, sem sinais de infecção e com cicatrização dentro da normalidade expressada pela literatura.

PAINEL DE REVISÃO DE LITERATURA

USO DE ANESTÉSICOS EM CRIANÇAS

RAMOS, Allan Moura*; PESSOA, Thalita Fonseca; ARAÚJO, Randerson de Sousa; MACIEL, Francisco Jose Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Os anestésicos são as drogas mais utilizadas na Odontologia. A prevenção da dor durante procedimentos odontológicos é importante para uma boa relação entre o cirurgião-dentista e o paciente, principalmente quando se trata de crianças. Os anestésicos tópicos são utilizados para a criança não sentir a dor da picada da agulha, evitando assim aumentar o nível de tensão da criança, sendo o mais utilizado a benzocaína, por ter efeito mais rápido. Os anestésicos locais indicados são lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 ou 1:1200.000, articaína 4% com epinefrina na mesma proporção do anterior também pode ser utilizada, porém apenas para crianças maiores de 4 anos. Se a criança apresenta alergia a epinefrina, devido ao sulfito, pode ser utilizado a prilocaína 3% com felipressina, com devido cuidado quanto a dosagem. O problema quanto aos anestésicos de maior duração é porque as crianças ficam mordiscando os tecidos moles, assim quando cessa o efeito anestésico ela sente injúria. O dentista deve ficar atento à dosagem do anestésico, que tem relação direta com o peso da criança, para não exceder a dose e causar danos. Portanto, o conhecimento quanto às técnicas anestésicas juntamente anatomia é de extrema importância, para evitar que ocorra uma superdosagem devido ao erro de técnica.

MOSTRA PET- SAÚDE

DERMATITE DE FRAUDAS: ORIENTAÇÕES HIGIÊNICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ALVES, Thaís Costa*; COSTA, Raysa Hellen Assunção; SOUSA, Vanessa Patricia Lima; ANDRADE, Elaine Pereira; CARVALHO, Laise Neves; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: thais_costalves@hotmail.com

A dermatite de fraudas conhecida como “assadura” é uma desordem comum nos bebês de 4 a 15 meses de idade e caracteriza-se por reação inflamatória aguda da pele na área coberta pela fraude. Foi realizado um levantamento bibliográfico com 10 artigos científicos no banco de dados do Lilacs e Scielo, entre os anos de 2007 a 2012. O Objetivo do presente

trabalho visa o conhecimento da patologia, o quadro clínico e o tratamento. A dermatite de fraldas podem ser uma dermatite não alérgica e irritativa, quando as lesões são provocadas por fricção, suor e contato prolongado com fezes e urina, geralmente causada por fungo *Candida* que cresce em locais quentes e úmidos. A dermatite de contato alérgica é causada por reação de hipersensibilidade a componentes presentes na fralda, são lesões eritematosas, confluentes e podem evoluir para vesículas. Podem surgir áreas inflamadas no escroto e pênis dos meninos ou nos lábios e vagina das meninas. Em caso de dermatite alérgica, solicita-se testes de contato, corticóides tópicos e troca da fralda. No caso de dermatite não alérgica, o tratamento consiste em incentivo aos cuidados de higiene, lavar as mãos, manter a área da fralda limpa e seca, trocar a fralda frequentemente, deixar a fralda folgada, pomadas com Óxido de Zinco e não usar lenços com álcool ou perfume. Diante do exposto, conclui-se que as orientações higiênicas transmitidas durante a consulta na unidade básica são fundamentais para a prevenção e tratamento das dermatites de fraldas, visando uma melhor qualidade de vida infantil.

FATORES DE RISCO PARA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO EM CRIANÇAS ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

ALVES, Raissa Neruza Santana*; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; PEREIRA, Eugênia Aires; CARVALHO, Laíse Neves; CAMPOS, Hilda Thalita Jardim Lobo.

Categoria: Graduação

Email: raissalp17@hotmail.com

O presente estudo visa descrever os fatores de risco para apnéia obstrutiva do sono em crianças assistidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio no qual o indivíduo sofre breves paradas respiratórias enquanto dorme. Levando em consideração que essa patologia em crianças é causada pela obstrução parcial, prolongada ou completa das vias aéreas, estudos descrevem que a mesma cause prejuízos notáveis a saúde global dessa população. Foi realizado estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo coorte transversal com crianças de ambos os sexos e idade de 0 a 5 anos, assistidas pelo programa de assistência a criança de quatro unidades básicas de saúde da cidade de São Luís/MA. Foram coletados dados referentes a posição predominante do sono, presença de ronco, presença de sialorréia e sono agitado. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2013 a março de 2014 com um questionário formulado pelos preceptores do programa Pet-saúde Redes do Uniceuma sendo a coleta realizada pelos alunos do programa que foram previamente treinados. Dentre as 219 crianças analisadas, 44,3% (97) dormem predominantemente em decúbito lateral, 24,2% (53) em decúbito supino, 21,9% (48) em prono. Na amostra, 26,5% (58) ronca 37,9% (83) apresentaram sialorréia e 38,8% (85) tem o sono agitado. Levando em consideração a significativa presença dessas alterações pode-se considerar de extrema importância uma maior investigação das mesmas a fim de tornar esse conhecimento uma ferramenta utilizada para facilitar o diagnóstico e intervenção dos profissionais da saúde na apneia obstrutiva do sono em crianças.

AMAMENTAÇÃO: OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DA MULHER

ALVES, Thaís Costa*; SANTOS, Mirla Kalina Silva; ANDRADE, Elaine Pereira; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; COSTA, Raysa Hellen Assunção; CARVALHO, Laíse Neves; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: thaís_costalves@hotmail.com

A amamentação tem sido estudada com enfoque nos benefícios que traz à criança, como prevenção de doenças e promoção de saúde na primeira infância, mas recentemente estudos apontam que a mulher também é beneficiada em sua saúde física e emocional. O objetivo deste estudo é identificar e comentar os principais benefícios que a amamentação traz à saúde da mãe. Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos das bases de dados Scielo e Lilacs, publicados no período de 2004 a 2013. Dentre as implicações físicas para a mãe que amamenta tem-se a diminuição do risco de câncer de mama e de ovário, retorno ao peso pré-gestacional mais precocemente, menor sangramento uterino pós-parto, menor risco de morte por artrite reumatóide, amenorréia gestacional e aumento do espaço intergestacional. Nos benefícios emocionais observa-se satisfação do instinto maternal, redução do estresse e do mau humor e sensação de bem-estar. Conclui-se que pela série de benefícios apresentados, é necessário o desenvolvimento de estratégias de intervenção, proteção e apoio ao aleitamento materno, desenvolvidas em unidades básicas de saúde e na comunidade, que orientem a mulher quanto às vantagens da amamentação para a sua saúde.

IMPACTO DA DIARRÉIA AGUDA NA SAÚDE DA CRIANÇA

ANDRADE, Elaine Pereira; ALVES, Thaís Costa; SANTOS, Mirla Kalina Silva; SOUSA, Vanessa Patrícia Lima; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: elaineandrad@hotmail.com

A doença diarreica aguda (DDA) é uma das patologias mais comuns em crianças em todo o mundo, caracterizando-se pelo aparecimento abrupto. A DDA consiste em uma alteração das funções gastrintestinais, que leva a ocorrência de três ou mais evacuações de consistência amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas. As diarreias representam a segunda maior causa de consulta médica, precedida apenas pelas doenças respiratórias agudas. Objetivou-se no presente trabalho, avaliar as manifestações diarreicas prevalentes na infância, a partir de levantamento bibliográfico de artigos disponíveis na base de dados BIREME e SCIELO compreendendo o período de 2011 a 2013. Utilizou-se como descritores: diarreia, infância e criança. Foram selecionados 15 artigos que apontavam que cerca de dois milhões de crianças morrem a cada ano nos países subdesenvolvidos em consequência de doenças diarreicas, segunda maior causa de morte em crianças com menos de 5 anos de idade. As complicações mais frequentes decorrem da desidratação e desequilíbrio hidroeletrólítico. Notou-se na elaboração desta revisão, o papel protetor do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida nas afecções gastrointestinais. Cabe salientar alguns fatores determinantes para essa situação, como: condições socioeconômicas precárias, baixo peso, desmame precoce, condições sazonais, menor idade e escolaridade da mãe, entre outros. Diante do exposto, observa-se que a síndrome diarreica representa elevado índice de morbimortalidade, sendo de suma importância a avaliação dos parâmetros relativos a esta, na tentativa de reduzir tais dados e promover uma melhor qualidade no crescimento e desenvolvimento da criança.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM SALA DE ESPERA

ANDRADE, Elaine Pereira*; ALVES, Thaís Costa; SANTOS, Mirla Kalina Silva; SOUSA, Vanessa Patricia Lima; RODRIGUES, Samara Braz; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: elaineandrad@hotmail.com

O exame preventivo do câncer do colo do útero é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. É realizado oportunamente nas consultas de planejamento familiar, pré-natal e ginecológica. O presente trabalho visa identificar o perfil de mulheres em sala de espera no Centro de Saúde AMAR, avaliando o conhecimento e adesão ao exame citopatológico. A ação foi desenvolvida através de palestra sobre o tema, e na ocasião, houve aplicação de questionário que abordava: periodicidade do exame e uso de método contraceptivo, além da distribuição de folder contendo informações sobre exame citopatológico e câncer de colo do útero. Analisando os dados das 50 mulheres abordadas, observou-se que 16 (32%) tinham entre 26 e 36 anos; quanto ao estado civil, 20 (40%) eram solteiras; 26 (52%) faziam uso de contraceptivo; 46 (92%) já haviam realizado o exame pelo menos uma vez na vida; em relação à periodicidade, 32 (61%) realizaram o exame há mais de um ano. Além disso, 19 (41%) relataram dificuldade na marcação da consulta fator implicador na adesão das mesmas ao serviço. Diante dos resultados percebe-se que a grande maioria das mulheres já havia realizado o exame de prevenção do câncer do colo do útero, sendo esse dado considerado muito satisfatório; entretanto, houve um número significativo com exames em atraso, o que evidencia a importância de ações de promoção e prevenção nesta população, orientando sobre a periodicidade de realização do exame, bem como estratégias que estimulem essas mulheres a procurarem os serviços de saúde.

INFLUÊNCIA DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRADE, Elaine Pereira*; ALVES, Thaís Costa; CARVALHO, Laise Neves; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: elaineandrad@hotmail.com

O PET Saúde tem como propósito a educação pelo trabalho, configurando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, tendo como enfoque o reconhecimento das necessidades dos serviços oferecidos pelo SUS como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. Este trabalho objetivou relatar a experiência de acadêmicas de Medicina da Universidade Ceuma, no desenvolvimento de atividades realizadas na atenção básica. Trata-se de um relato de experiência proporcionado pelo programa PET/Saúde, na UBS Nazaré Neiva do município de São Luís, durante o

período de abril a maio de 2014. Percebeu-se através da aplicação de questionários com foco na saúde da gestante e da criança e elaboração de um portfólio contemplando informações a cerca da Superintendência de Educação em Saúde do Município de São Luis, que essas atividades possibilitaram as estudantes uma visão aprofundada a cerca da realidade de gestantes e crianças usuárias dos serviços de saúde oferecidos pela ESF, o que ampliou o conhecimento social, sanitário e epidemiológico dos envolvidos, permitindo momentos de prática e consolidação dos conteúdos adquiridos na escola de medicina, através de orientações referentes a temas comuns na obstetrícia e pediatria. Desse modo, pode-se inferir que o PET/Saúde tem se constituído como uma importante estratégia de melhoria da formação profissional de estudantes da área da saúde, promovendo futuramente, avanços na assistência aos usuários do SUS.

INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES NO SURGIMENTO DE OBESIDADE INFANTIL E SUAS COMPLICAÇÕES: REVISÃO DE LITERATURA

BRITO, Marcelo Martins dos Santos*; DE SOUZA, Julliana Fornieles; MATIAS, Carolina Casé Cardoso; LEITE, Jamille Fontes; CARVALHO, Laise Neves; SOARES, Liane Batista da Cruz.

Categoria: Graduação

Email: marcelo.brito13@hotmail.com

O objetivo do trabalho foi identificar a influência dos hábitos alimentares no surgimento de obesidade infantil e suas complicações. A obesidade é uma doença crônica definida pelo excesso de gordura corporal, sendo um grave problema de saúde pública. Vários fatores estão associados à obesidade infantil, entre eles, desmame precoce, prática de assistir televisão durante várias horas por dia, uso de alimentos formulados, neofobia, entre outros. Foi realizada revisão de literatura nas bases de dados Scielo e Pubmed, através dos descritores obesidade infantil e influência de maus hábitos alimentares na infância. Foi possível observar que a formação dos hábitos alimentares inicia-se desde a gestação e amamentação, portanto, a mãe deve estar atenta a sua dieta. A influência dos pais, assim como a de outros cuidadores na alimentação das crianças, não somente se dar em relação às atitudes tomadas, como também pelo exemplo dado, já que a observação de outras pessoas se alimentarem favorece a aceitação por novos alimentos. É importante que desde a infância a criança conviva com situações educativas quanto a alimentação. A educação nutricional envolve transferência de informações, desenvolvimento de motivação e quando necessárias mudanças de hábitos. Os hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a se solidificar na vida adulta, fazendo-se importante as medidas de promoção de saúde nessa fase. Diante do exposto, faz-se necessária a implementação de medidas intervencionista no combate e prevenção a obesidade infantil.

RELAÇÃO DA NATALIDADE COM O GRAU DE ESCOLARIDADE DE MULHERES EM IDADE FERTIL

CARVALHO, Samira Marjory Moreira*; GOMES, Núbya Barros de Araújo; TEIXEIRA, Katia Rosilda Castro; CARVALHO, Laise Neves; FIQUEIREDO, Tássia Lorena Barros.

Categoria: Graduação

Email: samiramcarvalho@hotmail.com

O objetivo do presente estudo foi verificar a relação ente natalidade e o grau de escolaridade das gestantes atendidas em unidades básicas de saúde de São Luís. Realizou-se um estudo descritivo, do tipo transversal, no qual se obteve uma amostra com 221 mulheres em unidades básicas de São Luís (Djalma Marques, Pirapora, Amar e São Raimundo). Foi utilizado como instrumento de pesquisa questionários padronizados para a realização da coleta dos dados, os mesmos foram desenvolvidos por coordenadores, tutores e preceptores do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da Universidade Ceuma, sendo sua aplicação realizada entre o período de setembro de 2013 a março de 2014 pelos alunos do programa. O estudo demonstrou que 40% das mães entrevistadas possuem grau de escolaridade ensino médio, tendo uma média de 2 filhos por mãe. Por outro lado, 5% das mães entrevistadas tem grau de escolaridade superior e a média é de 1 filho por mãe. Corroborando com estudos realizados em vários estados brasileiros, foi verificado que quanto maior o nível de escolaridade menor o número de filhos.

REALIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE UNICEUMA

COSTA, Raysa Hellen Assunção*; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CARVALHO, Laise Neves; EUFRÁSIO, Bruno Pereira; RODRIGUES, Aucilene; DIAS, Rosiane da Silva; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: raysahellen@hotmail.com

A Rede Cegonha visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, regulamentada pela portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011. O objetivo do relato de caso visa é conhecer a realidade do funcionamento do programa saúde da mulher no município de São Luís. Trata-se de um relato de experiência, realizado através de entrevista com a coordenadora e responsável pela Rede Cegonha, na Coordenação da Saúde da Mulher de São Luís. Foi discutido sobre o funcionamento, a logística e as ações dentro do programa, além de revisão de literatura sobre o programa saúde da mulher, nos manuais do ministério da saúde do ano de 2011. A partir dos resultados obtidos da entrevista, foi possível observar que há suprimento regular de métodos contraceptivos, não falta material para coleta de preventivo, boa cobertura vacinal, bons laboratórios credenciados ao programa. No entanto, não há vinculação da gestante à maternidade, a quantidade de leitos é insuficientes, falta à busca ativa dos ACS às gestantes da comunidade e maior interesse da população em receber orientações de educação em saúde. Conclui-se a partir da experiência que os pontos a serem considerados na atenção à Saúde da Mulher são a ampliação do número de maternidades e leitos, melhorar a vinculação da gestante na UBS para a maternidade, incentivar a população a participar de ações de educação em saúde.

SÍNDROME ALCÓOLICA FETAL (SAF)

CORSO, Samir Henrique*; COELHO, Patrícia Magalhaes; OLIVEIRA, Elane Carvalho; PINHEIRO, Flávia Coelho Mohana; SANTOS, Livia Eloi Castro; REGO, Iolanda Margarete de Araújo

Categoria: Graduação

E-mail: samirhcor@hotmail.com

Revisão de literatura que trata sobre os riscos do consumo de álcool durante a gestação. O estado de gravidez não pode ser considerado e não é um estado doentio, entretanto algumas restrições devem ser observadas pela gestante, neste contexto, a abstenção de algumas práticas sociais, como o consumo de bebidas alcoólicas, torna-se providenciais. Ignorar o alerta de não consumir álcool durante a gestação é transmitir ao bebe “os efeitos gerados pelo álcool”, que causa desde o aborto ao nascimento pré-termo, além de má formações no feto. Ingerir bebida alcoólica durante a gravidez pode ocasionar ainda: baixo peso ao nascer e durante o desenvolvimento alterações como: hiperatividade, transtornos de conduta e dificuldade de aprendizado. A manifestação mais séria é a síndrome alcoólica fetal, que pode causar retardo de crescimento, microcefalia, alterações do S.N.C. e alterações faciais que caracterizam fisicamente a síndrome. Segundo a O.M.S. em países desenvolvidos, nascem cerca de 12.000 bebês com a síndrome alcoólica fetal.

Os mecanismos de ação seriam a imaturidade hepática e enzimática do feto, que por não metabolizarem o álcool teria uma quantidade exacerbada de ácidos graxos e seus metabólitos que se depositariam no coração, fígado e rins do feto. Outro achado seria a probabilidade de o etanol impedir a absorção de alguns aminoácidos e nutrientes pela via placentária, retardando o crescimento e a divisão celular. O fígado exigindo um aporte maior de oxigênio para tentar metabolizar estes metabólitos fariam com que as adrenais liberassem grande quantidade de catecolaminas causando uma vasoconstrição e maior deficiência de oxigênio, além da obstrução da vasculatura umbilical. O álcool causaria ainda, produção aumentada de prostaglandinas e produção de AMP cíclico, que em níveis elevados aumentariam ainda mais os danos ao SNC.

Sabe-se sobretudo, que apesar dos três primeiros meses serem os mais suscetíveis a teratogênias e danos ao feto, não há dose segura nem tempo seguro para o consumo de bebida alcoólica durante a gestação. Se uma mulher grávida, efetivamente, nunca bebe sozinha, a primeira manifestação de amor ao bebê é afastar-se da bebida alcoólica.

MILIÁRIA: ERUPÇÃO CUTÂNEA COMUM NA SAÚDE DA CRIANÇA

COSTA, Raysa Hellen Assunção*; GOMES, Núbya Barros de Araújo;
PENHA, Karla Janilee de Souza; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira;
RODRIGUES, Samara Braz; CARVALHO, Laíse Neves; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: raysahellen@hotmail.com

A Miliária, conhecida como brotoeja é uma doença dermatológica comum no recém-nascido. São pequenas nodulações brancas, não infectadas que parecem com espinhas e ocorrem na face de 40% dos recém-nascidos. Foi realizado um levantamento bibliográfico com 10 artigos científicos no banco de dados do Lilacs e Scielo, entre os anos de 2005 a 2010. O Objetivo do presente trabalho visa o conhecimento da patologia, o quadro clínico e o tratamento. A miliária trata-se de uma erupção cutânea relacionada com a obstrução parcial dos ductos das glândulas sudoríparas. O quadro clínico está relacionado com o aumento do calor e da produção do suor que, extravasando dentro da pele, antes de atingir a superfí-

cie, provoca um processo inflamatório. A distribuição corporal característica envolve face, nariz, bochecha, queixo, pescoço, tronco, dobras e topografia das fraldas. A lesão elementar é a pápula eritematosa e pode ocorrer a presença de vesículas e pústulas. As lesões são pruriginosas, podendo levar à infecção secundária, com o surgimento de pústulas (bolhas de pus) ou nódulos dolorosos. Estão associadas a condições que favoreçam a transpiração como calor, febre e excesso de agasalhos. O tratamento consiste no uso de soluções secativas, roupas frescas, permanência em locais bem ventilados e refrigerados. Diante do exposto, pode-se inferir que a pele desempenha um papel fundamental na proteção do recém-nascido. A maioria das alterações cutâneas que ocorrem neste período são transitórias, porém causam preocupação dos pais, logo é necessário o reconhecimento e orientação adequada destas lesões para uma abordagem adequada na saúde da criança.

O IMPACTO DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS COM ENFOQUE NA SAÚDE DAS CRIANÇAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

COSTA, Raysa Hellen Assunção*; PENHA, Karla Janilee de Souza;
SOUZA, Janice Maria Lopes; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CARVALHO, Laise Neves;
DIAS, Rosiane da Silva; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: raysahellen@hotmail.com

As doenças diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas na saúde infantil. O objetivo do presente trabalho visa descrever o impacto de estratégias educativas na qualidade de vida das crianças, atendidas na Unidade Básica de Saúde do Pirapora, no município de São Luís. Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicas do PET-Saúde da Universidade Ceuma, onde inicialmente foi realizado levantamento prévio das necessidades de saúde das crianças assistidas, através do acompanhamento do atendimento e aplicação de questionário com os pais no final da consulta. Observou-se maior prevalência de dermatites de contato, infecções respiratórias e intestinais nas crianças. Em um segundo momento, elaborou-se um material educativo (folder ilustrativo) sobre as patologias mais prevalentes, cuidados de higiene e recomendações gerais, com o intuito de disseminar informações sobre as problemáticas descobertas, o mesmo foi distribuído para os responsáveis das crianças, seguido de palestra e explicação de cada item contido. O impacto de estratégias educativas que buscam a prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida de crianças, foi extremamente positiva na comunidade. Houve interesse por parte dos pais e responsáveis, que questionaram, tiraram dúvidas e ficaram satisfeitos com as orientações passadas pelas acadêmicas do PET. Concluímos que houve uma real sensibilização e a conscientização dos pais em relação à importância do cuidado para com os seus filhos, a cerca das patologias explicadas. Concluímos que a estratégia de saúde da família exerce papel fundamental na saúde infantil, sendo capaz de transformar a vida desses indivíduos através da orientação e da educação em saúde.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS

DINIZ, Andressa Oliveira*; COSTA, Brenda Lima; SILVA, Dennyze Oliveira; SOUTO, Karlyne Araujo;
GOMES, Núbya Barros de Araújo; CAMPOS, Hilda Thalita Jardim Lobo.

Categoria: Graduação

Email: address_a_oliveira@hotmail.com

Esta investigação analisa o perfil epidemiológico de gestantes assistidas em unidades básicas de São Luís, Maranhão. Segundo Pereira (2005), a gestação constitui um momento do ciclo de vida, que geralmente poderia decorrer sem anormalidades da saúde, porém abrange uma tensão adaptativa caracterizada por complexas transformações fisiológicas, emocionais, interpessoais e sócio-demográficas, que provocam potencial de risco eminente. Trata-se de estudo descritivo, observacional do tipo coorte transversal com 48 gestantes em quatro unidades básicas de São Luís, Maranhão. Para coleta de dados foi utilizado questionário aprovado pelo Comitê de Ética através do parecer número 743094. Os dados são apresentados em frequência relativa e absoluta e foram coletados por alunos do Pet-Saúde redes Uniceuma. A idade mediana das gestantes foi de 25 anos (16-39). Com relação à cor, 60,4% (29) referem parda, 10,4% (5) preta e 6,2% (3) branca. Das mulheres analisadas, 62,5% (30) são casadas e 37,5% (18) são solteiras. Referente a escolaridade, 29,2% (14) são analfabetas, 68,7% (21) cursaram até ensino médio completo e 2,1% (1) tem ensino superior. Quanto à atividade profissional, 43,8% (21) trabalham regularmente e 41,7% (20) realizam atividade doméstica. Metade delas relatam renda familiar entre 2 e 4 salários mínimos, 35,4% recebem até um salário, porém, 37,5% (18) recebem auxílio do governo. Mais da metade (58,3%) têm outro filho. Verifica-se mudança no perfil das gestantes acolhidas pelas unidades de saúde, visto que maioria dessas apresenta bons indicadores sociais.

RELAÇÃO ENTRE RENDA FAMILIAR E QUANTIDADE DE FILHOS: ANÁLISE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

LONDOSO, Gissela Santos*; ROCHA, Pamella Gabriella Melo; MARQUES, Paulo Roberto da Silva; LEITE, Felipe de Queiroz; CARVALHO, Laise Neves; CAVALCANTE, Mirella Araújo.

Categoria: Graduação

Email: gabriellamrocha@gmail.com

O objetivo do trabalho é analisar a relação entre a renda familiar e a quantidade de filhos em gestantes assistidas em Unidades Básicas de São Luís - Maranhão. A correlação entre fecundidade e renda é bastante discutida. De maneira geral, famílias com níveis de renda mais elevados têm menos filhos do que as famílias de baixa renda. Porém essa realidade vem sendo modificada e a taxa de fecundidade vem caindo, independentemente do nível socioeconômico ocupado em todos os Estados brasileiros. A metodologia empregada consistiu em estudo descritivo, transversal, com a utilização de questionários aplicados com as gestantes no período de setembro de 2013 a setembro de 2014. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário formulado pelos preceptores do Pet – Saúde Redes e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma (parecer nº. 743094). Os resultados obtidos mostraram que, das 48 gestantes estudadas, 29 (60,41%) possuíam outros filhos. Com relação à renda, famílias que recebiam até um salário mínimo e famílias com renda entre dois a quatro salários, tinham entre um e três filhos, sendo a média de apenas um filho por família. Conclui-se uma diminuição na quantidade de filhos por família a medida que o país vai se urbanizando e a população vai tendo acesso às políticas públicas de educação e saúde, conscientizando-a quanto a importância do planejamento familiar.

ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EM QUATRO UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO LUÍS-MA

MELO, Lorena Arruda*; MONTEIRO, Helga Mendes; BRAGA, Ariane da Silva; CUTRIM, Ana Karolina Carneiro; SILVA, Carla Caroline Vieira; CARVALHO, Laise Neves; GOMES, Celma Barros de Araújo.

Categoria: Graduação

Email: lorena_arrudaa@hotmail.com

O objetivo da pesquisa é avaliar a adesão ao aleitamento materno das pacientes atendidas em quatro Unidades de Saúde do município de São Luís. Apesar do crescente incentivo ao aleitamento materno, o Brasil ainda registra baixos índices de amamentação exclusiva ao sexto mês. Embora o último estudo de abrangência nacional realizado pelo Ministério da Saúde demonstre aumento da média do aleitamento materno exclusivo de 23,4 dias em 1999 para 54,1 em 2008, o resultado encontra-se muito aquém da meta da Organização Mundial de Saúde que é de 180 dias. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo coorte transversal, realizado com 224 mães no período de agosto de 2013 a junho de 2014. Como instrumento de coleta foi utilizado questionário formulado pelos próprios pesquisadores, preenchidos por mães, junto a alunos do PET-Saúde Ceuma. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número do parecer 743094. Entre as mães questionadas, 98,2% (220) relataram que amamentaram. Destas 65,5% (144) aleitamento exclusivo. Quanto ao período que ocorreu o primeiro contato com o seio, 84,8% (190) relataram que ocorreu logo após o nascimento, 8,9% (20) após o 1º dia de nascimento, 4,5% após o 7º dia de nascido, 1,8% (4) não amamentaram e 6,4% (14) referiram dificuldade para sucção. Baseado nas metas propostas pela OMS de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, os dados encontram-se abaixo do preconizado, o que reflete restrição aos benefícios proporcionados pelo aleitamento materno.

INFLUENCIA DO ESTADO CIVIL NO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA EM GESTANTES DE SÃO LUÍS

MENDONÇA, Ana Carolina Sá*; ALVES, Raissa Neruza Santana; DO NASCIMENTO, Léia Ribeiro; PEREIRA, Eugênia Aires; SILVA, Joice Penha; GOMES, Núbia Barros De Araújo; CARVALHO, Laise Neves Carvalho

Categoria: Graduação

E-mail: carol.smendonca@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi verificar a relação entre o estado civil e consumo de álcool em gestantes assistidas em unidades básicas de São Luís. Estudos descrevem a influência de aspectos sociodemográficos, como escolaridade e renda familiar no consumo de álcool entre gestantes. Como a relação entre o estado civil e uso de álcool em gestantes em São Luís ainda não foi totalmente esclarecido, foi realizado estudo quantitativo, descritivo, observacional

do tipo corte transversal com 48 gestantes assistidas pelo programa de assistência ao pré-natal de quatro unidades básicas de saúde da cidade de São Luís/MA. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2013 e março de 2014, sendo o instrumento de coleta questionário formulado pelos preceptores do programa Pet-saúde Redes do Uniceuma. A coleta foi realizada pelos alunos do programa que foram previamente treinados. Para análise estatística foi utilizado o programa Excel, sendo as variáveis qualitativas descritas em frequência relativa e absoluta. Com base nos dados obtidos verificou-se que nas gestantes entrevistadas, a prevalência de consumo de bebidas alcoólicas foi de 22,9% (11), sendo que destas 72,7% (8) são solteiras. Em decorrência dos resultados observados, deve ser implementado programa de educação específico sobre as implicações de hábitos não recomendáveis na gestação.

PROPORÇÃO DE MENORES DE 4 MESES EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

MENDONÇA, Nathália Brás*; NORONHA, Thaiza Rodrigues; CARVALHO Kalline Queiroga; QUEIROZ, Rayanne Araújo Palácio; GOMES, Núbya Barros de Araújo; PIMENTA, Cleide Maria Macedo.

Categoria: Graduação

Email: thaiza.noronha@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a proporção de menores de 4 meses em aleitamento materno exclusivo (AME) da Unidade Básica de Saúde AMAR, área 61, com os indicadores do Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) do Município de São Luís. O aleitamento materno é a estratégia que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física e psíquica da criança e da mulher que amamenta, devendo ser mantido exclusivamente até o 6º mês de vida. Foi realizado estudo avaliativo, quantitativo, transversal com gestantes assistidas na Unidade de Saúde AMAR. Os dados foram obtidos no SIAB da Secretaria de Saúde do Município referente aos meses de janeiro à março de 2014. Segundo PMAQ, proporção de AME até 75% é considerada insatisfatória, mediano entre 76% a 80%, acima da média entre 80% a 99% e muito acima da média quando 100%. Na unidade analisada, em janeiro a proporção de AME foi de 63.6%, fevereiro de 84.2% e em março atingiu a marca de 85.7%. Conclui-se, portanto, que no mês de janeiro a proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo na UBS AMAR foi insatisfatória, já nos meses de fevereiro e março esses números atingiram valores considerados acima da média de acordo com o preconizado pelo PMAQ.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PET-SAÚDE CEUMA NA PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA

MONTEIRO, Helga Mendes*; MELO, Lorena Arruda; BRAGA, Ariane da Silva; CUTRIM, Ana Karolina Carneiro; SILVA, Carla Caroline Vieira; CARVALHO, Laíse Neves; GOMES, Celma Barros de Araújo.

Categoria: Graduação

Email: lorena_arrudaa@hotmail.com

Esse trabalho tem por objetivo apresentar o PET-Saúde Ceuma e sua relevância na graduação, na promoção do conhecimento científico e na assistência primária, através da vivência dos alunos. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, consiste em um programa desenvolvido para discentes de graduação em saúde, cujo objetivo é a formação de grupos de estudo e extensão que desenvolvam atividades em áreas estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS). O PET-Saúde Ceuma teve início em julho de 2013 e está correlacionado ao PET-Saúde/Redes, no qual especificamente se trabalha nas Instituições de Ensino Superior (IES) a Rede Cegonha. Consiste em um relato de experiência, vivenciado por seis discentes, do 6º período do curso de Medicina da Universidade Ceuma, discutido ao longo do período de atividades do PET-Saúde Ceuma, que compreendeu o intervalo de agosto de 2013 a agosto de 2014, em atividades desenvolvidas nas UBS. Durante o ano de desenvolvimento do PET-Saúde Ceuma, o aspecto crítico e participativo frente à Saúde Pública foi estabelecido, bem como o vínculo entre alunos, comunidade e Universidade. A partir do PET-Saúde Ceuma a produção científica foi fomentada e, desta forma, os alunos estão inseridos em trabalhos de extensão e conhecimento das redes. O programa desperta nos alunos o desejo de participar do processo de construção da Saúde Pública, o que implica em uma formação diferenciada, onde se alia teoria e prática sob as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde.

A ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PET-SAÚDE

NASCIMENTO, Mônica Caroline Mendes*; COLARES, Valderlane Lopes Pinheiro; RAMOS, Allan Moura; CARVALHO, Laíse Neves; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Categoria: Graduação

Email: delanelopes@hotmail.com

O estudo visa esclarecer a organização e formação das equipes Pet-saúde. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010. Foi instituído pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, como uma das estratégias de mudanças na graduação, tendo em perspectiva as necessidades sociais em saúde e as Diretrizes Curriculares Nacionais, atua como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com seus princípios e necessidades. O PET-Saúde tem como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade e seu desígnio é a educação pelo trabalho, disponibiliza bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em implementação no país desde 2005.

CONSUMO DE DROGAS EM GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS

PEREIRA, Eugênia Aires*; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; SILVA, Joice Penha; NASCIMENTO, Léia Ribeiro; ALVES, Raissa Neruza Santana; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CARVALHO, Laise Neves.

Categoria: Graduação

Email: eugeniaapereira@hotmail.com

O trabalho em questão teve por objetivo descrever a prevalência do consumo de drogas em gestantes atendidas em Unidades Básicas de Saúde de São Luís. O uso de substâncias nocivas à saúde no período gravídico-puerperal, como drogas lícitas e ilícitas, deve ser investigado e desestimulado, pois está associado a crescimento fetal restrito, aborto, parto prematuro e deficiências cognitivas no concepto. Foi realizado estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo coorte transversal com 48 gestantes assistidas pelo programa de assistência ao pré-natal de quatro unidades básicas de saúde da cidade de São Luís/MA. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2013 e março de 2014, sendo o instrumento de coleta questionário formulado pelos preceptores do programa Pet-saúde Redes do Uniceuma. A coleta foi realizada pelos alunos do programa que foram previamente treinados. Para análise estatística foi utilizado o programa Excel, sendo as variáveis qualitativas descritas em frequência relativa e absoluta. Com base nos dados obtidos verificou-se que das gestantes 22,9% (11) relataram uso de cigarros, 22,9 % (11) de drogas ilícitas e 22,9% (11) consumiam algum tipo de bebida alcoólica. Sabendo dos efeitos nocivos das drogas para mãe e criança, sugere-se programas educativos, como discussões em grupo, dramatizações de situações cotidianas e relato de experiências a fim de promover a saúde das gestantes por meio da educação e aconselhamento.

ATENÇÃO PRÉ-NATAL ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE PENITENCIÁRIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

RODRIGUES, Samara Bráz*; SOUSA, Nayanna Láysa Oliveira; SOUSA, Vanessa Patrícia Lima; COSTA, Rayssa Hellen Assunção; SANTOS, Mirla Kalina Silva; CARVALHO, Laise Neves; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: samarabrazrodrigues@gmail.com

As condições oferecidas nas unidades prisionais são insalubres, tornando o pré-natal um meio indispensável para a detecção de alterações materno-fetais e melhora do prognóstico em gestantes privadas de liberdade. Diante disso buscou-se identificar as produções científicas brasileiras que descrevem sobre a assistência pré-natal às gestantes em situação de cárcere penitenciário. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e LILACS, nos quais foram utilizados como descritores “gestantes”, “penitenciárias” e “prisões”. Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados em Língua Portuguesa, do ano de 2004 a 2014, realizados no Brasil, que atendessem ao objetivo proposto. Foram encontradas 58 publicações, das quais 9 foram selecionados e analisados para compor a amostra. Através da análise verificou-se que a assistência pré-natal disponível nos presídios é inadequada em relação aos critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. O acompanhamento das gestantes é realizado fora das penitenciárias em Unidades Básicas de Saúde (UBS), no entanto não comparecem às consultas, por conta da falta de disponibilidade de escolta e transporte. Foi observado que muitas das gestantes só descobrem que estão infectadas por DST's durante o pré-natal. A partir da análise das publicações foi possível observar que a assistência pré-natal no sistema penitenciário ainda

tem muito a melhorar e isso só será alcançado quando houver investimento em saúde dentro das unidades prisionais, capacitação dos profissionais e a integração entre os órgãos de saúde pública e o sistema penitenciário.

FATORES DESENCADEANTES DE INFECÇÃO NO PUERPÉRIO QUE GERAM IMPACTO NA MORTALIDADE MATERNA

SANTOS, Mirla Kalina Silva*; ANDRADE, Elaine Pereira; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; ALVES, Thaís Costa; RODRIGUES, Samara Braz; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: mirlakalinass@gmail.com

Do ponto de vista obstétrico, a infecção puerperal representa uma das principais complicações e morbidade que podem comprometer o bem-estar materno, podendo trazer prejuízos no relacionamento entre mãe e recém-nascido. O Ministério da Saúde do Brasil cita que esta é uma das principais causas de mortalidade materna. Com isso a associação entre puerpério e infecção é um fator que implica em um entrave social para a qualidade de vida das gestantes. O acervo bibliográfico foi pesquisado em periódicos indexados nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) no período de 2000 e 2012. Utilizou-se como descritores infecção e puerpério. A partir do levantamento bibliográfico de 10 artigos selecionados, percebeu-se que existem fatores desencadeantes que contribuem para uma maior prevalência de infecção após o parto, tais como: via de parto, sendo o parto cesáreo o mais importante; idade da mulher; primiparidade; obesidade; tempo de hospitalização no pré-operatório; tempo cirúrgico prolongado; hemorragia pós-parto e as comorbidades associadas (doença pelo HIV, anemia severa, diabetes gestacional, sífilis e hipertensão). Conclui-se que a mortalidade materna ainda é um problema presente em nossa sociedade, com índices altos e resultantes da inter-relação de vários processos, sendo que um desses é a infecção puerperal que ganha destaque neste cenário. Portanto é necessário elencar e conhecer o perfil das gestantes acometidas pelos fatores de risco com o intuito de elaborar medidas apropriadas ao seu enfrentamento, para reduzir o elevado índice de mortalidade materna por infecção no puerpério.

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

SCHERR, Jéssica Torres*; VIEIRA, Kelly Luana Rodrigues; SANTANA, Renata Karissa Pessoa; CALISTO, Mariana Martins; CARVALHO, Laíse Neves; SILVA, Aniely Aranha.

Categoria: Graduação

Email: jessica.scherr@hotmail.com

Esse trabalho tem como objetivo verificar a influência da idade e escolaridade materna sobre o planejamento familiar. Segundo o Ministério da Saúde vários aspectos sociodemográficos, como idade, escolaridade, estado civil e ocupação influenciam no planejamento familiar. Estudos descrevem que as famílias mais numerosas pertencem a mães mais jovens e analfabetas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, do tipo transversal, realizado com 48 gestantes. O estudo foi realizado em quatro unidades básicas de saúde: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, no período entre setembro de 2013 a março de 2014. Para coleta de dados foi utilizado um questionário formulado por preceptores do PET-saúde Redes da Universidade Ceuma, sendo sua aplicação realizada por alunos voluntários e bolsistas do programa. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Ceuma com número de parecer 743094. Apenas 35,4% (17) das mulheres planejaram a gestação. Entre estas, 17,6% (3) tem abaixo de 18 anos, 41,2% (7) entre 18 e 28 anos e 41,2% (7) acima de 28 anos. A maioria, 52,9% (9), são casadas e 41,25% (7) são analfabetas, porém, 17,6% (3) cursaram até 8ª série do ensino fundamental, 11,8% (2) o ensino médio incompleto e 23,5% (4) ensino médio completo. Embora a adolescência interfira negativamente no planejamento familiar, isso não foi verificado. Com relação ao nível de escolaridade, esse aspecto influenciou no planejamento familiar da amostra estudada.

PREVALÊNCIA DA IDADE DE RISCO EM GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS

SILVA, Ana Nilza Lins*; SILVA, Larissa Arani Coleta Ramos; CARVALHO, Laise Neves; CAVALCANTE, Mirella Fernanda.

Categoria: Graduação

Email: anasilvalins@hotmail.com

O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de gestantes com idade de risco atendidas em unidades básicas de saúde de São Luís. O método utilizado foi um estudo quantitativo, descritivo, observacional, de corte transversal, realizado com 76 gestantes atendidas em quatro unidades básicas de saúde de São Luís: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora. O estudo foi realizado nos meses de setembro de 2013 a março de 2014 e os dados foram coletados através de um questionário formulado pelos preceptores do Pet-Saúde da Universidade Ceuma. A coleta foi realizada por alunos voluntários e bolsistas do programa que foram previamente treinados. Os resultados mostraram a prevalência de gestantes com idade de risco foi de 23,7%, sendo destas, 61% (11) adolescentes e 39% (7) com idade acima de 35 anos. Na conclusão foi verificada uma taxa elevada de idade de risco na amostra estudada, o que pode levar a complicações para a mãe e para o bebê.

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL SEGUNDO O ÍNDICE DE KESSNER EM GESTANTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

SILVA, Ualaci Caldas*; VALE, Hávilla Gastão Quaresma Paiva; SILVA Sânyo Costa; CARDOSO, Wylana Patrícia Souza; CARVALHO, Laíse Neves; SOARES, Liane Batista da Cruz.

Categoria: Graduação

Email: ualace19@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade da assistência pré-natal da Unidade Básica de Saúde AMAR São Luís-MA. O Brasil tem registrado redução na mortalidade materna desde a década de 90. Dentre os indicadores utilizados para a avaliação dos cuidados materno na atenção primária, a OMS coloca como um dos padrões essenciais para um bom acompanhamento do pré-natal o seu início no primeiro trimestre de gestação. A UBS deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde, sendo o ponto estratégico para melhor acolhimento de suas necessidades durante a gravidez. Realizou-se um estudo avaliativo, quantitativo, transversal onde foram analisados 82 prontuários. Para a compilação dos dados coletados foi utilizado índice de Kessner modificado por Takeda (Takeda 1993), que é um algoritmo baseado no trimestre em que o cuidado pré-natal se inicia e no número de consultas, ajustado para a idade gestacional, sendo definido por três categorias de utilização: pré-natal adequado, intermediário e inadequado. De acordo com o índice utilizado, das gestantes analisadas, 10% realizam o pré-natal adequado (6 ou mais semanas e IG < 20 semanas), 59% intermediário (todas as demais situações) e 32% inadequado (< 3 consultas e após 28 semanas). Foi notório perceber a necessidade de melhorar a qualidade da assistência oferecida pelo serviço. Portanto, é necessário ampliar a cobertura da assistência, motivar e capacitar os profissionais para a prática da saúde coletiva, garantindo a realização e acompanhamento pré-natal de maneira eficiente e eficaz como preconiza o Sistema Único de Saúde.

INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS

SILVA, Larissa Arani Coleta Ramos*; SILVA, Ana Nilza Lins; CARVALHO, Laise Neves; CAVALCANTE, Mirella Fernanda.

Categoria: Graduação

Email: larissaarani@hotmail.com

O objetivo do trabalho é avaliar a quantidade de consultas pré-natais realizadas por gestantes que foram atendidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A assistência pré-natal visa avaliar a condição materna e fetal de forma precoce com o intuito de prevenir ou atenuar prováveis complicações, assim sendo de significativa importância tanto para a gestante, quanto para o conceito. A metodologia baseia-se em um estudo quantitativo, descritivo, observacional, de corte transversal, realizado com 46 gestantes atendidas em quatro unidades básicas de saúde, de São Luís - Maranhão: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, nos meses de setembro de 2013 a março de 2014, com informações coletadas, através de um questionário formulado pelos preceptores do Pet-Saúde da Universidade Ceuma. Os resultados obtidos mostraram que, das 46 gestantes incluídas na amostra, apenas 36,9% (17) planejaram a gestação. Destas, 17,6% (3) não realizaram nenhuma consulta médica, 29,4% (5) uma consulta, 23,5% (4) duas, 5,9% (1) três, 5,9% (1) quatro, 5,9% (1) cinco, 5,9% (1) seis e apenas 5,9% (1) nove consultas. Através da análise dos resultados, percebe-se que mesmo entre gestantes que planejaram a gravidez há um elevado número de mulheres que não realizaram consulta durante a gestação, o que indica um relevante risco para a saúde materna e fetal. Assim, considera-se a maior necessidade de orientação sobre a importância dos cuidados pré-natais, intensificando as campanhas voltadas para a explicação dos benefícios e da essencialidade da realização de consultas pré-natais.

PERFIL ATITUDINAL DE SAÚDE BUCAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DE SÃO LUIS

SILVA, Valéria Marques*; MIRANDA, Lise Feitosa Novais; SILVA, Maria Valdeslânia Keuly Lima; SILVA, Aniely Aranha.

Categoria: Graduação

Email: lise_med@outlook.com

Esse trabalho tem como objetivo conhecer os hábitos de higiene bucal de gestantes atendidas em unidades básicas de São Luís. Segundo Sartório e Machado (2001) durante a gestação há uma predileção para as doenças inflamatórias gengivais e periodontais. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, do tipo coorte transversal, realizado com 48 gestantes. O estudo foi realizado em 4 unidades básicas de saúde: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, no período entre Setembro de 2013 a Março de 2014. Para coleta de dados foi utilizado um questionário formulado pelos preceptores do PET-SAÚDE da Universidade CEUMA. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do UNICEUMA, com o número de parecer 743094. Das 48 gestantes entrevistadas, 42,6% (20) procuraram assistência odontológica no último ano, sendo, 35% (7) para restauração, 35% (7) extração, 10% (2) tratamento gengival e 20% (4) aplicação de flúor. Sobre a escovação, 14,7% (7) relatam escovar apenas uma vez, 52,1% (25) duas vezes, 29,2% (14) três vezes e 4,2% (2) quatro vezes. Entrevistadas relatam que a escova utilizada é individual e 89,1% (41) usam de creme dental. Na amostra, 54,2% (26) usam fio dental, 56,3% (27) palito e 43,8% (21) enxaguante bucal. Com relação a sinais de periodontite, 35,4% (17) relatam sangramento espontâneo e 25,0% (12) mobilidade. Além disso, 27,1 (13) usam prótese dentária. Verificou-se um baixo índice na procura de assistência odontológica, tendo a maioria das gestantes uma boa higienização bucal rotineira.

COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE UM ANO NO CENTRO DE SAÚDE AMAR

SOBRINHO, Manoel Alves de Moura*; MELO, Suellen; BARROS, Samara; MOURA, Thaise; CARVALHO, Laíse Neves; PIMENTA, Cleide Maria Macedo

Categoria: Graduação

E-mail: drmmams83@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar a proporção de menores de 1 ano com vacinas em dia, na UBS Amar, área 61, no município de São Luís - MA, com os indicadores do programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ). Segundo Moraes et al (2000) e Santos et al (2006), a vacinação no primeiro ano de vida é essencial para prevenir várias doenças transmissíveis e reduzir a taxa de morbimortalidade. Foi realizado estudo avaliativo, quantitativo, transversal, com crianças menores de um ano assistidas na Unidade de Saúde AMAR. Os dados foram obtidos do banco de dados do SAB da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de janeiro a março de 2014. A proporção de crianças <1 ano com vacinas em dia foi de 88,2% durante o mês de janeiro, 100% no mês de fevereiro e 92,4% no mês de março. De acordo com o manual instrutivo do PMAQ, a proporção de crianças menores de 1 ano com vacinas em dia é considerada insatisfatória quando o resultado for < 10%, mediana de 10 a 50%, acima da média de 50 a 80% e muito acima da média 80 a 100%. Dessa forma, considera-se a cobertura vacinal na unidade avaliada excelente.

HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUIS-MA

SOUSA, Francisca Laura Ferreira*; CARVALHO, Laise Neves; GOMES, Nubya Barros de Araújo; DUARTE, Rita de Cassia Lucena; FIGUEIREDO, Tássia Lorena Barros Silva

Categoria: Graduação

E-mail: sousaflaura@gmail.com

Práticas de higiene bucal desempenham importante papel na prevenção das doenças bucais, especialmente a doença periodontal. A escovação dos dentes é a forma mais comum de limpá-los, sendo a recomendação usual de duas vezes ao dia. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os hábitos de higiene bucal (escovação dentária, uso do palito e uso de fio dental), em crianças de São Luís -MA. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional do tipo corte transversal realizado com 69 crianças, de 1 aos 5 anos de idade, de ambos os sexos de quatro unidades de saúde, da cidade de São Luís -MA, no período de setembro de 2013 ao março de 2014. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário composto por questões relacionadas aos aspectos sócio-demográficos e condições de saúde formulado pelos preceptores do Pet-saúde Redes da Universidade Ceuma. A coleta realizada pelos alunos do programa, que foram previamente treinados. Os dados

são apresentados em frequência absoluta e percentual. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa do Uniceuma com o número do parecer 743094. Entre as crianças analisadas, 8,7% (6) não apresentam a prática de escovação diária, 30,4% (21) realizam escovação apenas uma vez, 34,7% (24) duas vezes, 23,1% (16) três vezes e 2,8% (2) quatro vezes. Apenas 14,4% (10) fazem uso do fio dental e 10,1% (7) utilizam palito durante a higienização bucal. Os hábitos de higiene bucal foram considerados bons para a maioria das crianças que participaram do estudo.

ALEITAMENTO MATERNO: FATORES QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE

SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira*; SANTOS, Mirla Kalina Silva; COSTA, Raysa Hellen Assunção; SOUSA, Vanessa Patrícia Lima; RODRIGUES, Samara Braz; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: nanalayza@hotmail.com

O aleitamento materno, nos primeiros seis meses de vida, tem papel fundamental na redução da morbimortalidade por doenças infecciosas, proteção contra diarreia, doenças crônicas e alergias. Trata-se de um alimento completo que fornece água e nutrientes, é isento de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo do bebê, concede proteção imunitária, econômico, constituindo um adequado método de anticoncepção, além de promover um vínculo afetivo entre mãe e filho. O objetivo deste estudo foi identificar e analisar artigos sobre os fatores associados ao desmame precoce publicados no período de 2004 a 2012. Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão de literatura através das bases de dados eletrônicas LILACS E SCIELO. Como descritores utilizou-se: aleitamento materno, fatores de risco e desmame precoce. Foram selecionados doze artigos que apontaram vários fatores que estão implicados na interrupção precoce do aleitamento materno, tais como: idade materna jovem; ausência de experiência prévia de amamentação; presença de fissura mamilar; trabalho materno fora do domicílio; nível baixo de escolaridade; renda familiar; enfermidades maternas e da criança; uso de medicamentos pela mãe; uso de chupeta e falta de orientação de aleitamento materno na assistência pré-natal. Conclui-se que são necessárias medidas de intervenção que priorizem mulheres sem experiência de amamentação, de menor renda familiar e menor escolaridade assim como contemplar prevenção de traumas mamilares, desestímulo ao uso de chupetas para que a prática do desmame precoce seja superada pela conscientização e incentivo à prática do aleitamento materno.

PET-SAÚDE: IMPACTO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE

SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; SANTOS, Mirla Kalina Silva; SOUSA, Vanessa Patrícia Lima; ANDRADE, Elaine Pereira; ALVES, Thaís Costa; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: nanalayza@hotmail.com

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/ PET- Saúde visa incentivar a interação ativa de estudantes e docentes da área da saúde com profissionais e com a comunidade, no âmbito da atenção primária de acordo com as necessidades do SUS. Esta pesquisa objetivou analisar o impacto que o Programa de Educação para a Saúde exerce na formação profissional de estudantes da área da saúde de uma Universidade privada. Trata-se de pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa, envolvendo alunos bolsistas e voluntários participantes do PET-Saúde, excluindo os envolvidos neste trabalho. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado contemplando informações de caracterização do sujeito, integração ensino-serviço, cenários de aprendizagem, atividades desenvolvidas e interdisciplinaridade. Os sujeitos da pesquisa, oito do sexo feminino e dois do sexo masculino, eram de faixa etária entre 19 e 30 anos. Desses 50% eram bolsistas e 50% eram voluntários, sendo principalmente acadêmicos de medicina (80%) e enfermagem (20%). Os alunos cursavam entre o 5º e o 9º período de graduação. Para os participantes, o PET-Saúde propiciou importantes cenários de prática oportunizando a integração ensino, pesquisa e extensão, e o trabalho interdisciplinar no âmbito da atenção primária à saúde. Em relação aos cenários de prática do PET-Saúde, observou-se que a maioria os considerava razoáveis e almejava melhorias nas condições para o desenvolvimento das atividades. Conclui-se que o Programa de Educação Tutorial tem impacto positivo na formação acadêmica, uma vez que proporciona o desenvolvimento de habilidades interpessoais e oportuniza a integração de conhecimento.

ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL DE QUALIDADE: REVISÃO DE LITERATURA

SOUSA, Vanessa Patrícia Lima*; COSTA, Raysa Hellen Assunção; RODRIGUES, Samara Braz; SOUSA, Nayanna Láysa de Oliveira; SANTOS, Mirla Kalina Silva; GOMES, Núbya Barros de Araújo; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho.

Categoria: Graduação

Email: vanessalima.p.s@gmail.com

Acredita-se que a assistência pré-natal, quando ofertada com qualidade, poderá proporcionar melhores resultados na assistência ao parto. Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório realizada no banco de dados LILACS, foi utilizado os descritores “Cuidados de enfermagem e Assistência ao pré-natal”. Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados em Língua Portuguesa, de natureza quantitativa e qualitativa, realizados nos anos de 2002 a 2013, com disponibilidade de texto completo na base de dados. Após o levantamento dos artigos apenas cinco artigos atendiam ao critério de inclusão. Através da análise verifica-se que o pré-natal é uma atenção básica, porém essencial para a melhoria da qualidade de vida no decorrer das gestações bem como para o parto humanizado. Todos os artigos analisados enfocavam práticas de acolhimento e humanização onde o profissional deve estabelecer um vínculo com a gestante. Foi ressaltado também a importância da educação em saúde e a necessidade de oferecer mais orientações durante a assistência pré-natal de modo a facilitar a compreensão da gestante e qualificar ainda mais a assistência. Além disso, a qualidade da assistência refere-se a fazer um acompanhamento clínico da evolução gestacional, e ser capaz de identificar intercorrências e prestar orientações quanto à alimentação, mudanças físicas e psicológicas durante o período gestacional. Conclui-se, portanto, a partir deste estudo a necessidade do contínuo incentivo à realização a condutas que fortaleçam do pré-natal através do acolhimento, humanização e práticas de educação em saúde para garantia da qualidade da assistência e um período gestacional sem intercorrências.

ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS DECORRENTES DO PERÍODO GESTACIONAL DE MULHERES ASSISTIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SÃO LUIS

SOUTO, Karlyne Araujo*; DA SILVA, Dennyze Oliveira; COSTA, Brenda Lima; DINIZ, Andressa Oliveira; CARVALHO, Laíse Neves; CAMPOS, Thalita Jardim Lobo.

Categoria: Graduação

Email: dennyze.silva@hotmail.com

Esta investigação analisa os aspectos psicológicos decorrentes do período gestacional em mulheres assistidas em unidades básicas de São Luís, Maranhão. Como indica Zugaib (2008), o período gravídico-puerperal é a fase em que há maior incidência de transtornos psíquicos na mulher, pois fatores familiares, sociais, culturais, conjugais e da própria personalidade da gestante, tornam-se mais intensas. Trata-se de um estudo descritivo, observacional do tipo coorte transversal com 48 gestantes de quatro unidades básicas de São Luís, Maranhão no período de setembro de 2013 a março de 2014. Foi utilizado um questionário formulado pelos próprios pesquisadores, sendo a coleta realizada por alunos do Pet-Saúde redes Uniceuma. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética com parecer número 743094. Os dados são apresentados em frequência relativa e absoluta. Verificou-se que na amostra analisada, 91,7% (44) das gestantes referem sentir-se bem e com boa saúde, porém, 79,2% (38) relatam fadiga e irritação sempre ou quase sempre, 56,3% (28) perda da confiança em si mesma, 43,8% (21) sensação de que a vida é completamente sem esperança, 62,5% (30) perda de interesse nas atividades diárias e 56,3% (27) perda de interesse na aparência pessoal. Entre as entrevistadas, 60,4% (29) relatam perda de sono por preocupações, 47,9% (23) sonhos desagradáveis ou aterrorizantes e 37,5% (18) desejo de não viver mais, sendo em 2,1% (1) de forma constante. Os resultados refletem a importância da utilização de programas terapêuticos onde a psicoterapia de grupo pode ser um meio para elas aprenderem a lidar com suas aspirações e seus conflitos sejam eles familiares, físicos ou psicológicos.

PAINEL PESQUISA – GRADUAÇÃO

EFEITOS DO RITMO COMO FUNÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO PSÍQUICA NAS CRIANÇAS

ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima*; DE SOUZA, Marina Batista; RIBEIRO, Wallyson Martins; SOARES, Julia

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: liviaguadesandrade@gmail.com

A música está presente na vida do homem desde seu nascimento. É, por exemplo, pela via das canções de ninar que o sujeito humano faz sua entrada na cultura. Stern e Trevarthen são autores que apresentam estudos da presença da ritmicidade desde as primeiras interações mãe-bebê, contribuindo os estudos que confirmam a importância dos ritmos para a estruturação psíquica do sujeito. O Projeto intenciona verificar o potencial do ritmo e da música no desenvolvimento das crianças com ou sem entraves no processo de constituição psíquica, no que tange sua relação com o outro e sua entrada

no mundo simbólico. O objetivo é avaliar os efeitos de um atelier musical como intervenção terapêutica em crianças com desenvolvimento típico e atípico, averiguando a percepção dos afetos, o desenvolvimento da linguagem e a potencialidade de enlaçamento com o outro. A importância do presente estudo justifica-se principalmente pelo fato de haverem poucos estudos no Brasil que abordem este tipo de intervenção na perspectiva apresentada, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade da assistência a crianças com TID, especialmente nos serviços da rede pública de saúde, uma vez que não exige grandes recursos materiais e pode ser facilmente executada pelos profissionais especialistas. O projeto será desenvolvido com crianças de desenvolvimento típico e atípico, de 2 a 4 anos, em um ateliê Mix Musical, que funciona semanalmente no CIAMM – instituição sediada em São Luís desde 2004. Após os encontros, será analisado o desempenho individual das crianças participantes com relatórios transcritos e supervisionado pelas coordenadoras do projeto.

INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE LIMPEZA NA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.

AMORIM, Adalberto Paulo Varella*; CÂMARA, Vanda Silva; COSTA, Jocilene de Lima; RIZZI, Cláudia do Castro; TEXEIRA, Larissa Barbosa; GASPAR, Tânia; LEAL, Adriana

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: adalbertopaulofilho@hotmail.com

Sabe-se que a adequada esterilização do instrumental de trabalho é uma condição essencial para que seja mantida a cadeia asséptica e se atinja o sucesso da terapia endodôntica. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência dos diferentes métodos de limpeza na efetividade do processo de esterilização de limas endodônticas. Para o estudo, foram coletadas 50 limas endodônticas, que foram distribuídas em cinco grupos: G1 – limas novas sem processo de esterilização; G2 – utilizadas previamente e auto clavadas; G3 – utilizadas previamente e realizada a limpeza com água e sabão, secas, embaladas e auto clavadas; G4 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, secas, embaladas e auto clavadas; G5 – utilizadas previamente e realizada a pré-lavagem com cuba ultrassônica, lavadas, secas, embaladas e auto clavadas. Para a análise microbiológica, as limas foram inseridas, individualmente, em tubos de ensaio, contendo meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI) e levadas à estufa bacteriológica a 37°C onde permaneceu por 48 horas sendo a leitura feita em 72 horas. Resultados: Após o período de incubação as limas submetidas ao processo de esterilização independentemente do método de limpeza utilizado não apresentaram crescimento microbiano, no entanto, observou-se crescimento microbiano em 10% das amostras do G1 e 20% do G2. Conclusão: Pode-se concluir que as limas que não passaram pelo processo de limpeza prévia apresentaram contaminação microbiológica mesmo após a esterilização por calor úmido.

DISTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SÃO LUÍS – MA

CASTRO JÚNIOR, Webster Silva *; CARVALHO, Guilherme Larilho de Sena; DUTRA, Izamara Lira de Sousa; MENDES Márcia Cuenca Campos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: webstercastro@hotmail.com

Consiste no levantamento das unidades de saúde do município de São Luís – MA para atenção de baixa, média e alta complexidade em 2014 localizando sua distribuição geográfica e realizando pesquisa de campo em cada uma delas, valendo-se de observações e entrevistas, visando contribuir para a melhoria dos Serviços de Saúde deste município. Identifica os serviços de saúde oferecidos, os recursos humanos disponíveis para a Odontologia e a capacidade instalada para a prestação de assistência odontológica, tendo como referência os princípios do Sistema Único de Saúde.

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: IMPACTO NO CPO-D AOS 12 ANOS

CARVALHO, Guilherme Larilho De Sena*; JÚNIOR, Webster Silva Castro; MOUCHREK, Monique Maria Melo; DA SILVA, Mariana Carvalho Batista

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: guilhermelarilho@hotmail.com

A estratégia em Saúde da Família (ESF) vem se mostrando como uma estratégia de reestruturação da atenção básica, tendo como objetivo principal a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Considerando que a saúde bucal é um componente fundamental e indissociável da saúde geral do indivíduo, portanto faz parte da Atenção Básica (AB). Somente após 4 anos da incorporação da equipe de saúde bucal no ESF foi lançado o Programa Brasil Sorridente definido oficialmente como uma política pautada no documento 'Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal'. Em meio à necessidade e o interesse em avaliar os resultados alcançados em relação à organização e provisão dos serviços, é lançado mão dos índices de saúde, sendo o CPO-D aos 12 anos o de escolha, pois considera a experiência presente e passada do ataque da cárie dental à dentição permanente. Com base no exposto, o presente trabalho tem por finalidade descrever a distribuição das equipes de Saúde bucal na estratégia de saúde da família nas macrorregiões brasileiras e impacto do crescimento no CPO-D aos 12 anos. Pesquisa descritiva com consulta ao banco de Dados do Departamento de Atenção Básica <http://dab.saude.gov.br/portaldab/siab.php> e resultados do SB 2010—Pesquisa Nacional de Saúde Bucal e Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003. Foi possível observar que houve um aumento numérico das ESB em todas as regiões, assim como uma diminuição no CPO-D. Podemos concluir com isso, que o aumento das ESB impactou de maneira positiva para a diminuição do CPO-D.

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE PESCADOS COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA LIVRE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO

CHAGAS, Lucas Almeida das*; CARDOSO, Raissa Saraiva; DUARTE, Rita de Cássia Lucena; HORTEGAL, Elane Viana; JANSEN, Maria do Socorro Mendes; REIS, Virgínia Nunes Lima; ROCHA, Marina Souza

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: jansensocorro@hotmail.com

De acordo com o Ministério da Pesca e Agricultura, o consumo per capita de peixes no Brasil é de 9,03 kg por ano, índice considerado baixo em relação ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 12 kg por pessoa por ano. Por ser altamente perecível, exige muitos cuidados especiais, desde a manipulação até a comercialização, passando por armazenamento, conservação e transporte. Em geral, o peixe é vendido inteiro e pode estar in natura, (conhecido como "peixe fresco") refrigerado ou congelado. O objetivo foi avaliar a qualidade dos peixes de água doce e água salgada comercializados em uma feira pública em São Luís do Maranhão. Foram avaliadas as características sensoriais de compras, preconizadas pelo ministério da saúde dos pescados localizados em uma feira pública de São Luís do Maranhão no mês de Agosto de 2014, foram selecionados seis boxes que funcionavam diariamente das seis horas da manhã até cinco e meia da tarde. Os indicadores utilizados na análise dos pescados foram a pele brilhante e úmida com tonalidade viva; muco ausente; escamas unidas entre si; carne firme aderida aos ossos; opérculo (membrana que reveste guelras) rígido, oferecendo resistência a sua abertura; guelras vermelhas; órgãos internos bem definidos; olhos salientes e brilhantes; odor suave ou ausente. Portanto, todos os grupos de peixes analisados estavam dentro dos padrões de qualidade para serem comercializados e consumidos.

AVALIAÇÃO IN VITRO DA RESISTÊNCIA ADESIVA DE NOVO SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL

DINIZ, Ana Carolina Soares

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: carol_diniz5@hotmail.com

Avaliar in vitro a resistência adesiva de um novo sistema adesivo universal ao esmalte dental em relação aos sistemas autocondicionante e convencional. Foram utilizadas as metades mesial e distal de 35 incisivos bovinos, hígidos, recém-extraídos que foram divididos em 5 grupos experimentais (n=13). O esmalte dental foi tratado de acordo com as seguintes condições experimentais; G1 - Sistema Universal (SU) - Futura Bond U (VOCO) com condicionamento ácido; G2 - SU - Futura Bond U (VOCO) sem condicionamento ácido; G3 - Sistema Convencional (SC) - Adper Single Bond 2 (3M); G4 - Sistema Autocondicionante (SA) - Clearfil SE Bond (KURARAY) com condicionamento ácido; G5 - SA - Clearfil SE Bond (KURARAY) sem condicionamento ácido. Os corpos-de-prova foram confeccionados utilizando a resina composta TPH spectrum (Dentsply), e armazenados em água destilada (37±1°C) por 1 mês. O teste de microcisalhamento foi realizado utilizando a máquina de ensaio universal EMIC DL 2000 a 0,5 mm/min. Os valores de resistência adesiva foram analisados utilizando os testes estatísticos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney com consequente correção de Bonferroni.

Observou-se diferença estatística significativa entre os grupos estudados ($p < 0,05$), onde G1 ($36,83 \pm 4,9$ Mpa) apresentaram os maiores valores e G5 ($23,73 \pm 3,5$ MPa) os menores valores de resistência adesiva. A análise da interface adesiva revelou que grande parte das falhas ocorreu entre a interface resina composta/adesivo. A resistência adesiva do sistema adesivo universal utilizado no esmalte dental foi maior quando comparada aos demais sistemas adesivos, sendo que a prévia realização do condicionamento ácido no sistema universal e no autocondicionante promoveram maiores valores de resistência adesiva.

IMPACTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES

DUAİLIBE, Lara Ribeiro Feitosa*; SILVA, Marcos José Custódio Neto; SOUSA, Bruna Milhomens; MELO, Thayna Lima; CAMPELO, Ricardo Gabriel Calvet; PEREIRA, Adriana de Fátima Vasconcelos.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: larinha_duailibe@hotmail.com

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de sensibilidade dentinária e o impacto do tratamento periodontal não cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes da clínica de Periodontia-UFMA. Foi aplicado o índice OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) em 36 pacientes, de ambos os sexos, 18 a 59 anos, para caracterizar o impacto na saúde bucal em fraco (0 a 9), médio (10 a 18) e forte (19 a 28). Foram avaliados os parâmetros: índice de placa, sangramento gengival, profundidade de sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, mobilidade dentária, envolvimento de furca e perda dentária. Para avaliar a sensibilidade dentinária, foi utilizado um explorador dental nº5 e spray ar-água, estabelecendo-se de 0 a 10 para a intensidade da dor referida pelo paciente: nenhuma/leve (0 a 3), moderada (4 a 6) e severa (7 a 10). A sensibilidade dentinária esteve presente em 18 pacientes (50%), cujos pré-molares foram os mais atingidos (55,55%) com estreita relação à recessão gengival. Percebeu-se que a maioria da amostra (86,1%) foi impactada em alguma intensidade. Contudo, nenhum paciente obteve valor de OHIP-14 forte, ficando a amostra composta apenas por impacto fraco (75%) e médio (25%). Após o tratamento, houve melhora do diagnóstico periodontal em 42,86% dos pacientes. O índice OHIP-14 foi reaplicado ao final do tratamento, resultando em redução do impacto em 100%. Conclui-se que a sensibilidade dentinária foi mais prevalente quando associada à recessão gengival e que houve uma influência positiva do tratamento periodontal não cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes.

CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL E CLÍNICA DE CRIANÇAS COM PNEUMONIA AGUDA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

FELIPE, Karen Karollynny Pereira*; ALVES, Matheus Silva; REGO, Joseany Soares; SILVA, Elen Sousa de Abreu; SILVA, Ilana Cristina de Paula Abreu; SOUSA, Eduardo Martins de; LIMA, Lidio Gonçalves Neto

Curso: Farmácia

Categoria: Graduação

E-mail: karollynny_kkp@hotmail.com

A Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma infecção aguda comum nos hospitais estando associada a alto índice de mortalidade. A organização mundial da saúde (OMS) considera a PAC como causadora de morte em crianças devido ao alto número de mortes associadas a ela, existindo poucos estudos nesse sentido. O presente estudo propõe analisar aspectos clínico e laboratorial em crianças com PAC. Foram selecionadas Trinta e três crianças, diagnosticado com pneumonia. Os dados foram coletados relacionados às características demográficas, condição coexistente, exame clínico e os parâmetros laboratoriais: hipoxemia, contagem de glóbulos brancos e os níveis de pcr. A média de idade e peso foram respectivamente 31,4 meses e 7,8Kg. Cinquenta e dois por cento das crianças são do sexo masculino. A avaliação nutricional, em média, apresentou escore z negativo (valor médio -2,24), sendo a prevalência de crianças com score z igual -2,0 de 56,5%. A maioria das crianças (60,87%) apresenta pelo menos uma comorbidade, com histórico de tosse (73,91%), febre (95,65%), taquipnéia (47,82%) e dispnéia (82,6%). Vinte e sete por cento das crianças com PAC foi considerado com hipoxemia. O média de contagem de glóbulos branco foi de $10,225 \times 10^6/L$. A contagem foi de $11.000 \times 10^6/L$ em mais de 56,53% crianças. A média de pcr foi de 5,00 mg/dL e em 29,13% das crianças apresentaram níveis de pcr acima de 6 mg/dL. Portanto o conhecimento do perfil laboratorial e epidemiológico de crianças com PAC pode contribuir para minimizar os fatores de risco relacionados ao processo de infecção de PAC.

CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS PRESSÓRICOS E O ÍNDICE DE CONICIDADE EM PACIENTES ASSISTIDAS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO.

FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento*; SILVA, Juliana Moreira da; MORAES, Florinda Maria De Freitas; CÂMARA, Thalita De Albuquerque Veras; SANTOS, Alexsandro Ferreira Dos; DE SOUSA, Rosângela Maria Lopes; BARBOSA, José Bonifácio

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: suzanne.carolyne@hotmail.com

Verificar relação do índice de conicidade (IC) com os níveis pressóricos para risco cardiovascular elevado em mulheres adultas assistidas em ambulatório de cardiologia. Estudo transversal, realizado com população feminina adulta, maior ou igual a 20 anos, atendidas em ambulatório de cardiologia de um hospital de São Luís -MA. Foi avaliado o IC, seguindo o ponto de corte de 1,18 para mulheres como discriminador de risco cardiovascular elevado e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Foi utilizada a correlação de Pearson entre IC, PAS e PAD com nível de significância de 5%. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob o nº 33104- 0241.

Resultados: O grupo de estudo (n=372) apresentou idade média de $35,6 \pm 11,34$ anos. O valor encontrado da média do IC foi de $1,25 \pm 0,11$, onde 20,7% da população encontram-se dentro dos padrões de normalidade e 79,3% com IC elevado. A média da PAS foi de $116,14 \pm 16,88$ mmHg e PAD de $75,41 \pm 10,15$ mmHg. Tanto o IC com a PAS ($r= 0,219$; $p<0,001$), quanto o IC com a PAD ($r= 0,172$; $p=0,001$) apresentaram correlação positiva. Constatou-se que a população estudada em sua maioria possui risco cardiovascular elevado a partir do IC. Apesar da correlação entre as variáveis ter sido pequena, o valor da análise estatística foi significativo, indicando que à medida que o IC aumenta a PA também o acompanha.

RISCO CARDIOVASCULAR DE IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO CARDIOLÓGICO

FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento*; CÂMARA, Thalita De Albuquerque Veras; DUTRA, Adriana Dos Santos; MORAES, Florinda Maria De Freitas; SILVA, Juliana Moreira Da; BARBOSA, José Bonifácio; SOUSA, Rosângela Maria Lopes De

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: suzanne.carolyne@hotmail.com

Objetivos Comparar os dados antropométricos de risco cardiovascular de idosos praticantes de atividade física (PAF) e não praticantes de atividade física (não-PAF) atendidos em ambulatório cardiológico. Estudo transversal, realizado com população idosa, > 60 anos, atendida em ambulatório de cardiologia de São Luís -MA. Foi avaliado o índice de conicidade (IC), seguindo o ponto de corte de 1,18 para mulheres e 1,25 para homens como discriminador de risco cardiovascular elevado, a circunferência da cintura (CC), a razão cintura/estatura (RCEst) e o índice de massa corporal (IMC). As variáveis foram comparadas pelo teste t de Student. A relação entre o IC e as variáveis foi estimada através da correlação de Pearson (r), adotando-se o nível de significância de 5% ($p<0,05$) para ambos. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº 33104- 0241. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram incluídos 116 pacientes, com média de idade de $68,7 \pm 7,34$ anos. Não foram encontradas diferenças com significância estatística entres os grupos para o IMC ($p=0,068$), IC ($p=0,542$), RCEst ($p=0,239$) e CC ($p=0,407$). Na análise de correlação de Pearson os dados demonstraram correlação positiva e significativa entre os indicadores antropométricos, no entanto a maior correlação foi entre a CC e o RCEst ($p<0,05$; $r= 0,924$). Quanto ao risco cardiovascular avaliado entre os grupos, percebeu-se que não houve diferença significativa entre as variáveis. Ao serem comparadas entre si, as variáveis apresentam correlação positiva e significativa

COMPARAÇÃO ENTRE ASG E NRS-2002 NA TRIAGEM NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO

FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento*; MORAES, Florinda Maria De Freitas; SILVA, Juliana Moreira da; BATISTA, Célia Regina De Freitas

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: suzanne.carolyne@hotmail.com

Comparar a Avaliação Subjetiva Global (ASG) com a Nutritional Risk Screening (NRS-2002) na avaliação do estado nutricional de pacientes internados em uma clínica médica de um hospital público de São Luís –MA. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, composto por pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 19 anos, atendidos no setor de clínica médica de um hospital público de São Luís -MA. A triagem nutricional foi avaliada por meio da ASG e NRS 2002. Utilizou-se o teste exato de Fisher para avaliar a associação entre os dois métodos. A concordância entre os métodos foi medida através do índice kappa, considerando-se: fracos os valores menores que 0,20; regular entre 0,21 a 0,40; moderada de 0,41 a 0,60; boa de 0,61 a 0,80; muito boa de 0,81 a 0,99. Adotou-se o nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Foram incluídos 27 pacientes, sendo 59,26% ($n = 16$) do sexo masculino, a média de idade foi de $60,96 \pm 22,42$. Com relação ao estado nutricional, 48,15% ($n = 13$) dos pacientes foram diagnosticados com desnutrição segundo a ASG enquanto a NRS 2002 identificou 74,04% ($n = 20$) em risco nutricional. Observou-se uma associação significativa ($p = 0,006$) e uma concordância moderada entre os métodos de triagem avaliados ($k = 0,49$; $p = 0,003$). Diante dos resultados apresentados houve uma associação significativa e concordância moderada entre a ASG e NRS 2002, provavelmente por serem métodos com característica semelhantes. Dessa forma, sugere-se que ambos possam ser utilizados na identificação do estado nutricional de indivíduos hospitalizados.

EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SÃO LUÍS

FILHO, Jairton Costa*; CAMPOS, Iara Regina Serra; SOUSA, Rejane Christine De; LAHMA, Ana Paula Soares Fernandes; LEAL, Adriana Mara Araújo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: jairtonfilho@gmail.com

Os profissionais da área da saúde estão sob constantes riscos de acidentes ocupacionais envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos dos pacientes. As condições dos consultórios odontológicos oferecem ambientes favoráveis para transmissão de doenças infecciosas, uma vez que os profissionais trabalham em locais insalubres, com equipamentos e instrumentos complexos, muitos dos quais podem provocar cortes e abrasões na pele e mucosa. O objetivo desse estudo foi identificar, quantificar e avaliar os acidentes com exposição ao material biológico em profissionais de Odontologia da rede pública do município de São Luís - MA. Foi realizado um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, em 312 profissionais de Odontologia que trabalhavam em hospitais, postos de saúde e centro de saúde da rede municipal da cidade de São Luís/MA, no período de setembro de 2013 a agosto de 2014.

DIETA PÓS-OPERATÓRIA EM ODONTOLOGIA

GASSMANN, Hildenesa*; BRASIL, Paloma Dourado; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: hildenesa@hotmail.com

O uso inicial de uma alimentação mais branda e fria, além de permitir repouso local da ferida cirúrgica, minimiza o sangramento pós-operatório natural e, conseqüentemente, diminui a probabilidade de quadros hemorrágicos se instalarem. Em contra partida, o uso de dieta com alimentos quentes, ou grande exposição solar, após a cirurgia odontológica, pode ser um fator de risco para o aumento do sangramento natural pós-cirúrgico, levando a uma hemorragia causada pela vasodilatação do alvéolo. Geralmente recomenda-se por um período mínimo de 48 horas uma dieta fria e pastosa. Gradativamente, o paciente vai retornando à sua alimentação normal com o passar dos dias. Sendo assim este trabalho visa através de pesquisa de campo avaliar o grau de conhecimento dos dentistas do município de São Luís- MA, sobre a correta orientação da dieta pós operatória para um melhor restabelecimento pós cirúrgicos

EQUILÍBRIO POSTURAL E PROCESSAMENTO COGNITIVO EM IDOSOS SUBMETIDOS A ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA.

LIMA, ANTÔNIO ALMIR JÚNIOR *; OLIVEIRA, Laricy Dias; VIANA, Alef Salgado Viana; LIMA, Alysson Kenedy Sales; SAUAIA, Bismarck Ascar; Soares, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: jrlimaa@gmail.com

O envelhecimento implica alterações físico-funcionais, entre elas, alterações do equilíbrio corporal, frequentemente associado ao declínio de capacidades físico/cognitivas. Objetivou-se aqui analisar o efeito do protocolo de dupla tarefa no equilíbrio postural de idosos. Realizou-se um ensaio clínico randomizado realizado em São Luís – MA, em 2014. Amostra constituída por 40 idosos, com idade entre 70 e 75 anos. Na coleta de dados utilizou-se a Versão Timed up And Go para avaliar a mobilidade e o equilíbrio corporal dinâmico, além do risco de quedas, aplicado antes e após a intervenção de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa com duração de três meses, com a frequência de duas vezes por semana 50 minutos/dia. O tratamento estatístico realizou-se usando o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas utilizou-se média e desvio padrão convertido em escores, e o teste de contingência para variáveis independentes sendo considerado significativo $p < 0,05$. Os resultados mostraram maiores frequências, considerando-se o risco de cair em idosos, para antes, médio risco com um $n=40$ (100% da amostra) e, para depois, baixo risco com $n = 36$ (90% da amostra). Na análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se leve variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (Antes = 23,09 e Depois= 19,73), o que indica maior dispersão de valores antes da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência para variáveis independentes definiu-se $p < 0,0001$. Os resultados permitem concluir que existe uma relação altamente significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do risco de cair.

DESAFIOS DOS ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

LIMA, Sâmara Luciana de Andrade; PENHA, Karla Janilee de Souza; PEREIRA, Anna Cláudia Dias; SILVA, Mônica Barros; QUEIROZ, Rejane Christine C; FERREIRA, Meire Coelho.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: samaraandradelima@gmail.com

A importância da pesquisa em saúde na contribuição do desenvolvimento da ciência no Brasil está principalmente ligada a estudos epidemiológicos. Para a prática desses estudos é necessário compreender o funcionamento dos órgãos e/ou instituições municipais, estaduais e federais responsáveis pelas autorizações e acesso aos locais de investigação. Para que se possa observar ou intervir na população-alvo é necessário que a pesquisa seja aprovada por um Comitê de Ética local. Durante a execução da pesquisa são encontrados percalços, como: as dificuldades de acesso aos locais, à efetivação do planejamento traçado e a logística do estudo. O objetivo desta pesquisa é relatar a experiência de um estudo piloto. Os desafios que envolveram o estudo foram: acesso ao local da pesquisa, o contato e aceitação dos diretores para a realização do estudo, a aceitação pelos responsáveis para a participação de seus filhos na pesquisa, a logística de execução, o exercício de calibração dos examinadores, o qual demandou tempo e esforço para a familiarização com os instrumentos de coleta de dados e as análises necessárias para a avaliação da concordância intra e interexaminadores. Com esta pesquisa foi possível concluir que a realização de um estudo epidemiológico requer planejamento e estratégias de ação de acordo com as condições verificadas no local. Apoio financeiro: FAPEMA/MS/CNPq/PPSUS – 03386/13

AS ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA ASSOCIADAS AO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS.

LIMA, Alysson Kenedy Sales*; LIMA, Antônio Almir Junior; NASCIMENTO, Eline SAUAIA, Bismarck Ascar Lima do; VIANA, Alef Salgado; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: alyssonkenedysaleslima@gmail.com

Envelhecimento implica alterações físicas e mentais que podem remeter para uma incapacidade em realizar tarefas básicas potencializando o risco de cair. A atividade física parece minimizar este quadro promovendo ajustes posturais em situações de desequilíbrio e prevenindo quedas. Estudos indicam a realização de exercício envolvendo tarefas físico/cognitivas simultaneamente para potencializar este efeito. Objetivou-se analisar o desempenho do protocolo de dupla tarefa no risco de queda em idosos. O estudo decorreu em São Luís –MA, em 2014, amostra constituída por 40 idosos, 70 a 75 anos. Na coleta de dados utilizou-se o teste de Tinetti, versão adaptada ao Brasil, que avalia a mobilidade e equilíbrio em idosos correlacionando-os ao risco de cair. O teste foi aplicado antes e após a intervenção de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa que durou três meses, duas vezes por semana 50 minutos/dia. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva da capacidade atencional empregou-se média e desvio padrão e teste de contingência, sendo significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se o risco de cair em idosos, para antes da intervenção para médio risco ($n=28$; 70%) e, para depois da intervenção, baixo risco ($n=39$; 97,5%). Em análise

quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se maior desvio padrão para antes (22,23) relativamente à depois (13,65), indicando maior dispersão de valores antes da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência sendo significativo $p < 0,0001$. Os resultados indicam uma relação altamente significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do risco de queda.

DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.

MARTINS, Ana Carla Privado*; CECÍLIA, Jéssica; SILVIA, Di Leli; MACHADO, Patrícia; PACHECO, Ivanilde; SANTOS, Verianne; VASQUES, Júlia Soares

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: ana.cpmartins@hotmail.com

A intenção desse projeto de intervenção psicossocial foi a realização de uma experiência terapêutica aplicada pelos alunos do curso psicologia da Universidade CEUMA do 6º período, com mulheres dependentes químicas da Comunidade Terapêutica no município de São Luís – MA. A intervenção psicossocial tem um caráter de pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, organizações e/ou comunidade (Neiva, 2010). O objetivo deste trabalho consiste em contribuir para o resgate de suas histórias de vida, o autoconhecimento, bem estar, promoção da cidadania, e a viabilização da manutenção dos seus laços sociais. Assim, entendemos que a realidade dessas mulheres, aponta para uma necessidade de práticas terapêuticas capazes de atender a tais pressupostos. Foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica, o levantamento das necessidades das internas através de pesquisa semiestruturada e a intervenção, que foi realizada utilizando, como instrumentos terapêuticos, algumas técnicas de dinâmicas de grupos auxiliadas por recursos audiovisuais. Após a intervenção, foi observado que elas estavam à vontade, o que as incentivou a relatarem de forma verbal e escrita, através de registros de desenhos, o que sentiam, falando sobre suas dificuldades, compartilhando ideias e, refletindo acerca de suas histórias de vida. Expressaram-se muito esperançosas e confiantes, afirmando o desejo de profissionalizarem-se e reconstruírem suas famílias. Portanto, diante do que foi proposto, a presente intervenção o promoveu que essas mulheres, desenvolvessem alguma percepção sobre si mesmas, lançando um olhar para o futuro com mais expectativas, sonhos e projetos, além de possibilitar reflexões sobre os seus direitos de cidadania.

DEPENDENTES QUÍMICAS: UM OLHAR PARA O FUTURO A PARTIR DO RESGATE DE SUAS HISTÓRIAS DE VIDA.

MARTINS, Ana Carla Privado*; PACHECO, Ivanilde Cordeiro; CECÍLIA, Jéssica; LILI, Silvia Di; SANTOS, Verianne; VASQUES, Júlia Soares; MACHADO, Patrícia

Categoria: Graduação

Curso: Psicologia

E-mail: ana.cpmartins@hotmail.com

A intenção desse projeto de intervenção psicossocial foi a realização de uma experiência terapêutica aplicada pelos alunos do curso psicologia da Universidade CEUMA do 6º período, com mulheres dependentes químicas da Comunidade Terapêutica no município de São Luís – MA. A intervenção psicossocial tem um caráter de pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, organizações e/ou comunidade (Neiva, 2010). O objetivo deste trabalho consiste em contribuir para o resgate de suas histórias de vida, o autoconhecimento, bem estar, promoção da cidadania, e a viabilização da manutenção dos seus laços sociais. Assim, entendemos que a realidade dessas mulheres aponta para uma necessidade de práticas terapêuticas capazes de atender a tais pressupostos. Foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica, o levantamento das necessidades das internas através de pesquisa semiestruturada e a intervenção, que foi realizada utilizando como instrumentos terapêuticos, algumas técnicas de dinâmicas de grupos auxiliadas por recursos audiovisuais. Após a intervenção, foi observado que elas estavam à vontade, o que as incentivou a relatarem de forma verbal e escrita, através de registros de desenhos, o que sentiam, falando sobre suas dificuldades, compartilhando ideias e, refletindo acerca de suas histórias de vida. Expressaram-se muito esperançosas e confiantes, afirmando o desejo de profissionalizarem-se e reconstruírem suas famílias. Portanto, diante do que foi proposto, a presente intervenção promoveu que essas mulheres desenvolvessem alguma percepção sobre si mesmas, lançando um olhar para o futuro com mais expectativas, sonhos e projetos, além de possibilitar reflexões sobre os seus direitos de cidadania.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS DE SÃO LUÍS – MA

MENDONÇA, Ana Carolina Sá*; MEDEIROS, Ádila Lorena Silva; MENDES, Pauliana Conceição; NASCIMENTO, Leila Ribeiro do; SILVA, Joice Penha; CARVALHO, Laíse Neves; FERREIRA, Patricia Rodrigues

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: carol.smendonca@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi descrever o perfil profissional dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam nas unidades de terapia intensiva neonatal de São Luís – MA. A assistência prestada ao recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é complexa e exige tecnologias e estrutura adequada. Porém, para que efetivamente esta assistência seja de qualidade, torna-se mister recursos humanos altamente capacitados. Foi realizado estudo descritivo, observacional do tipo corte transversal, de agosto de 2013 a janeiro de 2014 no Complexo Hospitalar Materno Infantil Dr. Juvêncio Mattos e Hospital e Maternidade Marly Sarney com 63 profissionais entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A coleta de dados foi realizada por alunos de graduação que foram previamente treinados, sendo o instrumento um questionário modificado baseado no modelo de Nápolis (2006). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma com número do parecer 137.504. Dentre os entrevistados, 36,5% (23) eram médicos, 33,3% (21) fisioterapeutas e 30,2% (19) enfermeiros. A maioria (73%) dos profissionais são mulheres. A mediana do tempo de formado foi de 6 (0;28) anos. Apenas 36,5% (23) tem especialização em neonatologia e 28,6% (18) relatam não ter nenhuma especialização. Com relação a título de intensivista, 65,1% (41) afirmam não possuir. A UTIN é um espaço que devido à complexidade, exige profissionais de grande aporte de conhecimento, entretanto, no presente estudo observa-se precariedade com relação a qualificação do profissional.

TDAH - FIQUE ALERTA AO DIAGNÓSTICO!

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de*; SERRA, Melina

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: elianeek2@hotmail.com

Diversos especialistas têm criticado o excesso de diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e, sobretudo, a crescente utilização de psicofármacos em crianças como solução para problemas de comportamento na escola, provocando a chamada medicalização do ensino. Este trabalho está sendo realizado por meio de pesquisa bibliográfica e objetiva alertar para problemas escolares que estão repercutindo no âmbito da saúde, enquanto deveriam ser tratados com estratégias de ensino mais dinâmicas, porém a escola, muitas vezes, usa métodos que não atingem todos os alunos os quais se desinteressam, apresentando hiperatividade e situações conflitantes. Não se pode correr o risco de transformar a desobediência, a desatenção e outras características indesejadas em transtornos ou patologias, já que se deve considerar a influência do meio social e de fatores econômicos e pedagógicos sobre o modo como o aluno age, pois o seu comportamento poderá ter distintas causas: personalidade, história particular, situações pelas quais estão passando, imaturidade, aulas desestimulantes. Diante da complexidade e falta de evidências científicas que sustentem uma etiologia única, o diagnóstico deve ser clínico, verificando se as características do TDAH estão mesmo presentes na criança para excluir outros transtornos, sendo imprescindível a colaboração familiar, dos psicólogos e dos professores, porque, embora haja excessos de diagnósticos, há casos graves do transtorno que precisam de medicação, tratamento com profissionais e educadores especializados, com capacidade para lidar com esse fenômeno, além do envolvimento e colaboração da família.

GRUPO OPERATIVO COM GESTANTES: Uma ótica na qualidade de vida

MELO, Emanuelle Ferreira *; Mendonça, Thais Andres

Curso: Terapia Ocupacional

Categoria: graduação

E-mail: emanuellemelo.to@gmail.com

O período gravídico demanda suporte não só de seu aspecto biológico, por meio do pré-natal, mais também de outras questões subjetivas, visto que, essa situação pressupõe de plenitude e bem-estar, desta forma a pesquisa procura

avaliar a qualidade de vida das gestantes através de um grupo operativo ofertado pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Avaliar a qualidade de vida das gestantes que participam de um grupo operativo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vicente Fialho do município de São Luís no estado do Maranhão. A opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa do tipo exploratório/descritivo e foi utilizado como instrumento para coleta de dados o WHOQOL – BREF desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os sujeitos da pesquisa foram uma amostra de conveniência de 20 gestantes. A avaliação da qualidade de vida na primeira aplicação nos mostrou que 50% avaliaram sendo ruim e regular a outra metade considera satisfatória sua qualidade de vida de forma geral. Quanto aos domínios analisados obteve um escore alto para o domínio físico de 85% que estão entre péssimas e ruins, já o domínio psicológico a escore obtida foi 80% que se dividem entre ruins e regular no escore no domínio das relações sociais 55% estão razoáveis este domínio foi o que obteve menor escore, porém o domínio do meio ambiente com 95% estão entre ruim e regular. O estudo mostra que o grupo operativo promove a qualidade de vida durante a gestação através dos fatores que as influenciam diretamente. Quanto à segunda avaliação da qualidade de vida geral obteve-se 25% de aumento favorável, no domínio físico 25% de aumento benéfico mediante suas facetas, já o domínio psicológico 15% aumentaram proveitosamente suas escores, no escore do domínio das relações sociais 15% desenvolveram positivamente, porém o domínio do meio ambiente houve um aumento de 25% favorável nesse aspecto então, constatou-se que houve um aumento significativo 90% nos domínios e nas suas respectivas facetas.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PRESENTES EM DIETAS ENTERAIS DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO LUÍS-MA

MELO, Thalyta Araújo *; CARVALHO, Sabrina Cantanhede; FIGUEIREDO, Patrícia de Maria Silva

Curso: Nutrição

Categoria: graduação

E-mail: talytinha_melo@hotmail.com

As dietas enterais são ricas em macro e micronutrientes e, por isso, tornaram-se excelentes meios de crescimento de microrganismos. A administração de dietas contaminadas pode não somente causar distúrbios gastrointestinais, mas contribuir para as mais graves infecções, principalmente em pacientes hospitalizados, idosos ou imunocomprometidos. Considerando que os alimentos constituem fonte potencial de patógenos no ambiente hospitalar, o objetivo do presente trabalho foi identificar os principais microrganismos presentes em dietas enterais de um hospital particular de São Luís -MA. Foram avaliadas um total de 8 amostras de dietas enterais. As amostras foram submetidas a análise microbiológica no laboratório de microbiologia médica e de alimentos da Universidade Ceuma segundo protocolos convencionais de análise de alimentos. Verificou-se a contaminação das amostras por *Serratia liquefacies*, *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae*, *Citrobacter freeundi*, *Shigella* SP, *Salmonella paratyphi*, *Salmonella choleraesuis*, *Hafnia alvei*, *Citrobacter diversus*. Os resultados obtidos mostram que as dietas enterais analisadas deste hospital apresentaram microrganismos que podem causar sérios riscos à saúde dos hospitalizados e que desta forma medidas devem ser tomadas para que haja um maior controle na sua manipulação além da realização de análises microbiológica rotineiras.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM HIPERFOSFATEMIA EM HEMODIÁLISE

MESQUITA, Patrícia de Souza; SOUSA, Jaiçara Melo de Araújo; JARDINS, Ana Tamires; COSTA, Gilmara de Sousa da; RABÊLO, Nara Lúcia Diniz; ROCHA, Marina de Souza; HORTEGAL, Elane Viana

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: patricia.smesquita@hotmail.com

Apesar dos avanços no tratamento da DRC, a morbimortalidade continua elevada, causada, entre outros fatores, pelo quadro de hiperfosfatemia, comum nos pacientes em hemodiálise. A intervenção e o acompanhamento nutricional são necessários e fazem parte do tratamento do paciente hiperfosfatêmico em hemodiálise. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da intervenção nutricional em pacientes hiperfosfatêmico em hemodiálise. Trata-se de um estudo prospectivo não controlado, no qual foram avaliados pacientes em programa regular de hemodiálise em uma clínica especializada do município de São Luís – MA. Para efeito do estudo foi utilizada amostra de conveniência. Constituíram a casuística os pacientes em programa regular de hemodiálise que apresentaram média

de concentração de fósforo superior a 5,5mg/dl nos três meses que antecederam a intervenção e com idade igual ou superior a 20 anos. Os pacientes hiperfosfatêmicos responderam um questionário contendo perguntas fechadas para avaliar o conhecimento sobre o fósforo e coletaram-se resultados dos exames laboratoriais para avaliar o nível sérico do fósforo antes e após a intervenção. A média da concentração sérica de fósforo dos pacientes que receberam orientação nutricional diminuiu de 6,37 (\pm 1,13) mg/dL para 5,51 (\pm 1,03) mg/dl e a quantidade de pacientes com fósforo alterado foi reduzida a metade, após a intervenção nutricional. Os resultados sugerem a importância do nutricionista na promoção da educação nutricional dos pacientes de forma a contribuir com o tratamento da hiperfosfatemia.

CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA COMPARADO AO DE OUTROS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER.

MORAES, Florinda Maria De Freitas*; DUTRA, Valéria Bogéa; SILVA, Juliana Moreira da; FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento; CHEIN, Maria Betânia da Costa; DOS SANTOS, Alexsandro Ferreira

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: florindaaflor@hotmail.com

Avaliar o consumo alimentar de pacientes com câncer de mama comparado ao consumo de pacientes com outros diagnósticos de câncer. Estudo transversal, caso-controle, analítico, realizado com a população feminina, com idade > 18 anos, em hospital oncológico de referência de São Luís -MA. O consumo alimentar foi avaliado por um questionário de frequência alimentar quantitativo. Utilizaram-se os valores recomendados pelas Dietary Reference Intakes para avaliar a ingestão de macronutrientes utilizando-se os intervalos aceitáveis para a sua distribuição: 45-65% (carboidratos), 10-35% (proteínas) e 20-25% (lipídios totais). Para a comparação das médias do consumo alimentar entre os grupos foi utilizado o teste "t" de Student ($p < 0,05$). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, parecer de nº 566.333. Da população estudada ($n=50$), 26 apresentaram diagnóstico de câncer de mama e 24 outros diagnósticos de câncer, a idade média foi de $43,53 \pm 10,61$ anos. O consumo energético para os pacientes com câncer de mama e a distribuição dos macronutrientes foi respectivamente $938,28 \pm 267,61$ kcal e $905,01 \pm 309,71$ kcal ($p = 0,663$), $52,81 \pm 7,24$ e $51,85 \pm 8,29\%$ para carboidratos ($p = 0,64$), $17,61 \pm 1,83$ e $18,91 \pm 3,87\%$ para proteínas ($p = 0,098$) e $30,30 \pm 7,19$ e $29,79 \pm 5,76\%$ para lipídios ($p = 0,771$). O consumo de macronutrientes quanto sua distribuição mostrou-se adequado em relação às recomendações em ambos os grupos. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes quanto ao consumo de energia e macronutrientes entre os grupos de mulheres com câncer.

CORRELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM INDICADORES DE ADIPOSIDADE EM MULHERES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA.

MORAES, Florinda Maria de Freitas*; SILVA, Juliana Moreira da; FERREIRA, Suzanne Carolyne do Nascimento; CÂMARA, Thalita de Albuquerque Veras; DOS SANTOS, Alexsandro Ferreira; BARBOSA, José Bonifácio

Categoria: Graduação

Curso: Nutrição

E-mail: florindaaflor@hotmail.com

Correlacionar diferentes indicadores de adiposidade com a pressão arterial em mulheres atendidas em ambulatório de cardiologia. Estudo transversal, composto por pacientes do sexo feminino, adultas, idade igual ou superior a 20 anos, realizado em um ambulatório particular de cardiologia em São Luís -MA. Os indicadores antropométricos utilizados foram índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e razão cintura/estatura (RCEst) e dados clínicos como pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Na análise da relação entre as variáveis do estudo, foi utilizada a correlação de Pearson adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob o nº 33104-0241/2007, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram incluídos 372 pacientes, o IMC de 35,75% das mulheres foi superior a 24,9 kg/m² indicando excesso de peso. Em relação a CC e RCEst, 31,45% apresentaram $CC \geq 80$ cm e 52,69%, $RCEst \geq 0,53$ representando risco elevado para doenças cardiovasculares. Na análise de correlação de Pearson, os dados demonstraram correlação positiva entre os níveis de PAS e PAD e as variáveis IMC ($r = 0,386$ e $r = 0,427$), CC ($r = 0,387$ e $r = 0,381$) e RCEst ($r = 0,367$ e $r = 0,372$) com nível de significância de $p < 0,001$ para todas as correlações. Verificou-se que os indicadores IMC, CC e RCEst estão positivamente correlacionados com a elevação da pressão arterial, sinalizando a influência dos indicadores de adiposidade avaliados na pressão arterial.

ÍNDICE DE CONICIDADE ASSOCIADO À PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS DE UM AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA

MORAES, Florinda Maria De Freitas*; BARBOSA, José Bonifácio; FERREIRA, Suzanne Carolyne Do Nascimento; FERREIRA, Ilana Carla Dos Anjos; SILVA, Juliana Moreira Da; SANTOS, Alexsandro Ferreira Dos

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: florindaaflor@hotmail.com

Avaliar a associação do índice de conicidade (IC) com os níveis de pressão arterial (PA) de pacientes idosos atendidos em ambulatório cardiológico.

Estudo transversal, realizado em um ambulatório cardiológico de São Luís-MA com pacientes de 60 a 94 anos, de ambos os gêneros e todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram adotados os pontos de corte para o IC de 1,25 e 1,18 para homens e mulheres, respectivamente. Foi definido como hipertenso o indivíduo que apresentou PA sistólica (PAS) >140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) >90 mmHg. Para a associação das variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher e para correlação, o coeficiente de correlação de Pearson ($p < 0,05$). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, protocolo nº 33104- 0241/2007. Foram avaliados 116 pacientes com média de idade de $68,7 \pm 7,34$ anos. Notou-se excesso de peso em 41,86% dos homens e 54,74% das mulheres segundo o IMC. Não foi observada associação significativa entre o IC e a PAS e PAD ($p = 0,138$). Quanto à correlação o IC apresentou correlação positiva com a PAS e PAD, com significância estatística apenas entre o IC e PAD na população masculina ($p = 0,009$). Na correlação das medidas de PAS e PAD com o IC, observou-se que quanto maior o IC maior a PAS e PAD. No entanto, o valor com maior significância estatística foi referente à PAD na população masculina idosa. Logo, mais estudos precisam ser realizados para maior acurácia dos dados.

ACESSIBILIDADE ORGANIZACIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL À REABILITAÇÃO MOTORA EM SÃO LUÍS: COMO ESTAMOS?

NASCIMENTO, Leia Ribeiro do*; COSTA, Jéssica Bianca Pinheiro; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; PEREIRA, Eugênia Aires; ALMEIDA, Natália Fernanda Gaspar de; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: leiaribeiro-20111@hotmail.com

Caracterizar a acessibilidade organizacional de crianças com Paralisia Cerebral à reabilitação motora no Sistema Único de Saúde na cidade de São Luís – MA. A Paralisia Cerebral refere-se a uma síndrome de caráter não progressivo, que acomete o sistema nervoso central imaturo e em desenvolvimento, ocasionando desordens motoras. O difícil acesso das pessoas com deficiência aos serviços necessários tende a potencializar a deterioração provocada pelo agravo, levando ao aparecimento de condições secundárias que contribuem para a diminuição da qualidade de vida. Foi realizado estudo observacional, descritivo, transversal na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Luís – MA, no período entre janeiro e abril de 2014. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário modificado de Torres (2010). Os dados são apresentados em frequência relativa e percentual. A amostra foi constituída por 21 crianças, sendo 90,5% (19) encaminhada para fisioterapia por indicação do serviço de saúde. Para marcação da avaliação, 76,2% (16) relatam que foram ao local pessoalmente. Quando questionados sobre dificuldades em relação esse primeiro contato, 95,2% (20) relatam que não houve nenhuma e 52,4% (11) referem satisfeitos. Após a marcação da avaliação, 52,4% (11) esperaram até 7 dias para o atendimento, porém, para 47,6% (10) dos responsáveis, esse tempo não pareceu nem grande nem pequeno. Apenas 19,0% (4) relatam que encontraram dificuldades para continuar a fisioterapia motora e 61,9% (13) referem estar satisfeitos com o tratamento recebido. Observaram-se avaliações positivas em relação à acessibilidade organizacional aos serviços de reabilitação em São Luís.

PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA

NASCIMENTO, Thanieri Dos Santos*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; DIAS, Rosane da Silva; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: thannyere_nascimento@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de asma em um grupo de escolares da rede pública de ensino. Asma é uma doença inflamatória crônica associada à hiperresponsividade das vias aéreas. Estima-se que atualmente existem 300 milhões de pessoas com esta doença no mundo. Embora essa patologia possa ocorrer em qualquer fase da vida, é mais comum que os primeiros sintomas apareçam na infância. Foi realizado estudo transversal no período de agosto e setembro de 2013 em uma escola da rede pública de ensino de São Luís – MA. Foram incluídos no estudo 78 alunos, de ambos os gêneros. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Na análise bivariada, foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo estabelecido nível de significância de 5%. A prevalência de asma na amostra estudada foi de 42,3%, sendo que entre 9 a 11 anos, 24 (72,7%) escolares apresentaram asma e entre 12 e 14 anos, apenas 9 (27,3) tiveram. A mediana do pico de fluxo dos indivíduos com asma foi de 410 (260-590) L/min. Não foi verificada associação estatisticamente significativa entre aspectos sociodemográficos e asma. Este estudo evidenciou que escolares de uma rede pública de ensino mostram uma alta prevalência de asma, dessa forma medidas educativas devem ser instituídas para minimizar o impacto dessa doença nessa população.

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE DUPLA TAREFA NA FLUÊNCIA VERBAL DOS IDOSOS

NASCIMENTO, Eline Lima do; * LIMA, Alysson Kenedy Sales; SAUAIA, Bismarck Ascar; VIANA, Alef Salgado; LIMA, Antônio Almir Junior; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: elinelima33@hotmail.com

A cognição dos idosos apresenta um declínio natural e gradual. Estudos indicam que a atividade física regular retarda essa perda, mas poucos referem utilização de exercícios de dupla tarefa, envolvendo funções físicas e cognitivas. Objetivou-se aqui avaliar a fluência verbal de idosos, após treinamento com dupla tarefa através de um estudo realizado em São Luís - MA em 2014, com amostra constituída por 40 idosos (entre 70-75 anos). Na coleta de dados utilizou-se o teste de fluência verbal na categoria animais, que fornece informações acerca da memória semântica, habilidade de recuperar informação memorizada e processamento das funções executivas. O teste foi aplicado antes e após a intervenção de um protocolo de dupla tarefa com duração de três meses, duas vezes por semana 50 minutos/dia. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas empregou-se média e desvio padrão, e teste de contingência sendo significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se a habilidade de recuperar informações de memória, para antes baixa e alta capacidade de valores equitativos ($n=20$; 50%) e, para depois, alta capacidade, com $n=37$ (92,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se estatística descritiva observou-se leve variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (Antes=0,0; Depois=2,82), o que indica maior dispersão de valores depois da aplicação do protocolo; com aplicação do teste de contingência para variáveis independentes ficou definido um (p) 0,4352. Os resultados permitem afirmar que estatisticamente não existe relação significante entre a aplicação do protocolo e o aumento da capacidade de recuperar informações.

USO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DO CUIDADO E ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.

OLIVEIRA, Viviane Cardoso Lima *; CAMPOS, Beatriz Galdino de Sousa; TORRES, Carla Gardênia do Rego Brandão; SANTOS E SANTOS, Leandro; MENEZES, Pedro Valdo Lucena; Reis, Waneska Ferreira Cavalcante de Albuquerque

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

E-mail: vivi_cslm@hotmail.com

Resumo: Os indicadores de saúde representam instrumentos epidemiológicos que contribuem para avaliação e monitoramento dos resultados alcançados em relação à assistência e organização do cuidado odontológico. O advento do Pacto pela Saúde institui diretrizes, metas e prioridades que devem nortear as ações e serviços em saúde no Brasil. Considerando que as políticas públicas de saúde bucal devam ser otimizadas, permitindo maior efetividade e equidade social, o objetivo do estudo é descrever o acesso ao cuidado odontológico e monitoramento das necessidades de saúde nas zonas urbanas e rurais do estado do Maranhão através do uso de indicadores. Trata-se de um estudo descritivo a partir de observações de fontes secundárias envolvendo dados coletados do Sistema de Informação da Atenção Básica. Foram utilizados indicadores de desempenho (cobertura de 1ª consulta odontológica programada e escovação dental supervisionada) e monitoramento (instalação de prótese dentária e diagnóstico de alteração da mucosa oral). Os resul-

tados evidenciam que apenas 37% da população da zona rural do estado do Maranhão é beneficiada pelas ações de escovação dental, visando à prevenção de doenças bucais e que o acesso a tratamento odontológico aconteceu em maior proporção na zona urbana. Em relação à demanda de reabilitação protética, a zona rural demonstra menor percentual de população assistida, bem como ações para diagnóstico precoce das lesões de mucosa e câncer bucal. Os indicadores epidemiológicos demonstram uma relação desigual na produção do cuidado em saúde bucal, com existência de localidades que não conseguem usufruir completamente das estratégias de promoção da saúde.

EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO DA DENTINA COM BIOVIDRO NIOBOFOSFATO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES.

OLIVEIRA, Gilliard Lima*; CARNEIRO, Karina Gama Kato; CARVALHO, Ceci Nunes; MAIA-FILHO, Etevaldo Matos; LIMA, Darlon Martins; BAUER, José Roberto de Oliveira; LEAL, Adriana Mara Araújo

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: gilliard77@gmail.com

As interfaces adesivas com a dentina se deterioram após períodos relativamente curtos de tempo. Alternativas tem sido sugerida para compensar essa deterioração entre elas a aplicação do biovidro. Este estudo avaliou a resistência de união (imediate e 6 meses) dos adesivos autocondicionantes à dentina após jateamento do substrato com partículas do biovidro niobofosfato (NBG). Foram usados 32 dentes hígidos divididos aleatoriamente nas seguintes condições experimentais: pré-tratamento da dentina (com jateamento com NBG e sem jateamento); adesivos: Clearfil S3 Bond (CS3), Adper Easy One (AEO) e período de avaliação: 24 horas e 6 meses. Metade dos dentes tiveram a dentina jateada com NBG por 15 seg/5bar/1cm. Os sistemas adesivos autocondicionantes foram aplicados de acordo com as normas dos fabricantes. Os dentes foram restaurados e cortados perpendicularmente para obtenção de espécimes (0,9mm²). O teste de microtração foi realizado em uma máquina de ensaio universal após 24 horas e 6 meses. O padrão de fratura foi avaliado em uma lupa estereoscópica (10x). Os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. O AEO apresentou os maiores valores de resistência de união ($p = 0,03$). Os valores de resistência de união no período de 24 hs foram superiores ($p = 0,04$). O jateamento com NBG não alterou os resultados de resistência de união, quando comparado ao grupo sem jatear ($p = 0,4$). A maioria das fraturas dos espécimes foram adesiva/mista. Concluiu-se que o jateamento à dentina hígida com biovidro niobofosfato não afetou a resistência de união dos adesivos autocondicionantes.

INFORMAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE RISCO PARA SAÚDE: EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS CURSOS DA SAÚDE?

PEREIRA, Eugênia Aires*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; LIRA, Marcela de Araújo; NASCIMENTO, Leia Ribeiro; SILVA, Joice Penha; CARVALHO, Laíse Neves DIAS, Rosane da Silva

Categoria: Graduação

Curso: Fisioterapia

E-mail: eugeniaapereira@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar as informações sobre comportamento de risco para saúde entre graduandos de saúde uma universidade privada de São Luís. A adoção de comportamentos de risco à saúde como inatividade física, fumo, dieta inadequada e abuso de bebidas alcoólicas é responsável por uma parcela significativa de mortes prematuras, sendo o conhecimento a melhor forma de prevenção. Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, realizado no período entre abril e agosto de 2013 na Universidade Ceuma. Foram incluídos no estudo 354 discentes da área de saúde de ambos os sexos, com idade entre 18 e 28 anos, regularmente matriculados em períodos com disciplinas teóricas. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para o Brasil. Na comparação do conhecimento dos alunos dos diversos cursos foi utilizado o teste Qui-Quadrado interpretado ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA com parecer 372.391. Os alunos que mais relataram informações sobre comportamento de risco para saúde foram os de medicina ($p < 0,01$), perdendo apenas para enfermagem no que alude a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (79,2%) e a gravidez (66,7%), para o curso de nutrição no que se refere a dados dietéticos e nutricionais (71,9%) e para o curso de educação física nas informações sobre atividade física (78,6%). Existem deficiências relacionadas aos conhecimentos sobre comportamento de risco entre os diferentes cursos de saúde.

CONHECIMENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS COM A DENTIÇÃO DECÍDUA

PINTO, Thaysa Fernandes*; SANTOS, Maurílio Dias; SILVA, Mariana Carvalho Batista da

Curso: Odontologia

Categoria: graduação

E-mail: thaysafp@gmail.com

Dentro da família é possível observar o papel de liderança assumido pela mãe em relação aos cuidados com a saúde, sobretudo a saúde bucal das crianças. Avaliar o significado do processo saúde-doença para mães torna-se importante para definição de políticas de saúde que influenciam os cuidados com a saúde bucal (SB) de crianças. Com o objetivo de demonstrar o conhecimento materno sobre cuidados com a dentição decídua foi aplicado um questionário com dados sócio demográficos e questões sobre conhecimento de SB para mães de crianças de 0 a 5 anos de idade usuárias da Unidade de Saúde da Família do Pirapora, na cidade de São Luís(MA). A análise das questões relacionadas ao nível de conhecimento foi determinada por uma matriz de resposta. Definiram-se dois parâmetros: conhecimento adequado – para um número de acertos entre 13 e 20; e conhecimento não adequado – menos de 13 acertos. Foi realizada estatística descritiva e teste do Qui-Quadrado e Exato de Fischer ($\alpha=0.05$). Estudo aprovado pelo CEP/Uniceuma (199.537/12). 84 mães foram entrevistadas. 64,29% apresentou nível adequado de conhecimento. Em relação à condição socioeconômica a maioria (53,7%) era da classe C, com idade superior a 20 anos (85,71%), com escolaridade maior que 12 anos (40,48%). A variável classe socioeconômica foi significativa ($p = 0,01$). Idade ($p=0.27$), escolaridade ($p=0.06$), cor da pele ($p= 0.43$), acesso a serviço odontológico ($p=0.06$) e recebimento de orientação de higiene bucal da criança ($p=0.26$) não foram significantes. Os dados mostram que, o fator socioeconômico é o principal fator que interferiu no conhecimento materno.

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL DE MULHERES FUMANTES

RAMALHO, Dacimar Gomes*; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima Neuenschwander;

ARAÚJO, Ana Eugênia Ribeiro De Araújo e; BACELAR, Solange Negreiros de Almeida;

MARINHO, Erika Germana Vieira Monteiro; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; MUALEM, Michelle Villas Boas

Curso: Estética

Categoria: Graduação

E-mail: dacimargomes@gmail.com

O envelhecimento facial cutâneo é um processo multifatorial, que ocorre de maneira gradativa e se divide em dois tipos: cronológico (intrínseco) e fotoenvelhecimento (extrínseco), e os cofatores ambientais mais importantes para esse processo são o sol e o cigarro, respectivamente. As modificações estruturais decorrentes do envelhecimento cronológico podem ser tratadas ou adiadas com uso de cosméticos tópicos à base de vários ativos, destacando-se o ácido hialurônico. O presente trabalho objetiva avaliar os efeitos do ácido hialurônico no rejuvenescimento facial de mulheres fumantes, verificar sua atuação na hidratação da pele, comparando seu efeito entre mulheres fumantes e não fumantes. Foi realizado um estudo prospectivo com 14 mulheres, divididas em 02 grupos (7 tabagistas e 7 não tabagistas), com idade entre 35 e 55 anos, com fototipo de pele IV, V e VI. Os dados iniciais foram coletados a partir da avaliação da pele feita através da ficha de anamnese e em seguida disponibilizado um kit contendo sabonete, creme com ácido hialurônico e filtro solar. As voluntárias foram orientadas para o uso contínuo dos cosméticos em suas residências. As avaliações independentes deram-se através da análise do questionário de autoavaliação. Entre os resultados, 50% das voluntárias consideraram melhoria das linhas de expressão e rugas e 100% delas ficaram satisfeitas com a hidratação, além de melhorias na textura, brilho e maciez. O ácido hialurônico, tratando de prevenção ou tratamento do envelhecimento facial cutâneo, mostrou portanto ter efeito benéfico para o rejuvenescimento facial proporcionando tonicidade e elasticidade à pele.

MONITORAMENTO TEMPO E TEMPERATURA DE REFEIÇÕES DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino*; ARAÚJO, Marylana Ferreira; AIRES, Lisiane Silva Cruz;

CANTANHEIDE, Nadya Vanessa; MORAIS, Jeane Cristina; ROCHA, Marina Sousa

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Modalidade: Paineis

E-mail: jeanecrys@hotmail.com

Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por um intenso processo de transformação devido ao desenvolvimento industrial. As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) desempenham papel fundamental na saúde da população por meio da qualidade do alimento que produzem. Um dos fatores que pode prevenir alguns problemas de saúde é a temperatura do alimento, podem influir no crescimento dos microrganismos. O trabalho objetivou verificar a relação entre tempo e temperatura das refeições prontas para o consumo em um restaurante de alimentação coletiva. A avaliação do tempo e da estrutura dos alimentos aconteceu no mês de agosto de 2014. Foram escolhidos três tipos de preparações, as quais são servidas diariamente (arroz, feijão, proteína). Foi utilizado um termômetro tipo espeto digital para tal procedimento. Os dados obtidos foram transferidos em planilha no Microsoft Excel®, e comparados o binômio tempo e temperatura encontrados, com os recomendados pela legislação. A temperatura do início, meio e fim da preparação de arroz e feijão apresentaram temperatura adequada segundo a RDC (ANVISA, 2004) que padroniza que os alimentos quentes devem ser mantidos acima de 60°C por até seis horas já carne chegou ao balcão térmico na temperatura inadequada, e continuou ao longo da distribuição, sua temperatura teve uma alta no horário de 11:30 com 62,86°C. Os resultados apresentados mostraram que a carne necessita de medidas corretivas para melhoria da qualidade de temperatura. O controle de tempo e temperatura deve ser realizado diariamente através de termômetros em todas as fases do processo de produção.

O USO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RODRIGUES, Laíse Nunes*; SANTOS, Adriano Tavares; VIEIRA, Clarissa

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: lise-nunes@hotmail.com

As atividades antimicrobiana e anti-inflamatória de diversas ervas e plantas vem sendo estudadas em vários países. Na Odontologia o interesse na utilização dos produtos fitoterápicos vem crescendo como alternativa de tratamento e prevenção do biofilme dental. Pesquisas vêm apontando que a distinção das características fenotípicas das bactérias inseridas no biofilme dental resulta no aumento de resistência dos biofilmes aos agentes antimicrobianos. Baseado nisto, os medicamentos fitoterápicos podem representar uma opção no combate aos microrganismos resistentes, pois possuem, na maioria das vezes ação mais suave que os medicamentos alopáticos, e ainda ajudam a reduzir os efeitos colaterais, prejudiciais à saúde. Porém, a indicação do uso de fitoterápicos na medicina humana não é substituir medicamentos já registrados e comercializados com eficácia comprovada, mas sim aumentar a opção terapêutica dos profissionais de saúde, oferecendo medicamentos equivalentes, também registrados e com eficácia comprovada, para as mesmas indicações terapêuticas e, eventualmente, com indicações complementares às existentes. Portanto, o objetivo dessa revisão de literatura é estudar alguns desses produtos e suas propriedades farmacológicas a fim de incentivar sua utilização na cavidade bucal.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES OSTOMIZADOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SÃO LUÍS – MA NO ANO DE 2013

SAUAIA, Cleres Helena Santos*; PRADO, Rosa de Paula e Silva; SILVA, Maryjom Venicius Teixeira;
FILHO, Euler Nicolau Sauaia; DOS SANTOS, Orlando José.

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: rosinhadp@gmail.com

Os estomas são aberturas cirúrgicas feitas na parede do intestino no caso de enfermidades em que haja a necessidade do desvio do trânsito intestinal para o meio externo. Nesse contexto, conhecer a casuística de cada grupo de pacientes é relevante para se planejar atendimento adequado e equânime. Dessa forma, avaliou-se o perfil epidemiológico dos pacientes estomizados assistidos pelo Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Presidente Dutra (HUUPD). A metodologia consistiu no estudo observacional, descritivo, retrospectivo e individuado em que foram coletados dados de 101 pacientes com estomas intestinais de eliminação cadastrados no referido programa de janeiro a dezembro de 2013, com análise das variáveis: idade, sexo e procedência dos pacientes, indicação, tipo e caráter temporal dos estomas. Após coleta dos dados, foi realizada sua análise descritiva pelo Bioestat 5.0. Dos 101 pacientes, 65,3% eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi 43,15 anos. A maior parte dos pacientes (67,4%) era procedente de São Luís-MA, e 32,6% do interior do estado. Com relação ao tipo de estoma, 77,3% eram colostomias e 22,7% ileostomias, sendo que 81,18% deles eram temporários e 18,82% definitivos. A causa principal de indicação dos estomas foi o trauma abdominal (27,7%), com atenção para o trauma por arma de fogo (71,5%); a segunda causa mais frequente

foi a neoplasia maligna do trato gastrointestinal, seguido pelo abdômen agudo inflamatório. Conclui-se que o perfil dos pacientes ostomizados sugere a realização de intervenções na prevenção e promoção da saúde e na construção das estratégias de enfrentamento das enfermidades.

INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOB NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

SCHERR, Jéssica Torres*; CALISTO, Mariana Martins; SANTANA, Renata Karissa Pessoa; VIEIRA, Kelly Luana Rodrigues; CARVALHO, Laíse Neves; SILVA, Anieli Aranha

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: kluanavieira@hotmail.com

Esse trabalho tem como objetivo verificar a influência da idade e escolaridade materna sobre o planejamento familiar. Segundo o Ministério da Saúde vários aspectos sociodemográficos, como idade, escolaridade, estado civil e ocupação influenciam no planejamento familiar. Estudos descrevem que as famílias mais numerosas pertencem a mães mais jovens e analfabetas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional, do tipo corte transversal, realizado com 48 gestantes. O estudo foi realizado em quatro unidades básicas de saúde: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, no período entre setembro de 2013 a março de 2014. Para coleta de dados foi utilizado um questionário formulado por preceptores do PET-saúde Redes da Universidade Ceuma, sendo sua aplicação realizada por alunos voluntários e bolsistas do programa. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual. O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Uni-ceuma com número de parecer 743094. Apenas 35,4% (17) das mulheres planejaram a gestação. Entre estas, 17,6% (3) tem abaixo de 18 anos, 41,2% (7) entre 18 e 28 anos e 41,2% (7) acima de 28 anos. A maioria 52,9% (9) são casadas e 41,25% (7) são analfabetas, porém, 17,6% (3) cursaram até 8ª série do ensino fundamental, 11,8% (2) o ensino médio incompleto e 23,5% (4) ensino médio completo. Embora a adolescência interfira negativamente no planejamento familiar, isso não foi verificado. Com relação ao nível de escolaridade, esse aspecto influenciou no planejamento familiar da amostra estudada.

IMPACTO DO TRAUMATISMO DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES E DE SUAS FAMÍLIAS

SERRA, Tallita Ferreira Moraes*; BRITO, Marcelle Luanna Oliveira; FERREIRA, Meire Coelho Ferreira,

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: tallitavip@hotmail.com

Na atualidade, o traumatismo dental tem se tornado um dos maiores problemas de saúde bucal pública (Malikaew et al., 2005). O acometimento de crianças pré-escolares pode levar a um impacto na qualidade de vida (Kramer et al., 2013). O objetivo do estudo foi avaliar o impacto do traumatismo dental na qualidade de vida de crianças pré-escolares e de suas famílias. A amostra do estudo foi composta por 39 crianças de 2 a 5 anos de idade, matriculadas em creches/pré-escolas públicas e privadas São Luís/MA. As crianças foram avaliadas para traumatismo dental (Andreasen et al., (2007). Um questionário sócio demográfico e o Brazilian Oral Health Impact Scale (B-COHIS) foi aplicado no formato de entrevista. Estatística descritiva e teste de Mann-Whitney ($p < 0,05$) foram realizados. Os grupos de estudo foram: crianças sem trauma e com 1 ou mais dentes com trauma. A média de idade das crianças foi de 4,05 (1,05) anos, sendo 24 (61,5%) do sexo masculino e 15 (38,5%) do sexo feminino. Trinta e seis por cento da amostra apresentou traumatismo dental. A idade mais acometida por trauma foi 5 anos. Quanto ao impacto do trauma na qualidade de vida, não houve diferença significativa entre os grupos tanto para a escala total do ECOHIS ($p = 0,585$), quanto para seus domínios ($p > 0,05$). Conclui-se que para a amostra estudada, independente da criança apresentar traumatismo dental, sua qualidade de vida foi afetada, o que pode estar diretamente relacionado a outras alterações bucais como cárie dentária.

INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SUS

SILVA, Larissa Arani Coleta Ramos da*; SILVA, Ana Nilza Lins; CARVALHO, Laíse Neves Carvalho; CAVALCANTE, Mirella Araújo;

Curso: Medicina

Categoria: Graduação

E-mail: larissaarani@hotmail.com

O objetivo do trabalho é avaliar a quantidade de consultas pré-natais realizadas por gestantes que foram atendidas em unidades básicas de saúde de São Luís. A assistência pré-natal visa avaliar a condição materna e fetal de forma precoce com o intuito de prevenir ou atenuar prováveis complicações, assim sendo de significativa importância tanto para a gestante, quanto para o conceito. A metodologia baseia-se em um estudo quantitativo, descritivo, observacional, de corte transversal, realizado com 46 gestantes atendidas em quatro unidades básicas de saúde, de São Luís - Maranhão: Djalma Marques, AMAR, São Raimundo e Pirapora, nos meses de setembro de 2013 a março de 2014, com informações coletadas, através de um questionário formulado pelos preceptores do Pet-Saúde da Universidade Ceuma. Os resultados obtidos mostraram que, das 46 gestantes incluídas na amostra, apenas 36,9% (17) planejaram a gestação. Destas, 17,6% (3) não realizaram nenhuma consulta médica, 29,4% (5) uma consulta, 23,5% (4) duas, 5,9% (1) três, 5,9% (1) quatro, 5,9% (1) cinco, 5,9% (1) seis e apenas 5,9% (1) nove consultas. Através da análise dos resultados, percebe-se que mesmo entre gestantes que planejaram a gravidez, há um elevado número de mulheres que não realizaram consulta durante a gestação, o que indica um relevante risco para a saúde materna e fetal. Assim, considera a maior necessidade de orientação sobre a importância dos cuidados pré-natais, intensificando as campanhas voltadas para a explicação dos benefícios e da essencialidade da realização de consultas pré-natais.

PERFIL DE HIGIENE BUCAL DE CUIDADORES DE PNE

SILVA, Bruna Leticia Rosa da*; SANTOS, Marcela de Jesus Castro; PIAZERA, Cyrene

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

E-mail: brunarosa_sl@hotmail.com

Essa pesquisa propôs avaliar o perfil higiene bucal dos cuidadores dos alunos com necessidades especiais durante a 2^o e 3^o semana do mês de agosto de 2008, no âmbito da escola Eney Santana mantida pela Associação de Pais e Amigos dos excepcionais (APAE) em São Luís - MA, por meio de um questionário e avaliação clínica de higiene bucal, através do índice de higiene bucal simplificado (IHOS). Para análise dos dados foi utilizado o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para obtenção de médias e proporções. Observou-se que há uma prevalência entre os cuidadores, do gênero feminino, mães, entre os 31 e 40 anos com o ensino médio completo e renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos. Os mesmos não possuíam halitose, nem sangramento gengival, como também que já tinham recebido informações sobre como realizar a sua higiene bucal. Eles geralmente utilizavam apenas escova e creme dental, durante 1 a 3 minutos, 2 vezes ao dia; sua higiene bucal era muito deficiente. Conclui-se que o cuidador deve ser incluído no programa de atendimento ao paciente de necessidades especiais.

COMPARAÇÃO DAS CONDUTAS DE SAÚDE ENTRE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO LUIS

SILVA, Joice Penha*; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; PEREIRA, Eugênia Aires; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; CARVALHO, Laíse Neves; DIAS, Rosane da Silva

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: joicepenha2010@hotmail.com

O objetivo desse estudo foi comparar as condutas de saúde entre universitários de uma universidade privada de São Luís. As frequentes trocas de experiências realizadas ao longo da vida acadêmica podem se caracterizar como um agrupamento de ações que estimulam e apresentam ao jovem universitário possibilidades de obtenção de novos comportamentos, incluindo os comportamentos de risco. Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, realizado entre abril e agosto de 2013 na Universidade Ceuma. Foram incluídos no estudo, 354 discentes da área de saúde de ambos os sexos, regularmente matriculados em períodos com disciplinas teóricas. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento National College Health Risk Behavior Survey traduzido e validado para o Brasil. Na comparação das condutas de saúde entre os alunos dos diversos cursos, foi utilizado o teste Qui-Quadrado interpretado ao nível de significância estatística de $p \leq 0,05$. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA com parecer 372.391. Foi verificada diferença estatisticamente significativa entre os cursos com relação a prática de atividades físicas ($p < 0,01$), consumo de frutas ($p < 0,01$), consumo de hambúrguer ($p = 0,05$) e consumo de biscoitos ($p = 0,02$). O curso que menos pratica atividade física é o de enfermagem e com relação ao consumo de fruta, o que menos consome são farmácia e fisioterapia. Diante dos resultados apresentados, faz-se necessário estimular os universitários da área de saúde a adotarem práticas saudáveis, uma vez que eles se tornarão orientadores e conselheiros de pacientes nas estratégias de prevenção de doenças.

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS INICIANTES DO ESTÁGIO DE AUDIOLOGIA SOBRE BIOSSEGURANÇA

SILVA, Marla Valéria Soares da*; CASTRO, Samyra Araújo; CESAR, Karla Cristinni Quadros; SILVA, Raquel Fernandes da; CALDAS, Érica Alesandra Caldas

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

E-mail: marcocarneiro.adv@hotmail.com

A biossegurança é definida como um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos do meio ambiente para os profissionais e clientes. Verificar o grau de conhecimento de estudantes iniciando o estágio da graduação em Fonoaudiologia sobre biossegurança em Audiologia. Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva observacional quantitativa, através de um questionário respondido pelos alunos de graduação de Fonoaudiologia.

FATORES ASSOCIADOS A PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES COM RIZOGENESE INCOMPLETA: ANÁLISE RETROSPECTIVA

SILVA, Fabíola Ayane Costa*; FERREIRA, Meire Coelho; FERREIRA, Meire Coelho

Categoria: Graduação

Curso: odontologia

E-mail: fafa_ayane@hotmail.com

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de primeiros molares permanentes com rizogênese incompleta e fatores associados, em crianças entre 5 e 14 anos de idade, com base em arquivos de radiografias da Clínica de Odontopediatria da UNICEUMA. O estudo é transversal, do tipo retrospectivo. Foram utilizados 119 prontuários. Um total de 476 radiografias da região de primeiros molares permanentes foram avaliadas. Quatrocentos e setenta e três molares estavam presentes. A variável dependente foi rizogênese incompleta e as variáveis independentes foram gênero, idade, dente hígido, dente cariado sem envolvimento pulpar, dente cariado com envolvimento pulpar, dente restaurado, dente pulpotomizado e dente pulpectomizado. Foi realizada análise estatística descritiva e inferencial (teste c2), ao nível de significância de 5%. Dos 161 prontuários analisados, 42 (26,09%) foram excluídos (pacientes na dentição decídua) perfazendo, assim, um total de 119 avaliados (73,91%). Dois primeiros molares permanentes com rizogênese incompleta apresentaram envolvimento pulpar (1,6%). Dente hígido e cariado, e sem envolvimento pulpar, foram associados significativamente com rizogênese incompleta. Com base nos achados, é possível concluir que dentes imaturos podem ser comprometidos precocemente por lesões cáries, o que requer o cuidado do profissional e dos pais no sentido de prevenir o acometimento desses dentes pela doença cárie.

CUIDANDO DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA

SILVEIRA, Francisca Moraes da*; ALVES, Candida Helena Lopes; MELO, Marina Da Silva e; LIMA, Suely Costa; SERRA, Melina; OLIVEIRA, Crhisthianny Valente de

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

E-mail: francmor@globo.com

Trata-se de um Projeto de pesquisa que assiste cuidadores, em: atendimentos individuais, com avaliação cognitiva básica; treinamento em cuidadores de idosos com demência com orientação individual, de grupo e oficinas terapêuticas. O objetivo geral é identificar as necessidades dos cuidadores. Os específicos são: avaliar os procedimentos desenvolvidos pelo cuidador; buscar atividades voltadas para a inserção de serviços entre idosos e seus cuidadores, visando um atendimento integral que assista as partes em questão; conscientizar sobre as necessidades de auto-estimulação para atender a si e ao idoso na condição atual; possibilitar ao cuidador a capacidade para aceitar críticas, superar impasses e frustrações; verificar a real importância da inserção do psicólogo no contexto diário do trabalho do cuidado com os idosos acometidos de demência. Metodologia baseada no estudo exploratório-descritivo em encontros grupais com os cuidadores. Coleta de dados com questionários com temas de interesse e técnica de atendimento com idosos e aplicação da Escala de Hamilton, para avaliar o estresse. Análise dos dados é estatística descritiva, pela qual analisamos os resultados. Resultados: O projeto está em andamento, mas os resultados são surpreendentes. Os cuidadores já aprenderam a abordar situações conflitivas com maior maturidade, superando com maior segurança as críticas,

impasses e frustrações no decorrer de suas tarefas. O Projeto está em início de funcionalidade, mas é possível verificar a importância das intervenções psicológicas no trabalho com cuidadores de idosos, minimizando os possíveis entraves na eficácia do binômio cuidador e idoso.

CONTROLE DA ANSIEDADE POR MEIO DE FITOTERÁPICOS NA ODONTOLOGIA

SOUZA, Izabella*; ARAÚJO, Lucian; CAMPOS, Cinthia Gimenes; PEREIRA, Priscila Silva;
SOUZA, Carolina; MACIEL, Francisco; MACIEL, Andrezza

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

E-mail: lza_gimenes@hotmail.com

A fitoterapia vem ganhando espaço no campo odontológico, sendo cada vez mais utilizada para tratamentos de psicopatologias, a fim de ser uma alternativa a drogas como os benzodiazepínicos; pois os fitoterápicos apresentam melhor custo benefício e menos efeitos adversos a saúde dos pacientes quanto ao outro grupo. Devido a essa importância, o trabalho abordará os temas fitoterápicos que agem no sistema nervoso central auxiliando no combate da ansiedade de pacientes que sofrem de tal transtorno quando se deparam com procedimentos odontológicos. Partindo do pressuposto, que há uma positiva eficácia da fitoterapia no combate ao medo, a ansiedade e até mesmo a depressão, iremos expor em forma de banner, suas indicações, vantagens, desvantagens, posologia, as possíveis consequências e interações medicamentosas nas formas de plantas medicinais mais eficientes, como a Passiflora, Valleriana dentre outras. Pois estas serão nossas aliadas ao combate às consequências da ansiedade no tratamento odontológico que cercam os cirurgiões-dentistas nos consultórios, proporcionando um atendimento menos agitado e traumático para ambos.

A FLEXIBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A AUTONOMIA FUNCIONAL EM IDOSOS

SOUZA, Thaisa Nunes de*; HAIDAR, Adelizir Malheiros

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: thaisanunes17@hotmail.com

Verificar a relação entre flexibilidade e autonomia funcional em idosos. Trata-se de um estudo Analítico com delineamento transversal que foi realizado no Posto de Saúde - Paço do Lumiar, entre março e abril de 2014. Foi obtida uma amostra de conveniência com 30 idosos. Para coleta de dados, foi utilizado o protocolo do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a Maturidade – GD/LAM, o flexômetro (banco de Wells) e a ficha de avaliação inicial com as características sócio demográficas. Os dados foram digitados e analisados no SPSS 18.0. Na estatística descritiva, as variáveis quantitativas são apresentadas em mediana, mínimo e máximo, enquanto as variáveis qualitativas são descritas através de frequências absolutas e relativas. Na correlação entre autonomia funcional e flexibilidade, foi utilizada a correlação de Spearman, sendo considerado significativo $p < 0,05$. A amostra estudada obteve tais resultados relacionados às características sócio demográficas: sendo a maioria (60%) do gênero feminino; estado civil, 66,7% são casados; 33,33% tem 1º grau completo. No último ano apenas 17% refere ter sofrido queda; Quanto à autonomia funcional 33,3% foi fraco e a flexibilidade 33,3% foi excelente. Na análise da relação entre flexibilidade e autonomia funcional, a correlação foi de 0,16 ($p = 0,39$). Dessa forma, verifica-se que não existe relação entre o grau de flexibilidade e a autonomia funcional de idosos. Não houve relação entre a flexibilidade e autonomia funcional entre os idosos. A falta de significância estatística pode estar relacionada a variabilidade do grupo de não praticantes de atividade física.

CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE EGRESSOS

E FORMANDOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICUMAL - MA

SOUZA, Ingrid Mendonça*; MARINHO, Sílvia Carvalho Marinho; MOTA, Jessayne Larissa Mulat;
RABELO, Hérica Polyana Silva Martins; TEIXEIRA, Joelma Ximenes Prado Teixeira; ROCHA, Marina Souza

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: ingrid.mend.di@gmail.com

Conhecer o nível de compreensão e de interesse que os alunos têm sobre as informações nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos é uma análise sobre a qualidade da alimentação e saúde desses indivíduos. O estudo objetivou

comparar o nível de conhecimento sobre informação nutricional entre alunos do 1º e 8º períodos do curso de Nutrição de uma Universidade particular em São Luís -MA. Trata-se de um estudo descritivo realizado em 2014, foram entrevistados 57 alunos. Os dados foram obtidos através de um questionário semiestruturado, composto por catorze perguntas fechadas. A maioria dos entrevistados foram mulheres. Os alunos reconheciam a relevância da informação nutricional veiculada pela rotulagem dos alimentos. Porém apenas 46,5% dos alunos do 1º período dizem conhecer o suficiente para entender os rótulos, no 8º período este percentual foi de 93%. Questionados sobre a compreensão dos rótulos, mais de 90% dos alunos do 1º período afirmaram compreender apenas parcialmente, já a maioria do 8º período (57,2%) relatou compreender tudo sobre o tema. O aspecto que mais dificulta esta compreensão segundo os alunos do 1º período é a utilização de linguagem técnica/abreviatura/siglas, enquanto que alunos do 8º período (71,4%) são o tamanho das letras nos rótulos. Portanto houve diferença no nível de conhecimento entre as turmas. Alunos do 1º período apresentaram déficit de compreensão das informações nutricionais. Já os alunos do 8º período afirmaram ter domínio do tema

PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA

SOUSA, Francisco Ferreira Júnior*; CARVALHO, Laise Neves; DUARTE, Jornande da Silva; LIMA, Marcus Vinícius; MADEIRA, Hellyne Gisele.

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: ffsousajunior_@hotmail.com

Este estudo objetivou descrever o perfil clínico de pacientes oncológicos atendidos em um Hospital Estadual de referência. Foi realizado um estudo observacional, descritivo transversal. Sendo que a amostra foi composta por 1396 pacientes oncológicos que foram atendidos entre 2010 e 2011, onde 733 pacientes eram homens e 663 mulheres que estiveram no registro do hospital, a maioria dos indivíduos estão na faixa etária de 65 a 79 anos, sem critérios de exclusão. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário de confecção própria no Sistema de Registro Hospitalar de Câncer. A análise dos dados foi feita através do programa Microsoft Excel 2007®, utilizando a estatística descritiva. Os dados obtidos mostraram que a prevalência de câncer no hospital pesquisado é maior no gênero masculino com 53% e o gênero feminino com 47%, sendo os cânceres de próstata e mama os mais frequentes, com relação ao estadiamento clínico do câncer, os mais frequentes foram estágio IV 309 (22,13%), estágio II 211 (15,11%), estágio III 175 (12,53%). Esses dados possibilitam concluir que o câncer de próstata, mama e colo de útero são os mais encontrados e o perfil de atendimento do hospital pode ter influenciado na maior prevalência de câncer no gênero masculino.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UTILIZAÇÃO DA ASG 7 ESCALAS

SOUSA, Jaicara Melo De Araújo*; BACELAR, Jerciane Dos Santos Costa; DA SILVA, Rayara Cristinna Viana; MACHADO, Kelyne Kelem Costa; MESQUITA, Patricia De Souza; ROCHA, Marina Souza; HORTEGAL, Elane Viana

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

E-mail: jaicaramelo@hotmail.com

A DRC é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais com impacto no estado nutricional dos pacientes. A avaliação nutricional subjetiva é um método capaz de avaliar o estado nutricional e considera não apenas alterações da composição corporal, mas também alterações funcionais dos pacientes. A avaliação subjetiva global (ASG) 7 escalas é um método adaptado aos pacientes renais crônicos, capaz de detectar um maior número de pacientes com desnutrição, podendo ser utilizada para intervenção precoce. Avaliar de forma correta o estado nutricional destes é de fundamental importância, pois a desnutrição energética-proteica (DEP) na hemodiálise é um fator de risco para mortalidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional utilizando a ASG 7 escalas em pacientes em tratamento hemodialítico de uma clínica particular de São Luís, Maranhão. Foram entrevistados 27 pacientes com idade de 26 a 92 anos. Além da ASG 7 escalas, foi realizada avaliação antropométrica após a sessão de diálise onde incluía o peso seco em quilogramas e a altura em centímetros para calcular o índice de massa corporal (IMC), classificado de acordo com o preconizado pela OMS. Observou-se que 59,2% apresentaram eutrofia, 33,33% sobrepeso e apenas 7,4% desnutrição pelo IMC. Quando o estado nutricional foi avaliado pela ASG 7 escalas, constatou-se que mais 60% dos indivíduos apresentou algum grau de desnutrição. Desta forma, a ASG parece ser um método que detecta melhor a desnutrição nestes pacientes.

INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO FÍSICO E COGNITIVO NO MEDO DE QUEDAS EM IDOSOS

VIANA, Alef Salgado*; LIMA, Alysson Kenedy Sales; LIMA, Antônio Almir Junior; SAUAIA, Bismarck Ascar; DO NASCIMENTO, Eline Lima; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro

Curso: Fisioterapia

Categoria: Graduação

E-mail: allef_nunes@hotmail.com

Além dos problemas físicos, o medo de cair é um fator limitante e depressor da qualidade de vida de idosos. Estudos defendem a prática de atividade física como ferramenta na manutenção da saúde funcional de idosos, melhora do equilíbrio postural e a diminuição do medo de cair. Este estudo objetivou avaliar o efeito de um protocolo de dupla tarefa no medo de cair em idosos. Tratou-se de um ensaio clínico randomizado realizado em São Luís - MA em 2014, 40 idosos (70-75 anos). Na coleta de dados, utilizou-se o questionário FES-Brasil que avalia o medo de cair em idosos através de 16 perguntas relacionadas a atividades diárias. Aplicou-se o teste antes e depois da intervenção do protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa durante três meses, duas vezes por semana (50 minutos/dia). No tratamento estatístico, utilizou-se o SPSS 20.0. Para análise descritiva do risco de quedas, empregou-se média e desvio padrão e o teste de contingência sendo considerado significativo $p < 0,05$. Os resultados demonstraram maiores frequências, considerando-se o medo de cair em idosos, para Antes e Depois da intervenção, com um medo leve, respectivamente ($n=22$; 55%); ($n=27$; 67,5%). Em análise quantitativa, utilizando-se a estatística descritiva, observou-se pequena variação do desvio padrão entre os momentos da pesquisa (AAP=10,26) e (DAP=12,34), o que indica maior dispersão de valores depois da aplicação do protocolo; com a utilização do teste de contingência para variáveis independentes verificou-se $p=0,0006$. Os resultados obtidos permitem afirmar que existe uma relação significativa entre a aplicação do protocolo e a redução do medo de cair.

ANAIS DO II CONGRESSO
DE SAÚDE E BEM ESTAR

PÓS-GRADUAÇÃO

MESA CLÍNICA

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA ODONTOLOGIA: UTILIZAÇÃO DE PONTAS ULTRA-SÔNICAS CVD

CAMPOS, Iara*; PEREIRA, Anna Claudia Dias; PASCHOAL, Marco Aurelio Benini

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: iarareginascf@hotmail.com

A tecnologia de pontas ultra-sônicas CVD é originária da deposição de uma camada única de diamante sintético sobre uma haste de molibdênio, conferindo alta resistência ao desgaste a essas brocas. Tais pontas são ligadas ao ultrassom o que confere como vantagem, durante preparos cavitários, a baixa emissão de ruído, o aquecimento da estrutura dentária e a sensibilidade dolorosa ao paciente, além de uma melhor visibilidade da área de trabalho. Após treinamento adequado, é um procedimento mais rápido o que diminui o tempo operatório e na maioria das vezes, dispensa o uso de anestesia. Seu uso pode ser limitado pelo risco de remanescente de tecido cariado, necessidade de instrumentação manual e treinamento prévio do profissional. Sua principal qualidade reside em poder beneficiar o paciente, ansioso, traumatizado e/ou pediátrico devido a suas características de proporcionar um desgaste conservador dos dentes, o gotejamento da água em temperatura próxima a temperatura corporal o que evita o choque térmico e a sensibilidade durante o procedimento, além da ausência do ruído e vibração comumente encontrado na alta rotação. Sendo assim, o presente trabalho visa a uma demonstração da utilização dessa tecnologia ressaltando suas vantagens no ambiente clínico.

CAUSAS BUCAIS DA HALITOSE

DIAS, Ana Paula*; FILHO, João Batista Medeiros; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: ortoanapaula@gmail.com

A Halitose, também conhecida como mau hálito, é um termo utilizado para definir o odor desagradável e fétido que emana da boca, podendo apresentar origem local ou sistêmica. É considerado um problema comum que afeta grande parte da população mundial. Calcula-se que aproximadamente 40% da população sofre ou sofrerá de halitose crônica em alguma época de sua vida e cerca de 75% dos casos têm sua origem em um problema bucal. Uma abordagem sobre a importância do tema, principais etiologias bucais e distintas condutas podem ser valiosas no dia-a-dia do clínico. Iremos demonstrar a utilização de protocolos destinados ao tratamento da halitose e suas indicações profissionais.

O USO DE PRÓTESES BUCO-MAXILO-FACIAIS EM PACIENTES COM DEFORMIDADES – ARTE ALIADA À PRÁTICA REABILITADORA

FILHO, João Batista Medeiros*; BARROS, Petrus Levi; FERREIRA, Meire Coelho; GONÇALVES, Letícia Machado; MACIEL, Andrezza Bastos; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: joao_jmkl@hotmail.com

A prótese buco-maxilo-facial é uma especialidade odontológica que tem como objetivos restaurar a estética, bem como restabelecer funcionalmente a fala, mastigação e deglutição de pacientes com deformidades nesta região. Estas deformidades podem ser causadas por malformações e mutilações variadas, desde neoplasias a traumatismos. Como em muitos destes pacientes torna-se contraindicada a reconstrução por cirurgia plástica, especialmente em pacientes que sofreram radio e/ou quimioterapia, as próteses buco-maxilo-faciais apresentam-se como um recurso valioso e financeiramente acessível. O sucesso para este tipo de reabilitação alia a técnica, arte e ciência, que faz da odontologia algo que transcende a estética e a funcionalidade por seu valor social e humanitário. O objetivo desta exposição é mostrar os materiais utilizados para confecção, além dos métodos de fabricação desta modalidade de prótese. O processo de confecção será abordado de acordo com as etapas de moldagem, fabricação de modelo em gesso, caracterização estética, acabamento e polimento, e testes clínicos. A complexidade destas próteses e a escassez de materiais específicos no mercado nacional afastam os cirurgiões-dentistas desta especialidade. A falta de centros especializados para tratamen-

to destas mutilações também prorroga a reparação protética e dificulta o convívio social e familiar dos pacientes com deformidades faciais. É evidente a necessidade de centros de reabilitação com equipes multidisciplinares nas políticas públicas de saúde no Brasil.

MOVIMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS COM MINI-IMPLANTES

FREITAS, Grace Castelo Branco*; MADA, Edson Yoshihiro; PREVIDENTE, Luis Henrique; PINZAN, Célia; BREMANTE, Fausto; GURGEL, Júlio

Curso: Odontologia

Categoria: Pós Graduação / Profissional

E-mail: gracecastelobranco@gmail.com

Na Ortodontia, a ancoragem ortodôntica sempre foi um desafio para o ortodontista. No entanto, nos dias de hoje, a referida especialidade pode contar os mini-implantes, que sem dúvidas se tornou uma alternativa ímpar no tratamento de pacientes adultos com más posições dentárias, bem como os casos em que a ancoragem convencional é limitada. Nesse trabalho, mesa demonstrativa, será demonstrado o processo de ancoragem absoluta com mini-implantes, além dos movimentos ortodônticos de intrusão, mesialização, distalização, retração, disjunção que são realizados com o emprego dos referidos mini-implantes. Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de mostrar a importância da associação e planejamento dos mini-implantes como coadjuvantes nos tratamentos ortodônticos atuais.

INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA

PEREIRA, Anna Claudia Dias*; CAMPOS, Iara; ROCHA, Adrícylla Teixeira; FERREIRA, Meire Coelho; CARVALHO, Ceci

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: annaclaudiadpereira@hotmail.com

O tratamento endodôntico é conduzido por princípios básicos, onde todas as fases deste tratamento são igualmente importantes. Atualmente, existem diversos sistemas rotatórios de limas endodônticas, onde são representados em sua maioria por um conjunto de limas de níquel titânio, mecanicamente acionadas a motor elétrico. Dentre estes atuais sistemas rotatórios, destacamos o Protaper Universal® que apresenta em uma pequena seqüência, limas com índices de conicidades variadas num mesmo instrumento, esperando-se abranger maior número de variações anatômicas radiculares possíveis numa pequena sequência. O objetivo do presente trabalho é demonstrar conhecimentos básicos sobre o sistema Protaper Universal®, como é realizada a instrumentação e os benefícios da instrumentação mecanizada no tratamento endodôntico.

ASPECTOS LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES.

REIS, Washington*; FERREIRA, Meire Coelho; GONÇALVES, Letícia Machado; ROCHA, Adrycila Teixeira; BANDECA, Matheus Coelho; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

Email: washington.reis@ceuma.br

A prótese total sobre implantes representa um grande avanço da odontologia na reabilitação de pacientes desdentados totais. Este tipo de prótese permite ao cirurgião dentista reabilitar o paciente através de próteses fixadas aos implantes utilizam de parafusos protéticos ou mesmo utilizando próteses removíveis com encaixes sobre os implantes, permitindo retenção e estabilidade. As próteses totais que utilizam como suportes implantes osseointegrados aumentam a qualidade de vida e o grau de satisfação dos pacientes, já que aumentam a performance mastigatória. A confecção deste tipo de prótese exige do protesista e do cirurgião conhecimentos protéticos – cirúrgicos para sua execução. Assim a instalação dos implantes deve ser realizada dentro do conceito do planejamento reverso, onde inicialmente são realizadas moldagens e obtenção de modelos, montagem em articulador e encerramento diagnóstico, para a partir disto, obter um guia cirúrgico que oriente a instalação dos implantes. As fases pré-cirúrgicas e de construção das próteses necessitam que o profissional tenha conhecimentos sobre os diferentes componentes protéticos e que o técnico em prótese dentária domine os princípios de confecção das mesmas. Assim este trabalho tem por objetivo apresentar os componentes protéticos utilizados na confecção das próteses sobre implantes e as diferentes fases de confecção das mesmas.

A UTILIZAÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) NA ODONTOLOGIA

ROCHA, Adrícylla Teixeira*; BANDECA, Matheus Coelho; BARRETO, Samuel Benson Lima; LAMHA, Ana Paula Soares Fernandes; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza Bastos

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

Email: adricyla.tr@outlook.com

A Desfibrilação é um procedimento usado para tratar as circunstâncias risco de vida que afetam o ritmo do coração tal como a arritmia cardíaca, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. O procedimento envolve a entrega de um choque elétrico ao coração que causa a despolarização dos músculos de coração e restabelece a condução normal do impulso elétrico do coração. A máquina usada para entregar este choque terapêutico ao coração é chamada um desfibrilador (DEA). Os tipos diferentes de desfibriladores usados incluem desfibriladores externos, desfibriladores transvenosos e desfibriladores implantados. A Desfibrilação foi apresentada primeiramente por Prevost e por Batelli, dois fisiologistas da Universidade de Genebra, Suíça em 1899. Nos estudos animais, observaram que os choques elétricos pequenos que chegavam ao coração poderiam provocar a fibrilação ventricular, e as grandes cargas elétricas poderia inverter a fibrilação. No ambiente odontológico de consultório não é muito comum a sua utilização, porém existem normativas que afirmam a sua importância em qualquer ambiente onde tenha atendimento, pois fatores como ansiedade, anestésicos, nervosismo podem alterar o funcionamento do órgão vital para o ser humano: o coração. A discussão sobre sua implantação ainda é muito omitida por diversos órgãos públicos e privados extra-hospitalar. Visando a sua importância não só no atendimento médico e odontológico, mas no cotidiano, tem-se a proposta da sua utilização, pois todo profissional Cirurgião-dentista deve estar apto para fazer esse atendimento em qualquer ambiente, seja no consultório, no ambiente hospitalar ou em qualquer atendimento de urgência.

DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPAROS PARA FACETAS DENTAIS

SANTOS, Reidson Stanley Soares dos*; TAVAREZ, Rudys de Jesus; BANDÉCA, Matheus Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: reidsonstanley@hotmail.com

Existem várias técnicas para confecção de preparos em dentes que irão receber restaurações em facetas diretas ou indiretas, tais técnicas tem a mesma finalidade, porém se diferenciam na forma como são confeccionadas. Este trabalho visa demonstrar as principais formas de tais preparos e sua indicação para cada caso, bem como suas abordagens e diferenças básicas, afim de que o profissional decida a melhor técnica para ser utilizada no seu dia-a-dia.

AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL E USO COMO MATERIAL RETROBTURADOR EM CIRURGIA PARAENDODÔNTICA

NUNES, Marjorie Adriane da Costa*; SOUSA, Nielsen Barros; VELOSO, Kátia Maria Martins; PRADO, Isabelle Aguiar; PEREIRA, Adriana de Fátima Vasconcelos.

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

marjorieacn@hotmail.com

O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) foi desenvolvido com a finalidade de selar perfurações dentárias que ocorrem acidentalmente. A obturação retrógrada, uma das modalidades da cirurgia paraendodôntica, consiste no tratamento de lesões perirradiculares que visa solucionar complicações decorrentes do tratamento endodôntico mal sucedido. Materiais como o MTA têm sido propostos com o objetivo de promover o selamento do canal radicular por via retrógrada. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre o uso de MTA na Endodontia, abordando aspectos de sua apresentação, composição, propriedades físicas, químicas e biológicas, aplicações clínicas, enfatizando sua utilização na prática cirúrgica-periapical. Concluiu-se que o MTA pode ser empregado no retratamento endodôntico cirúrgico, apresentando-se como material promissor.

O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR SOCORRISTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

SILVA, CAMILA MARIA PINHEIRO DE MELLO*; SOUSA, ROSANA FARIAS; JUNIOR, JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA

Orientador: SOUSA, Santana de Maria Alves

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Enfermagem

E-mail: florenevale@bol.com.br

Os socorristas encontram-se expostos a mais de 60 patógenos¹, assim, objetivou-se compreender o uso dos equipamentos de proteção individual pelos socorristas a luz da literatura já publicada, dessa forma, utilizou-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual, foram analisados 13 artigos. Assim sendo, alguns dos motivos encontrados para que os socorristas não façam uso dos Equipamentos de Proteção Individual foram não ter conhecimentos a cerca da importância, não saberem como se dá a proteção e não terem disponíveis no ambiente de trabalho. Concluímos sugerindo que medidas educativas seja! m empregadas de forma constante incentivando a prevenção por meio da utilização correta dos equipamentos de proteção individual, além de alertar as unidades de saúde sobre obrigatoriedade desses equipamentos para proteção desses profissionais, os quais tem a função de salvar vidas.

Palavras-chave: Exposição a Agentes biológicos, equipamentos de proteção e riscos ocupacionais.

POLITICAS PÚBLICAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PRAZERES, Jozimar*; REIS, Vitoe Henrique Martins; SANTOS, Laura Quintanilha Mourão ; GUIMARÃES, Vanessa Silva

Orientador: PRAZERES, Josimar

Categoria: Pós-Graduação/Profissional

Curso: Educação Física

E-mail: jozimarprazeres@hotmail.com

Estudo visou indicar elementos do conceito de políticas públicas, sua modalidades, sua origem como área de conhecimento, associando-as ao estágio, considerando a importância do professor como papel fundamental dentro desse contexto. A pesquisa foi de característica bibliográfica explicativa, foi utilizada uma revisão de literatura, realizada nos meses de julho e agosto de 2014, nas bases de dados eletrônica do Scielo, LILACS, Google acadêmico, bem como utilização de teses e dissertações de bancos de dados de universidades brasileiras. Destacando ainda a relação das políticas públicas e sociedade sua implantação na educação e educação física com as ações e intervenções, programas de educação, suas diferentes dimensões, promoção da unidade teoria e prática, vínculo entre o saber e o fazer e vários aspectos que envolvem o estágio. Conclui-se que, o professor é de suma importância na área do estágio supervisionado, sendo necessário saber desenvolver habilidades que condizem com a prática, ter conhecimento científico, prático e técnico, pois introduz o futuro profissional de educação física no âmbito escolar, com intuito de integra-lo na práxis pedagógica favorecendo seu desenvolvimento profissional.

TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA REVISÃO CRÍTICA

CAVALCANTE, Salma Ivanna Araújo*; GONÇALVES, Letícia Machado; CARVALHO, Ceci; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: salmaaraujo12@hotmail.com

A partir da necessidade de novas alternativas para o controle da população de microrganismos cariogênicos e ao seu aumento de resistência, a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDA) ganha grande destaque. O objetivo deste trabalho foi fornecer uma revisão crítica relacionada a este método coadjuvante na prevenção e tratamento da cárie dentária. Uma pesquisa do banco de dados foi feita através da Medline/PubMed, utilizando as palavras-chave: terapia fotodinâmica e cárie dentária. Foram encontrados 33 artigos, em que apenas 12 artigos foram incluídos após a utilização da ferramenta de filtro, sendo excluídos comentários e manuscritos não relacionados com a área de estudo. Esta avaliação crítica mostrou resultados promissores para o uso da TFDA como tratamento coadjuvante contra bactérias envolvidas no processo de etiologia e desenvolvimento da cárie dentária. Porém, mais estudos sobre a toxicidade e estudos in situ e in vivo devem ser realizados para o melhor entendimento desta prática e seus componentes, antes que seja estabelecido como uma opção antimicrobiana para a rotina odontológica preventiva e curativa.

EFEITO DA IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL ULTRASSÔNICA PASSIVA NO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS

FREITAS, Cláudio Vanucci Silva*; PROENÇA, Mariana Almeida Mello¹; CIRELLI, Joni Augusto²

*^{1,2} Universidade CEUMA

Categoria: Pós-graduação / Profissional;

Curso: Odontologia

E-mail: claudiovanucci@hotmail.com

O uso de antissépticos para irrigação subgengival tem sido proposto como coadjuvante à terapia básica no tratamento da doença periodontal (DP). Contudo, não há evidências suficientes para indicar seu uso de forma rotineira. A irrigação ultrassônica passiva vem sendo utilizada na Endodontia com resultados melhores na remoção de detritos e bactérias dos canais radiculares que a irrigação convencional com seringa. No entanto, não há relatos do seu uso na Periodontia. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da irrigação subgengival ultrassônica passiva (ISUP) no tratamento da DP como coadjuvante à terapia mecânica, comparando diferentes soluções irrigantes. DP foi induzida por ligadura em 91 ratos Wistar, por 28 dias. Após a remoção das ligaduras, os animais foram submetidos à raspagem e alisamento radicular, seguida de irrigação subgengival convencional com seringa na hemi-mandíbula esquerda; e ISUP na hemi-mandíbula direita, com diferentes soluções (solução salina 0,9%, clorexidina 0,2%, hipoclorito de sódio 0,1 e 0,5%, extrato de própolis 11%). Os animais foram sacrificados aos 7 e 14 dias após o tratamento e submetidos a análise histométrica para avaliação de suporte ósseo e migração epitelial. Os grupos tratados com ISUP apresentaram média de suporte ósseo (24,13% ± 2,83%) significativamente maior e média de migração epitelial significativamente menor (23,36% ± 4,36%) que os grupos tratados com irrigação subgengival com seringa (16,36% ± 2,21% e 36,53% ± 4,48%, respectivamente). Não houve diferença significativa entre as médias das diferentes soluções irrigantes. A ISUP mostrou-se um importante coadjuvante no tratamento da doença periodontal induzida por ligadura em ratos.

O PERFIL DO TRAUMATISMO BUCO-MAXILO-FACIAL NO TRÂNSITO

CORINGA, Ricardo de Sousa*; ARAÚJO, Juliana Fernanda Soares de;

MADEIRA, PetrusLevid Barros; CORREA, Silvan; GONSALVES, Leticia Machado

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

Email: ricardocoringa@hotmail.com

O trauma por acidente de trânsito é responsável por um grande número de vítimas acidentadas, os quais geram altos dados estatísticos junto aos órgãos governamentais, e levam a incapacidade temporária ou permanente dos acidentados. O traumatismo à região facial frequentemente resulta em lesões do tecido mole, dos dentes e das principais estruturas anatômicas do esqueleto maxilofacial. As fraturas faciais causadas por acidentes de trânsito incidem mais em vítimas jovens (15 a 40 anos) e do sexo masculino. As injúrias estão presentes em uma porção substancial dos casos de trauma sendo o complexo zigomático maxilar a segunda área da face mais atingida por traumatismos, superada apenas pelos ossos nasais, os quais são essenciais na configuração da face. As vítimas de acidente apresentaram mais lesões associadas, pois a energia liberada pelo impacto é muito maior nestes tipos de acidentes resultando em múltiplas fraturas do complexo maxilofacial. Isso pode ser atribuído a condução dos meios de transportes em alta velocidade, a não atenção ao uso do cinto de segurança associado ao Airbag, do capacete e da desobediência das leis e regulamentações de trânsito. Estudar as características da população vítima de traumatismo facial através das variáveis de gênero, idade, tipo de fratura e suas causas é de suma importância para realização de medidas preventivas que propiciem a diminuição desta ocorrência, seja por medidas sócio-educativas no trânsito, nas escolas e do maior vigor na fiscalização do cumprimento das leis, como também na penalização rigorosa aos infratores e maior atenção aos adultos jovens citados na literatura.

OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL ATRAVÉS DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA

CORINGA, Ricardo de Sousa*; DE ARAÚJO, Juliana Fernanda Soares;

MADEIRA, Petrus Levid Barros; CORREA, Silvan; GONÇALVES, Leticia Machado

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: ricardocoringa@hotmail.com

As deformidades dento-faciais são responsáveis por problemas no sistema estomatognático, tais como disfunção temporomandibular, dor orofacial, má-oclusão dentária, dores musculares, cefaléia, síndrome da apnéia noturna e insatisfação da estética por parte do paciente. O objetivo deste trabalho será abordar a cirurgia ortognática como uma alternativa para a correção destas irregularidades, em especial, o apelo pela estética. A cirurgia ortognática visa a melhoria na função mastigatória, fala e respiração, bem como da estética através da harmonia entre os terços faciais. Esta modalidade de tratamento permite o equilíbrio ósseo e dentário do complexo facial, e dos tecidos moles envolvidos, o que exige do profissional conhecer a resposta dos tecidos subjacentes ao movimento ósseo. A correta análise facial em conjunto com os dados cefalométricos e os da oclusão, irão determinar um procedimento cirúrgico isolado ou combinado para a correção da deformidade, ao mesmo tempo em que traz máximo ganho estético ao paciente. As deformidades dento-faciais mais comumente corrigidas por cirurgia ortognática são: retrognatismo, prognatismo, excesso vertical de maxila e assimetria facial. Nestas deformidades, o reposicionamento dos ossos maxilares é um dos fatores responsáveis pelo “padrão facial”, podendo restabelecer a harmonia em consequência da modificação que estas estruturas sofrem após o processo de osteotomia. A cirurgia, enquanto tratamento de deformidades dento-faciais, pode trazer melhorias estéticas à aqueles que a procuram. Estas melhorias têm grande importância na vida pessoal e profissional de quem sofre com deformidades, e isto deve ser um dos pontos cruciais a considerar no momento do diagnóstico e planejamento cirúrgico.

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL

MARIZ, Débora Castelo Branco Rios*; BARROS, Mônica; CALIXTO, Amanda; MOUCHEREK, Adriana ; MARIZ ; Odilon Antônio; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-Graduação/Profissional

Email:arobedmariz@hotmail.com

Objetivo. Relacionar o periapical índice (PAI), obtidos por meio de radiografias periapicais, com o volume de lesão de periodontite apical crônica em dentes permanentes, obtidos pelo meio de Tomografia Computadorizada Feixe Cônico (TCFC). **Material e método.** Foram selecionadas radiografias e TCFC de 35 dentes permanentes unirradulares, com ápice totalmente formado, com diagnóstico de necrose pulpar e portadores de periodontite apical crônica visível radiograficamente. Dois avaliadores independentes avaliaram as radiografias em duas ocasiões e classificaram as lesões periapicais de acordo com o PAI proposto por Ostavik et al. (1986). As imagens de TCFC foram exportadas no formato dicom para o software Amira e o volume de cada lesão foi calculado. Foi verificado se os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores não apresentavam diferenças estatisticamente significantes (teste Kruskal-wallis) e se havia correlação entre PAI e o volume das lesões (Correlação de Spearman). **Resultados.** Os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores apresentaram diferenças estatisticamente significantes ($p < 0,001$). Houve correlação entre PAI e o volume das lesões ($r_s = 0,596$; $p < 0,001$) com o valor de r^2 igual 0,355 mostrando que 35% da variação do PAI dependeram da variação do volume das lesões periapicais. **Conclusão.** O Volume da lesão nos dentes com periodontite apical teve um efeito moderado sobre a escolha do escore do PAI. O resultado da avaliação de periodontite apical através do Periapical Índice pode não refletir as características volumétrica da lesão.

MOVIMENTOS ORTODÔNTICOS COM MINI-IMPLANTES

FREITAS, Grace Castelo Branco*; MADA, Edson; PREVIDENTE, Luiz Henrique

Orientador: GURGUEL, Júlio

Co-Orientador: PINZAN, Célia

Categoria: Pós-Graduação/ Profissional

Curso: Odontologia

E-mail: gracecastelobranco@gmail.com

Na Ortodontia a ancoragem ortodôntica sempre foi um desafio para o ortodontista. No entanto, nos dias de hoje a referida especialidade pode contar os mini-implantes, que sem dúvidas se tornou uma alternativa ímpar no tratamento de pacientes adultos com más posições dentárias, bem como os casos em que a ancoragem convencional é limitada. Nesse trabalho, mesa clínica, será demonstrado o processo de ancoragem absoluta com mini-implantes, além os movimentos ortodônticos de intrusão, mesialização, distalização retração, disjunção que são realizados com o emprego dos referidos mini-implantes.

Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de mostrar a importância da associação e planejamento dos mini-implantes como coadjuvantes para no tratamento ortodôntico atuais.

ENFRENTANDO O CÂNCER EM FAMÍLIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

BRANDÃO, Patrícia Danielly de Aguiar*; NEDER, Mathilde

Curso: Psicologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: patriciaaguiarbrandao@gmail.com

Resumo: O câncer é considerado uma doença crônica. O surgimento de doença em um membro da família acarreta em inúmeras alterações na estrutura familiar, em virtude do sofrimento que causa a pessoa doente e à família. A literatura aponta o câncer como uma doença não só do paciente, mas da família com potencial para causar grande impacto em todos os familiares em todos os estágios de sua trajetória. **OBJETIVO:** investigar a vivência da família de adultos com câncer. **MÉTODO:** realizou-se revisão integrativa da literatura, o levantamento bibliográfico foi feito nas bases de dados Lilacs, Medline e Scielo, compreendendo publicações de 1994 a 2013, a partir das palavras-chaves “câncer”, “família” e “enfrentamento”, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos artigos sem resumo. **RESULTADOS:** foram selecionados 63 artigos que abordavam a temática do estudo para análise. As publicações versam sobre momentos diversos da trajetória da doença. Os resultados mostram os fatores que levam o familiar a se tornar cuidador, os sentimentos e vivências, e mecanismos de enfrentamento desenvolvidos pelos familiares. A maioria dos artigos analisados tomam apenas um familiar como sujeito do estudo e em muitas publicações o termo “família” era considerado sinônimo de “cuidador”. **CONCLUSÃO:** observou-se que a literatura é ampla sobre a experiência do cuidador familiar, mas não sobre a família. Conclui-se, assim, que há a necessidade de desenvolver estudos que distinguem o conceito de família do de cuidadores familiares, abordando a família como um! todo, e que busquem propor a família como uma unidade de cuidado, como parte do plano terapêutico.

CAMINHOS DO CUIDADO: POSSIBILIDADES EM SAÚDE POR MEIO DA APROXIMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE MENTAL.

LIMA, Sara Fiterman*; PASKLAN, ANP; TAVARES, LKCC; COSTA, DDO

Curso: Enfermagem

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: s.fiterman@hotmail.com

A redução de danos e a prevenção do uso de drogas nos últimos anos tem sido um grande desafio e tem tido provocado um alerta em todas as instâncias políticas, incluindo órgãos federais, estaduais e municipais. Cientes de que a erradicação das drogas é uma alternativa surreal, as esferas governamentais investem em políticas de redução de danos com a ênfase no autocuidado como forma de enfrentamento da problemática. Nessa perspectiva, surgiu o projeto caminhos do cuidado. Articulado pela Casa Civil, sob responsabilidades do Ministério da Justiça e da Saúde, pretende oferecer formação em saúde mental (crack, álcool e outras drogas) para todos os agentes comunitários de saúde (ACS) do Brasil e um auxiliar ou técnico de enfermagem (ATENf) por equipe de saúde da família. No Maranhão o projeto está sendo executado pela Escola Técnica do SUS e tem um grande desafio, pois possui 217 municípios a serem contemplados pela formação. Nesse contexto, o objetivo desse estudo é apresentar as possibilidades relacionadas a formação no estado do Maranhão. Trata-se de um relato de experiência com base nas metas e perspectivas referentes ao resultado da formação. Na verdade, ao longo de oito meses de trabalho, o projeto já contabiliza dados relevantes em diversos contextos, para superação de dificuldades associadas a saúde de nosso estado pois, conseguimos formar 07 orientadores, já passaram pelas oficinas de formação de tutores, 156 profissionais de saúde, totalizando 163 profissionais de nível superior. Dos tutores, foram aprovados e contratados para o projeto 120 profissionais. Já temos turmas lançadas em 46 municípios, onde em 30 destes já iniciaram as aulas, para 2345 alunos. No total já matriculamos 4242 alunos. A formação pretende em nosso Estado, capacitar 15.927 ACS e 1.732 ATENf, totalizando 17.659 alunos a serem distribuídos em 459 turmas. Para apoiar a execução desse desafio, contamos ainda com 01 Coordenador Estadual e, 16 apoiadores, entre profissionais da EtSUS e do projeto. Dessa forma, concluímos que Ao promover a aproximação entre as ações de saúde mental com as práticas e o cotidiano da atenção básica, por meio da sensibilização de seus atores e, da reflexão sobre as possibilidades de acolhimento no território, esta formação produz novas possibilidades em nosso estado, tanto numa perspectiva de produção em saúde, quanto numa perspectiva de transformaçãosocial.

A SEGURANÇA DO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL NA PREVENÇÃO DE QUEDAS: AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

SANTOS, Nailde Melo*; SANTOS, José Nazareth Barbosa Filho; ALMEIDA, Tatiana; ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira.

Curso: Enfermagem

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: naidems@terra.com.br

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, com o objetivo de relatar a experiência prática da equipe de enfermagem do setor de Transplante Renal do Hospital Universitário da UFMA e avaliação na prevenção de quedas do paciente transplantado durante o período de internação. Utilizou-se como metodologia a estruturado na vivência da equipe de enfermagem utilizando parâmetros do protocolo do Ministério da Saúde na Prevenção de Quedas. A utilização da avaliação de risco surgiu da necessidade que a equipe detectou ao avaliar a quantidade e variedade das medicações usadas pelo paciente após o transplante. Nos resultados obtidos, foram discutidos os principais fatores ambientais e organizacionais de riscos de queda. Concluiu-se que a equipe encontra-se capacitada e apresenta conhecimento e disponibilidade para a utilização da avaliação e identificação dos riscos de queda, identificação do paciente de risco, tipo de calçado utilizado pelo paciente, capacidade de locomoção e educação da equipe e dos pacientes, proporcionando a preservação da saúde, além de vasta contribuição na redução de acidentes e quedas do paciente transplantado renal.

TEMA LIVRE DE PESQUISA

AVALIAÇÃO DAS BOAS PRATICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro*; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino, VASCONCELOS, Adriana Araújo; SANTOS, Natálio Lima; MAGALHÃES, Bruna Cruz; LOURENÇO, Kátia Danielle Araujo

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: celeniaaguiar@hotmail.com

Resumo: As padarias ou panificadoras são empresas que produzem e vendem pães e produtos de confeitaria. Avaliar as condições higiênico-sanitárias, do ponto de vista das BPFs de uma panificadora localizada no município de São Luís - MA. A coleta dos dados ocorreu de fevereiro a maio de 2012. Foi realizado um diagnóstico prévio no início da pesquisa e uma avaliação três meses após a intervenção de um nutricionista para identificar as falhas e intervir nas seguintes atividades: treinamento, realização de atividades específicas de cada manipulador, elaboração de informativos sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), e descarte daqueles que não se apresentaram em condições adequadas de uso, bem como a aquisição de materiais para higienização adequada do local. Durante as visitas, o check-list foi preenchido através de observações do local, e por informações prestadas pelo proprietário do estabelecimento. Os resultados obtidos a partir da 1ª avaliação pela aplicação do check-list apontaram que, do total de 125 itens analisados, 58,4% (73 itens) não apresentaram conformidade com a legislação vigente. Os itens considerados "críticos" (31 itens), houve uma evolução expressiva, já que na primeira análise feita em fevereiro, as conformidades críticas equivaliam a 35,5%, enquanto na segunda análise feita em maio, foi observado 80,6% de conformidades. Já os aspectos gerais das Condições Ambientais e de Veículos de Transporte e Entrega mantiveram as mesmas condições na primeira e segunda análise, 50% e 100% respectivamente. O estudo evidencia a necessidade de treinamento para os manipuladores de alimentos, pois muitas das não conformidades encontradas estavam relacionadas à falta de conhecimento dos mesmos.

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.

MENDES, Eliakim do Nascimento*; COSTA, Caroline Feitosa; SOBRINHO, Rosione da Silva

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: eliakim.nutri@hotmail.com

Analisar comparativamente prescrição e infusão de dieta enteral de pacientes em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um Hospital particular de São Luís. Foi realizado um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, no período de Junho a Agosto de 2014, com dados das fichas de acompanhamento nutricional de pacientes internados nesse intervalo. Os resultados foram trabalhados em planilha do programa Microsoft Excel 2007 e analisados comparativamente de acordo com: idade, peso, avaliação nutricional, valor energético total e alcance das necessidades energéticas. Foram incluídos neste estudo pacientes com idade superior a 60 anos e em uso de Terapia Nutricional Enteral (TNE) exclusiva. A amostra foi composta 50,00% do sexo feminino e 50,00% do sexo masculino com idade média de 77,2 anos. O gasto energético total dos pacientes teve média de 1492,7 kcal/d. Todos os pacientes receberam dieta polimérica por gastrostomia na forma cíclica. A média de infusão das dietas foi de 83,43% das necessidades calóricas diárias dos pacientes, apenas 6,25% da amostra recebeu quantidade inferior ou igual a 50,00% do prescrito, 37,50% recebeu mais de 90,00% do que foi prescrito de acordo com seu valor energético total. Em relação as necessidades proteicas a média foi de 95,56% de adequação do prescrito/infundido, apenas 12,50% recebeu quantidade inferior a 70,00% das necessidades proteicas diárias. Os resultados constataram a importância do alcance das necessidades energéticas totais do paciente desde a prescrição até sua infusão. Havendo equivalência entre o que é prescrito e o que é infundido pode-se reduzir o tempo de internação, evitar complicações, diminuir custos, além de proporcionar uma eficaz terapia nutricional ente.

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

PINTO, JULIANA GOMES *; COSTA DE JESUS, SULAMIZA FILOMENA; GONDIM, LOUISE ALINE ROMÃO; FERREIRA, PATRICIA RODRIGUES; DA SILVA, Gustavo de Jesus Pires

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: jullyslz@hotmail.com

Resumo: A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta contexto específico o qual expõe os profissionais à exigências físicas, cognitivas e afetivas importantes, as quais poderão contribuir para o adoecimento deste profissional. **Objetivo:** Avaliar os custos físicos, cognitivos e afetivos requeridos pelos fisioterapeutas com atuação em terapia intensiva. **Métodos:** Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 20 fisioterapeutas de 2UTIs Adulto, selecionadas por conveniência, pertencentes à hospitalar privada de São Luís. Foram incluídos fisioterapeutas regularmente inscritos no conselho regional com atuação em UTI adulto há no mínimo seis (6) meses e carga horária de trabalho predominante em terapia intensiva. Para coleta de dados utilizaram-se dois (2) questionários: o primeiro criado pelos autores da pesquisa e o segundo foi a Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). Realizou-se estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. **Resultados:** Notou-se predomínio do sexo feminino (75,00%), média de idade $28,55 \pm 3,45$ anos, tempo médio de atuação em UTI $3,59 \pm 2,66$ anos, profissionais com carga horária semanal de trabalho de 30 a 60h (60%) e hegemonia de fisioterapeutas com especialização completa (65,00%). Na amostra estudada, 5 (25,00%) fisioterapeutas relataram algum dano osteomuscular relacionado ao trabalho e 4 (20,00%) mencionaram disfunção respiratória ocupacional. Dentre os 32 itens da ECHT, 4(12,5%) apontam avaliação negativa, grave e 24 (75%) indicam avaliação moderada, crítica. Apenas 4 (12,5%) itens denotam avaliação positiva / satisfatória. Os 4 itens que revelam avaliação negativa estão inseridos no custo cognitivo (ser obrigado a lidar com imprevistos; ter que resolver problemas; ter concentração mental; usar a criatividade), já os 4 que apontam para avaliação positiva estão incluídos no custo afetivo. Todos os itens do custo físico indicam avaliação moderada, crítica. **Conclusão:** Constatou-se que o fisioterapeuta intensivista está exposto a um custo humano moderado a alto no trabalho, sobressaindo-se os custos físicos e cognitivos, o que favorece de forma moderada a grave o adoecimento deste profissional.

AValiação DAS BOAS PRATICAS ADOTADAS EM UM SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro*; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino, VASCONCELOS, Adriana Araújo; SANTOS, Natálio Lima; MAGALHÃES, Bruna Cruz; LOURENÇO, Kátia Danielle Araujo

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: celeniaaguiar@hotmail.com

Resumo: As padarias ou panificadoras são empresas que produzem e vendem pães e produtos de confeitaria. Avaliar as condições higiênico-sanitárias, do ponto de vista das BPFs de uma panificadora localizada no município de São

Luís - MA. A coleta dos dados ocorreu de fevereiro a maio de 2012. Foi realizado um diagnóstico prévio no início da pesquisa e uma avaliação três meses após a intervenção de um nutricionista para identificar as falhas e intervir nas seguintes atividades: treinamento, realização de atividades específicas de cada manipulador, elaboração de informativos sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), e descarte daqueles que não se apresentaram em condições adequadas de uso, bem como a aquisição de materiais para higienização adequada do local. Durante as visitas, o check-list foi preenchido através de observações do local, e por informações prestadas pelo proprietário do estabelecimento. Os resultados obtidos a partir da 1ª avaliação pela aplicação do check-list apontaram que, do total de 125 itens analisados, 58,4% (73 itens) não apresentaram conformidade com a legislação vigente. Os itens considerados "críticos" (31 itens), houve uma evolução expressiva, já que na primeira análise feita em fevereiro, as conformidades críticas equivaliam a 35,5%, enquanto na segunda análise feita em maio, foi observado 80,6% de conformidades. Já os aspectos gerais das Condições Ambientais e de Veículos de Transporte e Entrega mantiveram as mesmas condições na primeira e segunda análise, 50% e 100% respectivamente. O estudo evidencia a necessidade de treinamento para os manipuladores de alimentos, pois muitas das não conformidades encontradas estavam relacionadas à falta de conhecimento dos mesmos.

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.

MENDES, Eliakim do Nascimento*; COSTA, Caroline Feitosa; SOBRINHO, Rosione da Silva

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: eliakim.nutri@hotmail.com

Analisar comparativamente prescrição e infusão de dieta enteral de pacientes em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um Hospital particular de São Luís. Foi realizado um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, no período de Junho a Agosto de 2014, com dados das fichas de acompanhamento nutricional de pacientes internados nesse intervalo. Os resultados foram trabalhados em planilha do programa Microsoft Excel 2007 e analisados comparativamente de acordo com: idade, peso, avaliação nutricional, valor energético total e alcance das necessidades energéticas. Foram incluídos neste estudo pacientes com idade superior a 60 anos e em uso de Terapia Nutricional Enteral (TNE) exclusiva. A amostra foi composta 50,00% do sexo feminino e 50,00% do sexo masculino com idade média de 77,2 anos. O gasto energético total dos pacientes teve média de 1492,7 kcal/d. Todos os pacientes receberam dieta polimérica por gastrostomia na forma cíclica. A média de infusão das dietas foi de 83,43% das necessidades calóricas diárias dos pacientes, apenas 6,25% da amostra recebeu quantidade inferior ou igual a 50,00% do prescrito, 37,50% recebeu mais de 90,00% do que foi prescrito de acordo com seu valor energético total. Em relação as necessidades proteicas a média foi de 95,56% de adequação do prescrito/infundido, apenas 12,50% recebeu quantidade inferior a 70,00% das necessidades proteicas diárias. Os resultados constataram a importância do alcance das necessidades energéticas totais do paciente desde a prescrição até sua infusão. Havendo equivalência entre o que é prescrito e o que é infundido pode-se reduzir o tempo de internação, evitar complicações, diminuir custos, além de proporcionar uma eficaz terapia nutricional ente

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

PINTO, JULIANA GOMES*; COSTA DE JESUS, SULAMIZA FILOMENA; GONDIM, LOUISE ALINE ROMÃO; FERREIRA, PATRICIA RODRIGUES; DA SILVA, Gustavo de Jesus Pires

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: jullysz@hotmail.com

Resumo: A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta contexto específico o qual expõe os profissionais à exigências físicas, cognitivas e afetivas importantes, as quais poderão contribuir para o adoecimento deste profissional. Objetivo: Avaliar os custos físicos, cognitivos e afetivos requeridos pelos fisioterapeutas com atuação em terapia intensiva. Métodos: Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 20 fisioterapeutas de 2 UTIs Adulto, selecionadas por conveniência, pertencentes à hospitalar privada de São Luís. Foram incluídos fisioterapeutas regularmente inscritos no conselho regional com atuação em UTI adulto há no mínimo seis (6) meses e carga horária de trabalho predominante em terapia intensiva. Para coleta de dados utilizaram-se dois (2) questionários: o primeiro criado pelos autores da pesquisa e o segundo foi a Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). Realizou-se estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. Resultados: Notou-se predomínio do sexo feminino (75,00%), média de idade 28,55 ± 3,45 anos, tempo médio de atuação em

UTI 3,59 ± 2,66 anos, profissionais com carga horária semanal de trabalho de 30 a 60h (60%) e hegemonia de fisioterapeutas com especialização completa (65,00%). Na amostra estudada, 5 (25,00%) fisioterapeutas relataram algum dano osteomuscular relacionado ao trabalho e 4 (20,00%) mencionaram disfunção respiratória ocupacional. Dentre os 32 itens da ECHT, 4(12,5%) apontam avaliação negativa, grave e 24 (75%) indicam avaliação moderada, crítica. Apenas 4 (12,5%) itens denotam avaliação positiva / satisfatória. Os 4 itens que revelam avaliação negativa estão inseridos no custo cognitivo (ser obrigado a lidar com imprevistos; ter que resolver problemas; ter concentração mental; usar a criatividade), já os 4 que apontam para avaliação positiva estão incluídos no custo afetivo. Todos os itens do custo físico indicam avaliação moderada, crítica. Conclusão: Constatou-se que o fisioterapeuta intensivista está exposto a um custo humano moderado a alto no trabalho, sobressaindo-se os custos físicos e cognitivos, o que favorece de forma moderada a grave o adoecimento deste profissional.

MOVIMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS COM MINI-IMPLANTES

FREITAS, Grace Castelo Branco*; MADA, Edson Yoshihiro; PREVIDENTE, Luis Henrique; PINZAN, Célia; BREMANTE, Fausto; GURGEL, Júlio

Curso: Odontologia

Categoria: Pós Graduação / Profissional

E-mail: gracecastelobranco@gmail.com

Na Ortodontia, a ancoragem ortodôntica sempre foi um desafio para o ortodontista. No entanto, nos dias de hoje, a referida especialidade pode contar os mini-implantes, que sem dúvidas se tornou uma alternativa ímpar no tratamento de pacientes adultos com más posições dentárias, bem como os casos em que a ancoragem convencional é limitada. Nesse trabalho, mesa demonstrativa, será demonstrado o processo de ancoragem absoluta com mini-implantes, além dos movimentos ortodônticos de intrusão, mesialização, distalização, retração, disjunção que são realizados com o emprego dos referidos mini-implantes. Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de mostrar a importância da associação e planejamento dos mini-implantes como coadjuvantes nos tratamentos ortodônticos atuais.

PINOS INTRA-RADICULARES PRÉ-FABRICADOS

GONÇALVES *, Letícia Machado; COSTA, Luzia Mayane de Oliveira, SILVA Natã Felício de Sousa; CAMPOS, Iara Regina; BRAMANTE, Fausto Silva; ROCHA, Adricyla Teixeira, TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus,

Curso: Odontologia / Prótese

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: adricyla.tr@outlook.com

A reconstrução de dentes tratados endodonticamente freqüentemente requer a utilização de pinos e núcleos para o restabelecimento da estética e da função. A seleção de um apropriado sistema pino/núcleo é um dilema clínico, visto as amplas variedades disponíveis. O propósito deste artigo foi discutir os vários fatores que influenciam na seleção do pino e do núcleo, tais como comprimento da raiz, anatomia do dente, largura da raiz, configuração do canal, quantidade de estrutura dental coronária, força de torção, stress, desenvolvimento da pressão hidrostática, design e material do pino, compatibilidade do material, capacidade de adesão e retenção do núcleo, reversibilidade, estética e material da coroa. Assim, baseadas na literatura consultada, algumas recomendações clínicas foram propostas no intuito de orientar o clínico na seleção do sistema pino/núcleo mais adequado para cada caso: conservar o máximo de estrutura dental possível durante o preparo do conduto radicular; pinos pré-fabricados paralelo; adequado selamento apical deve ser mantido sem comprometer o comprimento do pino; mais de um pino deve ser usado para dente curto multirradicular; pinos paralelos passivos são preconizados pela adequada retenção, mas, quando a espessura de dentina apical é mínima, um pino com design paralelo-cônico deve ser indicado; a capacidade retentiva da cabeça do pino facilita a retenção do material para o núcleo; o pino deve assegurar compatibilidade do material, capacidade adesiva, adequada rigidez e compatibilidade estética com a restauração definitiva; reversibilidade, em casos de falha.

ASPECTOS LABORATORIAIS NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES.

REIS, Washington*; FERREIRA, Meire Coelho; GONÇALVES, Letícia Machado; ROCHA, Adrycyla Teixeira; BANDECA, Matheus Coelho; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

Email: washington.reis@ceuma.br

A prótese total sobre implantes representa um grande avanço da odontologia na reabilitação de pacientes desdentados totais. Este tipo de prótese permite ao cirurgião dentista reabilitar o paciente através de próteses fixadas aos implantes utilizando de parafusos protéticos ou mesmo utilizando próteses removíveis com encaixes sobre os implantes, permitindo retenção e estabilidade. As próteses totais que utilizam como suportes implantes osseointegrados aumentam a qualidade de vida e o grau de satisfação dos pacientes, já que aumentam a performance mastigatória. A confecção deste tipo de prótese exige do protésista e do cirurgião conhecimentos protéticos – cirúrgicos para sua execução. Assim a instalação dos implantes deve ser realizada dentro do conceito do planejamento reverso, onde inicialmente são realizadas moldagens e obtenção de modelos, montagem em articulador e enceramento diagnóstico, para a partir disto, obter um guia cirúrgico que oriente a instalação dos implantes. As fases pré-cirúrgicas e de construção das próteses necessitam que o profissional tenha conhecimentos sobre os diferentes componentes protéticos e que o técnico em prótese dentária domine os princípios de confecção das mesmas. Assim este trabalho tem por objetivo apresentar os componentes protéticos utilizados na confecção das próteses sobre implantes e as diferentes fases de confecção das mesmas.

A UTILIZAÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) NA ODONTOLOGIA

ROCHA, Adricyla Teixeira*; BANDECA, Matheus Coelho; BARRETO, Samuel Benson Lima; LAMHA, Ana Paula Soares Fernandes; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andreza Bastos

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

Email: adricyla.tr@outlook.com

A Desfibrilação é um procedimento usado para tratar as circunstâncias risco de vida que afetam o ritmo do coração tal como a arritmia cardíaca, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. O procedimento envolve a entrega de um choque elétrico ao coração que causa a despolarização dos músculos de coração e restabelece a condução normal do impulso elétrico do coração. A máquina usada para entregar este choque terapêutico ao coração é chamada um desfibrilador (DEA). Os tipos diferentes de desfibriladores usados incluem desfibriladores externos, desfibriladores transvenosos e desfibriladores implantados. A Desfibrilação foi apresentada primeiramente por Prevost e por Batelli, dois fisiologistas da Universidade de Genebra, Suíça em 1899. Nos estudos animais, observaram que os choques elétricos pequenos que chegavam ao coração poderiam provocar a fibrilação ventricular, e as grandes cargas elétricas poderia inverter a fibrilação. No ambiente odontológico de consultório não é muito comum a sua utilização, porém existem normativas que afirmam a sua importância em qualquer ambiente onde tenha atendimento, pois fatores como ansiedade, anestésicos, nervosismo podem alterar o funcionamento do órgão vital para o ser humano: o coração. A discussão sobre sua implantação ainda é muito omitida por diversos órgãos públicos e privados extra-hospitalar. Visando a sua importância não só no atendimento médico e odontológico, mas no cotidiano, tem-se a proposta da sua utilização, pois todo profissional Cirurgião-dentista deve estar apto para fazer esse atendimento em qualquer ambiente, seja no consultório, no ambiente hospitalar ou em qualquer atendimento de urgência.

DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPAROS PARA FACETAS DENTAIS

SANTOS, Reidson Stanley Soares dos*; TAVAREZ, Rudys de Jesus; BANDÉCA, Matheus Coelho

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: reidsonstanley@hotmail.com

Existem várias técnicas para confecção de preparos em dentes que irão receber restaurações em facetas diretas ou indiretas, tais técnicas tem a mesma finalidade, porém se diferenciam na forma como são confeccionadas. Este trabalho visa demonstrar as principais formas de tais preparos e sua indicação para cada caso, bem como suas abordagens e diferenças básicas, afim de que o profissional decida a melhor técnica para ser utilizada no seu dia-a-dia.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE DE UMA CLÍNICA DE SÃO LUÍS – MARANHÃO

AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro de*; MAGALHÃES, Bruna Cruz; NUNES, Gilbeth Silva; RIBEIRO, Larissa Cristinny Catarino; VASCONCELOS, Adriana Araujo; LOURENÇO, Kátia Danielle Araujo; CALADO, Isabela Leal

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: celeniaaguiar@hotmail.com

A doença renal crônica é atualmente um dos principais problemas de saúde pública do nosso país. Analisar a evolução do estado nutricional de pacientes em hemodiálise, avaliados há quatro anos, em um grande centro de diálise na cidade de São Luís/MA. Neste estudo prospectivo de delineamento longitudinal, de um total de 242 pacientes que participaram de um estudo realizado em 2006, foi avaliado o estado nutricional, utilizando-se parâmetros antropométricos e bioquímicos, de 84 pacientes, que permaneceram em programa regular de hemodiálise. Sessenta e oito por cento da população estuda eram homens e a média de idade de $45,8 \pm 15,0$ anos. Avaliando o estado nutricional, considerando o Índice de Massa Corporal, os resultados evidenciaram aumento da prevalência de desnutrição, apesar da manutenção da prevalência da eutrofia. Analisando entre sexos, o comportamento nutricional pelo IMC foi semelhante. A Prega Cutânea Tricipital revelou um aumento da desnutrição, embora com significância marginal ($p=0,056$), ratificando a prevalência desta. A Circunferência Muscular do Braço (CMB) demonstrou que não houve alteração. Os dados bioquímicos revelaram que, em relação à albumina sérica, houve aumento, nas mulheres ($p=0,003$) dos níveis séricos considerados desejáveis ($\geq 4,0\text{g/d}$). Observou-se diminuição dos níveis séricos de creatinina e aumento do colesterol e Kt/Veq. Os pacientes apresentaram com o passar de quatro anos, aumento da desnutrição, considerando os marcadores IMC e PCT, e não houve alteração da CMB. As Apenas as mulheres melhoraram os níveis séricos de albumina. Observou-se diminuição dos níveis séricos de creatinina e aumento dos níveis de colesterol.

CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: QUEM SÃO E O QUE FAZEM?

BRANDÃO, Patrícia Danielly de Aguiar *; NEDER, Mathilde

Curso: Psicologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: patriciaaguiarbrandao@gmail.com

Resumo: Trata-se de uma revisão de literatura sobre o cuidador de um familiar com câncer. Este estudo buscou conhecer quem é o cuidador familiar durante o cuidado ao paciente oncológico, tendo em vista que se trata de uma parte do cuidado no contexto do adoecimento pelo câncer e do impacto que o câncer de um ente querido tem sobre a vida do cuidador em diversos aspectos: emocional, familiar e social; foi realizado por levantamento de artigos, na literatura brasileira nos bancos de dados Lilacs, Scielo e Medline. Foram encontrados 46 textos sobre o tema, sendo a maioria dos textos publicados por profissionais da enfermagem. Observou-se que se trata de um tema relativamente recente na literatura estudada, principalmente quando abordam a questão do cuidador no cuidado ao familiar com câncer e que há necessidade dos profissionais de psicologia de se aproximarem e aprofundarem os estudos nessa temática. Os resultados apontam a importância dos profissionais da saúde em considerar o paciente e o cuidador familiar como unidade de cuidado, pois este cuidador constitui uma peça fundamental no percurso do adoecimento e está propício a sentimentos como medo e angústia, além da tensão e sobrecarga devido aos cuidados que direciona ao familiar doente. Tem-se com isso que o cuidador familiar é um ser que sofre com as limitações de seu ente tanto quanto o próprio doente, sendo uma figura ímpar, sensível, muitas vezes esquecido e ignorado, que necessita de atenção para se superar em suas atribuições como cuidador familiar.

FORUNS CIENTIFICOS

A SOLIDÃO ONTOLÓGICA NOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS MEDIADOS PELA INTERNET

COUTO, Graco Silva Macedo*; JÚNIOR, Almir Ferreira Da Silva

Curso: Psicologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: gracomacedo@msn.com

Resumo: O presente trabalho busca, por meio de uma análise fenomenológica e hermenêutica com base em Heidegger compreender a vivência da solidão nas relações afetivas mediadas pela internet dos entrevistados. Busca compreender quais as possibilidades de se relacionar com o outro que a internet possibilita, e também como ocorre por via do horizonte técnico de desvelamento dos entes alterações no modo de se relacionar e vivenciar a solidão. Para tal discorre sobre o fenômeno da solidão a partir da analítica existencial heideggeriana fundada em Ser e tempo. Nessa perspectiva a solidão é vista como parte da existência, não sendo necessariamente patológica. Se dá ou pela solidão perceptiva de um outro que é constitutivo do meu ser, ou pela via da tonalidade afetiva da angústia. Se analisa o horizonte técnico de desvelamento dos entes que possibilita o surgimento da internet. A internet é vista então como um espaço desterritorializado, onde privado e público se confundem e novos tempos e espaços são criados. Esses novos tempos e espaços são entendidos aqui como fundados nos existenciais da temporalidade e espacialidade do ser-aí (Dasein).

SENSIBILIZANDO A RELAÇÃO DE AJUDA ATRAVÉS DA ARTE EDUCATIVA COM AFETIVIDADE.

LEAL, Carlos Santos*; GIORA, Regina Célia Faria Amaro

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Psicologia

Email: c-leal1@hotmail.com

Rogers (2008), afirma que quando se estabelece uma relação de ajuda e se educa por meio da afetividade, mais facilmente o ser humano revela suas potencialidades criativas, sua sensibilidade, seu poder pessoal de atualização e de auto ajustamento frente à vida. Acredita-se que quando se consegue estabelecer a relação de ajuda promove-se intuitivamente a arte de educar, diz intuitivamente pois o encontro onde se materializa a relação de ajuda não é promovido por técnicas psicológicas, mas sim por autorização íntima, por abertura ao próximo, por querer mutuamente estar com o outro, conseqüentemente torna-se pessoa com o outro. Para Rogers (2008) não há encontro humano sem aprendizagem, sem transformação, sem levar do outro e deixar com este algo seu. Através da relação de ajuda a construção de pessoas mais congruentes, participativas, transformadoras, progressistas e mobilizadas com o bem comum se torna mais comum, pois o ato de tornar-se pessoa estimula indubitavelmente no ser humano à capacidade de ser para o outro e conseqüentemente, de comungar com os anseios do coletivo. Assim, referencia-se que se a afetividade for vivenciada nos espaços clínicos através da relação de ajuda, os facilitadores, sejam eles psicólogos, educadores, outros, através de sua arte de educar estarão contribuindo para a construção de seres humanos contínuos e fluidicos frente ao seu jeito de ser espontâneo, crítico, atualizado, proximal e social. Acredita-se ainda que através da relação de ajuda e da afetividade, o facilitador pode construir sua sensibilidade e conseqüentemente, ajudar a construir no outro humano o desenvolvimento das suas potencialidades.

USO DO CAPIM-LIMÃO NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE ASSOCIADA À PRÓTESE: EFEITO ANTIFÚNGICO E CITOTÓXICO

MADEIRA, Petrus Levid Barros*; TORRES, Leticia Carvalho; PASCHOAL, Marco Aurélio Beninni; SOUSA, Eduardo Martins de; DA SILVA, Marcos André dos Santos; GONÇALVES, Leticia Machado

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação

E-mail: petrusbmf@hotmail.com

O objetivo deste estudo foi verificar in vitro o efeito do extrato de capim-limão sobre biofilmes de *Candida albicans* desenvolvido em resina acrílica para prótese dental, bem como o efeito citotóxico em células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC). Foi investigada a susceptibilidade de *C. albicans* ATCC18804 ao extrato de capim-limão através dos testes de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima (CFM). Para avaliar os biofilmes, foram confec-

cionados discos de resina acrílica, e, sobre estes, biofilmes foram desenvolvidos por 72h. Os biofilmes foram expostos por 8h em água destilada (controle), extrato na CIM ou 5xCIM e, em seguida foi realizada a contagem das colônias. Para avaliar o efeito citotóxico, células PBMC foram expostas a DMEM, PBS (controles) ou concentrações distintas do extrato por 24h. A citotoxicidade foi avaliada pelo teste do MTT. Os dados foram analisados por ANOVA seguido de Tukey ($p < 0,05$). O valor de CIM foi de 625 $\mu\text{g/mL}$, enquanto o valor de CFM foi de 2500 $\mu\text{g/mL}$. Tanto o extrato na CIM quanto 5xCIM reduziram em até 80% as células do biofilme quando comparado ao controle ($p < 0,001$), não havendo diferença entre estas concentrações ($p > 0,05$). O extrato na CIM manteve a viabilidade celular semelhante ao controle PBS ($p > 0,05$), enquanto as demais concentrações foram citotóxicas ($p < 0,05$). Os resultados apontam que a exposição da resina acrílica ao extrato de capim-limão foi um método eficiente para a redução de biofilmes de *C. albicans*, e que a CIM apresentou-se como uma concentração segura em testes com células humanas.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO PÓS-TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA OU EM DUAS SESSÕES

Rizzi Maia C.C. *; Nelson Filho, P, Marques, T.V.F; Silva, L.A.B.

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: rizzimaia@hotmail.com

Resumo: O objetivo deste estudo clínico randomizado foi efetuar uma avaliação comparativa pós-tratamento endodôntico de dentes permanentes com lesão periapical crônica, realizado em sessão única ou em duas sessões com o uso de hidróxido de cálcio, por 14 dias, por meio de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). Metodologia: 26 dentes tratados na UniCeuma. As imagens de TCFCs obtidas: (1) antes e (2) após doze meses do tratamento. O volume das lesões foi obtido, em mm^3 , e calculada a porcentagem de redução volumétrica das lesões periapicais. A redução volumétrica dos dentes dos Grupos I e II foram comparadas por meio do teste t de Student para amostras pareadas. Foi avaliado se havia diferença significativa na frequência de casos com redução volumétrica maior que 50% (α likelihood ratio). α 5%. Resultados: Os volumes tomográficos médios iniciais e finais foram, respectivamente, GI - 73,47 mm^3 ; 27,73 mm^3 e GII - 65,94 mm^3 ; 12,84 mm^3 . A redução percentual média foi maior para o Grupo II (79,25%), em comparação ao Grupo I (68,35%), sem diferença significativa ($p > 0,05$). Observou-se redução superior a 50% em todos os dentes do Grupo II, e apenas 69,2% dos dentes do Grupo I atingiram esse percentual, ($p < 0,05$). Conclusão Não evidenciou reparação completa em nenhum dos casos demonstrando que esse período de acompanhamento não é suficiente para a regressão total da lesão. Foi evidenciado reparo mais avançado, no grupo onde foi utilizado curativo de demora fornecendo subsídios para sua indicação do ponto de vista clínico, em dentes portadores de lesão periapical crônica.

PAINEL PESQUISA – PÓS-GRADUAÇÃO/ PROFISSIONAL

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

PINTO, Juliana Gomes *; FERREIRA, Patricia Rodrigues; GONDIM, Louise Aline Romão; JESUS, Sulamiza Filomena Costa de; SILVA, Gustavo de Jesus Pires da

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: jullyslz@hotmail.com

A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta contexto específico o qual expõe os profissionais às exigências físicas, cognitivas e afetivas importantes, as quais poderão contribuir para o adoecimento deste profissional. Avaliar os custos físicos, cognitivos e afetivos requeridos pelos fisioterapeutas com atuação em terapia intensiva. Métodos: Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 20 fisioterapeutas de 2UTI's Adulto, selecionadas por conveniência, pertencentes à hospitalar privada de São Luís. Foram incluídos fisioterapeutas regularmente inscritos no conselho regional com atuação em UTI adulto há no mínimo seis (6) meses e carga horária de trabalho predominante em terapia intensiva. Para coleta de dados utilizaram-se dois (2) questionários: o primeiro criado pelos autores da pesquisa e o segundo foi a Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). Realizou-se estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. Resultados: Notou-se predomínio

do sexo feminino (75,00%), média de idade $28,55 \pm 3,45$ anos, tempo médio de atuação em UTI $3,59 \pm 2,66$ anos, profissionais com carga horária semanal de trabalho de 30 a 60h (60%) e hegemonia de fisioterapeutas com especialização completa (65,00%). Na amostra estudada, 5 (25,00%) fisioterapeutas relataram algum dano osteomuscular relacionado ao trabalho e 4 (20,00%) mencionaram disfunção respiratória ocupacional. Dentre os 32 itens da ECHT, 4(12,5%) apontam avaliação negativa, grave e 24 (75%) indicam avaliação moderada, crítica. Apenas 4 (12,5%) itens denotam avaliação positiva / satisfatória. Os 4 itens que revelam avaliação negativa estão inseridos no custo cognitivo (ser obrigado a lidar com imprevistos; ter que resolver problemas; ter concentração mental; usar a criatividade), já os 4 que apontam para avaliação positiva estão incluídos no custo afetivo. Todos os itens do custo físico indicam avaliação moderada, crítica. Constatou-se que o fisioterapeuta intensivista está exposto a um custo humano moderado a alto no trabalho, sobressaindo-se os custos físicos e cognitivos, o que favorece de forma moderada a grave o adoecimento deste profissional.

DETERMINANTES DA CÁRIE PRECOCE DA INFÂNCIA: ESTUDO RANSVERSAL ANINHADO À CORTE RETROSPECTIVA COM ABORDAGEM HIERARQUIZADA

SILVA, Mariana Carvalho da*; THOMAZ, Érika Barbara Fonseca de Abreu; RIBEIRO, Cecília Cláudia Costa

Curso: Odontologia

E-mail: mariana.cbattistadasilva@hotmail.com

Estudos que investigam os fatores de risco da cárie precoce da infância (CPI) guiados por um modelo teórico de forma hierarquizada são escassos. Investigar fatores associados à CPI por meio de abordagem hierarquizada. Metodologia: Estudo transversal aninhado a uma coorte retrospectiva de 625 crianças (24-71 meses) em São Luís (MA). Dados socioeconômicos e demográficos, hábitos de dieta e higiene bucal (HB) foram coletados por meio de questionários. Crianças foram submetidas ao exame clínico bucal. O desfecho foi o número de lesões de cárie. Análise multivariada, em regressão de Poisson, foi orientada por um modelo teórico hierarquizado em 5 níveis: 1: idade e sexo; 2: variáveis socioeconômicas; 3: dieta; 4: hábitos de HB e 5: qualidade de HB aferida. Aprovação no CEP/HU/UFMA (nº114/10). Resultados: Idade ≥ 36 meses (RP 2,25; IC 1,80-2,81), cor da pele não-branca (RP 1,28; IC1,07-1,53), escolaridade materna ≤ 8 anos de estudos (RP 1,40; IC 1,20-1,64), ter ido ao dentista (RP 0,49; IC0,42-0,58) tempo de aleitamento materno de 13-24 meses (RP 0,77; IC 0,64-0,93), e >24 meses (RP 1,48; IC 1,24-1,77), consumo de sacarose ≥ 5 vezes/dia (RP 1,26; IC 1,02-1,56), escovação tardia (RP 1,75; IC1,44-2,13), criança realizar HB sozinha (RP 1,39; IC0,91-1,75), não usar fio dental (RP 1,76; IC 1,32-2,34) e ter maior número de superfícies com sangramento gengival (RP 1,10; IC1,04-1,14) mostraram-se associados com CPI. Variáveis socioeconômicas mais distais parecem ser mediadas por hábitos de dieta, os quais parecem ter seu efeito moderado por práticas HB, na associação com a CPI.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO URUCUM (BIXA ORELLANA) CONTRA BACTÉRIAS PATOGÊNICAS.

ZAGMIGNAN, Adrielle*; RIBEIRO, Enzo Elder Costa; RODRIGUES, Aruanã Joaquim Matheus Costa;

ALVES, Matheus Silva; CARVALHO, Letícia Torres; DE SOUSA, Eduardo Martins; NETO, Lídio Gonçalves Lima

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Enfermagem

E-mail: adriellyzgmignan@hotmail.com

Produtos naturais são utilizados largamente como fonte medicamentosa, principalmente como antimicrobiana. A Bixa orellana (Urucum), tem sido usado em muitos países tropicais para tratamento de doenças infecciosas. Estudos publicados indicam seu efeito antioxidante, antifúngico, anestésico e antiinflamatório bem como ação antimicrobiana. Devido ao amplo uso do Urucum como antimicrobiano, é necessário investigar sua eficiência contra patógenos. O objetivo deste estudo foi investigar o potencial antimicrobiano do extrato hidroalcoólico do Urucum (Bixa Orellana) contra bactérias patogênicas. Para isso, folhas secas e sementes da planta foram coletadas do Herbário Ático Seabra da UFMA, secado e macerado com solução hidroalcoólica. A extrato hidroalcoólico de Bixa orellana (BoHa) foi concentrado em um rotoevaporador e estocado a -20°C até seu uso. Para avaliar a atividade antimicrobiana no *Mycobacterium massiliense* foi usado a técnica de diluição em Mueller Hilton caldo. A concentração de cada extrato foi de 200, 25 e $3,125 \mu\text{g/ml}$ e incubado a 37°C por 24 horas. Depois, foram realizadas diluições seriadas e plaqueadas em Ágar Mueller Hilton a 37°C por 72 horas para determinação das Unidades Formadoras de Colônia (UFC). A BoHa das folhas e sementes foram capazes de inibir *S. pyogenes*, (ATCC13613-zonas de inibição de 25,5 e 10mm); *S. agalactiae* (ATCC13813-zonas de inibição de 11,5 e 15,5 mm) enquanto que o extrato das folhas inibiu *S. aureus* (ATCC 25923-zona de inibição de 22mm) e *E. faecalis* (ATCC19433-zona de inibição de 12,5mm). Os extratos de Urucum estudados são capazes de inibir *M. massiliense*, *E. faecalis*, *S. aureus*, *S. agalactiae* e *S. pyogenes*.

TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA REVISÃO CRÍTICA

CAVALCANTE, Salma Ivanna Araújo*; GONÇALVES, Letícia Machado; CARVALHO, Ceci; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: salmaaraujo12@hotmail.com

A partir da necessidade de novas alternativas para o controle da população de microrganismos cariogênicos e ao seu aumento de resistência, a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDA) ganha grande destaque. O objetivo deste trabalho foi fornecer uma revisão crítica relacionada a este método coadjuvante na prevenção e tratamento da cárie dentária. Uma pesquisa do banco de dados foi feita através da Medline/PubMed, utilizando as palavras-chave: terapia fotodinâmica e cárie dentária. Foram encontrados 33 artigos, em que apenas 12 artigos foram incluídos após a utilização da ferramenta de filtro, sendo excluídos comentários e manuscritos não relacionados com a área de estudo. Esta avaliação crítica mostrou resultados promissores para o uso da TFDA como tratamento coadjuvante contra bactérias envolvidas no processo de etiologia e desenvolvimento da cárie dentária. Porém, mais estudos sobre a toxicidade e estudos in situ e in vivo devem ser realizados para o melhor entendimento desta prática e seus componentes, antes que seja estabelecido como uma opção antimicrobiana para a rotina odontológica preventiva e curativa.

OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL ATRAVÉS DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA

CORINGA, Ricardo de Sousa*; DE ARAÚJO, Juliana Fernanda Soares; MADEIRA, Petrus Levid Barros; CORREA, Silvan; GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: ricardocoringa@hotmail.com

As deformidades dento-faciais são responsáveis por problemas no sistema estomatognático, tais como disfunção temporomandibular, dor orofacial, má-oclusão dentária, dores musculares, cefaléia, síndrome da apnéia noturna e insatisfação da estética por parte do paciente. O objetivo deste trabalho será abordar a cirurgia ortognática como uma alternativa para a correção destas irregularidades, em especial, o apelo pela estética. A cirurgia ortognática visa a melhoria na função mastigatória, fala e respiração, bem como da estética através da harmonia entre os terços faciais. Esta modalidade de tratamento permite o equilíbrio ósseo e dentário do complexo facial, e dos tecidos moles envolvidos, o que exige do profissional conhecer a resposta dos tecidos subjacentes ao movimento ósseo. A correta análise facial em conjunto com os dados cefalométricos e os da oclusão, irão determinar um procedimento cirúrgico isolado ou combinado para a correção da deformidade, ao mesmo tempo em que traz máximo ganho estético ao paciente. As deformidades dento-faciais mais comumente corrigidas por cirurgia ortognática são: retrognatismo, prognatismo, excesso vertical de maxila e assimetria facial. Nestas deformidades, o reposicionamento dos ossos maxilares é um dos fatores responsáveis pelo “padrão facial”, podendo restabelecer a harmonia em consequência da modificação que estas estruturas sofrem após o processo de osteotomia. A cirurgia, enquanto tratamento de deformidades dento-faciais, pode trazer melhorias estéticas à aqueles que a procuram. Estas melhorias têm grande importância na vida pessoal e profissional de quem sofre com deformidades, e isto deve ser um dos pontos cruciais a considerar no momento do diagnóstico e planejamento cirúrgico.

EFEITO DA IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL ULTRASSÔNICA PASSIVA NO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS

FREITAS, Cláudio Vanucci Silva*; PROENÇA, Mariana Almeida Mello¹; CIRELLI, Joni Augusto²

*^{1,2} Universidade CEUMA

Categoria: Pós-graduação / Profissional;

Curso: Odontologia

E-mail: claudiovanucci@hotmail.com

O uso de antissépticos para irrigação subgingival tem sido proposto como coadjuvante à terapia básica no tratamento da doença periodontal (DP). Contudo, não há evidências suficientes para indicar seu uso de forma rotineira. A irrigação ultrassônica passiva vem sendo utilizada na Endodontia com resultados melhores na remoção de detritos e bactérias dos canais radiculares que a irrigação convencional com seringa. No entanto, não há relatos do seu uso na Periodontia. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da irrigação subgingival ultrassônica passiva (ISUP)

no tratamento da DP como coadjuvante à terapia mecânica, comparando diferentes soluções irrigantes. DP foi induzida por ligadura em 91 ratos Wistar, por 28 dias. Após a remoção das ligaduras, os animais foram submetidos à raspagem e alisamento radicular, seguida de irrigação subgengival convencional com seringa na hemi-mandíbula esquerda; e ISUP na hemi-mandíbula direita, com diferentes soluções (solução salina 0,9%, clorexidina 0,2%, hipoclorito de sódio 0,1 e 0,5%, extrato de própolis 11%). Os animais foram sacrificados aos 7 e 14 dias após o tratamento e submetidos a análise histométrica para avaliação de suporte ósseo e migração epitelial. Os grupos tratados com ISUP apresentaram média de suporte ósseo ($24,13\% \pm 2,83\%$) significativamente maior e média de migração epitelial significativamente menor ($23,36\% \pm 4,36\%$) que os grupos tratados com irrigação subgengival com seringa ($16,36\% \pm 2,21\%$ e $36,53\% \pm 4,48\%$, respectivamente). Não houve diferença significativa entre as médias das diferentes soluções irrigantes. A ISUP mostrou-se um importante coadjuvante no tratamento da doença periodontal induzida por ligadura em ratos.

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL

MARIZ, Débora Castelo Branco Rios*; BARROS, Mônica; CALIXTO, Amanda; MOUCHEREK, Adriana ; MARIZ ; Odilon Antônio; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-Graduação/Profissional

Email:arobedmariz@hotmail.com

Objetivo. Relacionar o periapical índice (PAI), obtidos por meio de radiografias periapicais, com o volume de lesão de periodontite apical crônica em dentes permanentes, obtidos pelo meio de Tomografia Computadorizada Feixe Cônico (TCFC). **Material e método.** Foram selecionadas radiografias e TCFC de 35 dentes permanentes unirradiculares, com ápice totalmente formado, com diagnóstico de necrose pulpar e portadores de periodontite apical crônica visível radiograficamente. Dois avaliadores independentes avaliaram as radiografias em duas ocasiões e classificaram as lesões periapicais de acordo com o PAI proposto por Ostavik et al. (1986). As imagens de TCFC foram exportadas no formato dicom para o software Amira e o volume de cada lesão foi calculado. Foi verificado se os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores não apresentavam diferenças estatisticamente significantes (teste Kruskal-wallis) e se havia correlação entre PAI e o volume das lesões (Correlação de Spearman). **Resultados.** Os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores apresentaram diferenças estatisticamente significantes ($p < 0,001$). Houve correlação entre PAI e o volume das lesões ($r_s = 0,596$; $p < 0,001$) com o valor de r^2 igual 0,355 mostrando que 35% da variação do PAI dependeram da variação do volume das lesões periapicais. **Conclusão.** O Volume da lesão nos dentes com periodontite apical teve um efeito moderado sobre a escolha do escore do PAI. O resultado da avaliação de periodontite apical através do Periapical Índice pode não refletir as características volumétrica da lesão.

A DOENÇA INFLAMATÓRIA PERIODONTAL E A INTERLEUCINA-8

MOUCHEREK, Adriana Quinzeiro e Silva*; BARROS, Mônica Santos; MARIZ, Débora Castelo Branco Rios; MARINHO, Nhajara Santos; NUNES, Livia Helena Araújo Castro; MOUCHEREK JÚNIOR, José Carlos Elias; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Odontologia

Categoria: Pós graduação

A doença periodontal ou periodontite é uma patologia complexa e multifatorial, resultante da interação dos mecanismos de defesa do hospedeiro com as espécies bacterianas da placa. Fatores genéticos que influenciam e modificam a resposta imunoinflamatória do hospedeiro ao desafio bacteriano são os principais determinantes da susceptibilidade à periodontite e podem explicar os níveis de progressão e severidade da doença em certos indivíduos. A degradação dos tecidos periodontais está estreitamente relacionada a uma gama de eventos biológicos que incluem a complexa rede de citocinas pró e anti-inflamatórias, fatores de crescimento e enzimas. Vários genes são responsáveis pela expressão de moléculas que participam e conduzem os mecanismos imunoinflamatórios do hospedeiro durante o curso da periodontite, sendo que um deles é o (IL8). Trata-se uma citocina que possui propriedades quimiotáticas principalmente para neutrófilos que são atraídos do sangue para o local da inflamação, sendo constitutivamente expressa por uma variedade de células, incluindo macrófagos, monócitos, fibroblastos e células epiteliais. Múltiplos estímulos podem levar a célula a produzir IL-8, incluindo bactérias, e citocinas inflamatórias como a interleucina-1 β (IL-1 β) e o fator de necrose tumoral (TNF- α), importantes fatores no desencadeamento e progressão da periodontite. Alta quantidade de proteína e RNAm para a IL-8 tem sido encontradas em tecido gengival e fluido gengival de indivíduos com periodontite crônica sugerindo que esta citocina possui um papel de destaque na regulação da resposta imunoinflamatória do hospedeiro, frente ao desafio bacteriano.

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE PERIAPICAL E VOLUME DA LESÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FEIXE CÔNICO EM DENTES COM PERIODONTITE APICAL

MARIZ, Débora Castelo Branco Rios*; BARROS, Mônica; CALIXTO, Amanda; MOUCHERREK, Adriana ; MARIZ ; Odilon Antônio; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-Graduação/Profissional

Email: arobedmariz@hotmail.com

Objetivo. Relacionar o periapical índice (PAI), obtidos por meio de radiografias periapicais, com o volume de lesão de periodontite apical crônica em dentes permanentes, obtidos pelo meio de Tomografia Computadorizada Feixe Cônico (TCFC). **Material e método.** Foram selecionadas radiografias e TCFC de 35 dentes permanentes unirradiculares, com ápice totalmente formado, com diagnóstico de necrose pulpar e portadores de periodontite apical crônica visível radiograficamente. Dois avaliadores independentes avaliaram as radiografias em duas ocasiões e classificaram as lesões periapicais de acordo com o PAI proposto por Ostavik et al. (1986). As imagens de TCFC foram exportadas no formato dicom para o software Amira e o volume de cada lesão foi calculado. Foi verificado se os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores não apresentavam diferenças estatisticamente significantes (teste Kruskal-wallis) e se havia correlação entre PAI e o volume das lesões (Correlação de Spearman). **Resultados.** Os volumes das lesões periapicais associados aos diferentes escores apresentaram diferenças estatisticamente significantes ($p < 0,001$). Houve correlação entre PAI e o volume das lesões ($r_s = 0,596$; $p < 0,001$) com o valor de r^2 igual 0,355 mostrando que 35% da variação do PAI dependeram da variação do volume das lesões periapicais. **Conclusão.** O Volume da lesão nos dentes com periodontite apical teve um efeito moderado sobre a escolha do escore do PAI. O resultado da avaliação de periodontite apical através do Periapical Índice pode não refletir as características volumétrica da lesão.

AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL E USO COMO MATERIAL RETROBTURADOR EM CIRURGIA PARAENDODÔNTICA

NUNES, Marjorie Adriane da Costa*; SOUSA, Nielsen Barros; VELOSO, Kátia Maria Martins; PRADO, Isabelle Aguiar; PEREIRA, Adriana de Fátima Vasconcelos.

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Odontologia

marjorieacn@hotmail.com

O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) foi desenvolvido com a finalidade de selar perfurações dentárias que ocorrem acidentalmente. A obturação retrógrada, uma das modalidades da cirurgia paraendodôntica, consiste no tratamento de lesões perirraiculares que visa solucionar complicações decorrentes do tratamento endodôntico mal sucedido. Materiais como o MTA têm sido propostos com o objetivo de promover o selamento do canal radicular por via retrógrada. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre o uso de MTA na Endodontia, abordando aspectos de sua apresentação, composição, propriedades físicas, químicas e biológicas, aplicações clínicas, enfatizando sua utilização na prática cirúrgica-periapical. Concluiu-se que o MTA pode ser empregado no retratamento endodôntico cirúrgico, apresentando-se como material promissor.

POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PRAZERES, Jozimar*; REIS, Vitoe Henrique Martins; SANTOS, Laura Quintanilha Mourão ; GUIMARÃES, Vanessa Silva

Categoria: Pós-Graduação/Profissional

Curso: Educação Física

E-mail: jozimarprazeres@hotmail.com

Estudo visou indicar elementos do conceito de políticas públicas, sua modalidades, sua origem como área de conhecimento, associando-as ao estágio, considerando a importância do professor como papel fundamental dentro desse contexto. A pesquisa foi de característica bibliográfica explicativa, foi utilizada uma revisão de literatura, realizada nos meses de julho e agosto de 2014, nas bases de dados eletrônica do Scielo, LILACS, Google acadêmico, bem como utilização de teses e dissertações de bancos de dados de universidades brasileiras. Destacando ainda a relação das políticas públicas e sociedade sua implantação na educação e educação física com as ações e intervenções, programas de educação, suas diferentes dimensões, promoção da unidade teoria e prática, vínculo entre o saber e o fazer e vários aspectos que envolvem o estágio. Conclui-se que, o professor é de suma importância na área do estágio supervisionado, sendo necessário saber desenvolver habilidades que condizem com a prática, ter conhecimento científico, prático e técnico, pois introduz o futuro profissional de educação física no âmbito escolar, com intuito de integra-lo na práxis pedagógica favorecendo seu desenvolvimento profissional.

PINOS INTRA-RADICULARES PRÉ-FABRICADOS

COSTA, Luzia Mayane de Oliveira*; GONÇALVES, Letícia Machado; SILVA Natã Felício de Sousa; CAMPOS, Iara Regina; BRAMANTE, Fausto Silva; ROCHA, Adrícylla Teixeira, TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus

Curso: Odontologia / Prótese

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: adricyla.tr@outlook.com

A reconstrução de dentes tratados endodonticamente freqüentemente requer a utilização de pinos e núcleos para o restabelecimento da estética e da função. A seleção de um apropriado sistema pino/núcleo é um dilema clínico, visto as amplas variedades disponíveis. O propósito deste artigo foi discutir os vários fatores que influenciam na seleção do pino e do núcleo, tais como comprimento da raiz, anatomia do dente, largura da raiz, configuração do canal, quantidade de estrutura dental coronária, força de torção, stress, desenvolvimento da pressão hidrostática, design e material do pino, compatibilidade do material, capacidade de adesão e retenção do núcleo, reversibilidade, estética e material da coroa. Assim, baseadas na literatura consultada, algumas recomendações clínicas foram propostas no intuito de orientar o clínico na seleção do sistema pino/núcleo mais adequado para cada caso: conservar o máximo de estrutura dental possível durante o preparo do conduto radicular; pinos pré-fabricados paralelo; adequado selamento apical deve ser mantido sem comprometer o comprimento do pino; mais de um pino deve ser usado para dente curto multirradicular; pinos paralelos passivos são preconizados pela adequada retenção, mas, quando a espessura de dentina apical é mínima, um pino com design paralelo-cônico deve ser indicado; a capacidade retentiva da cabeça do pino facilita a retenção do material para o núcleo; o pino deve assegurar compatibilidade do material, capacidade adesiva, adequada rigidez e compatibilidade estética com a restauração definitiva; reversibilidade, em casos de falha.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ABSCESSO PERIAPICAL SEM FÍSTULA, COM MATERIAL OBTURADOR EXTRAVASADO PARA O LIGAMENTO PERIODONTAL

GRITTI, Giovana Cunha*; CARVALHO, Ceci Nunes; MOUCHREK, Adriana Quinzeiro; NETO, Lussif Mamede

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: giogritti@hotmail.com

O tratamento mais frequentemente indicado para os casos de abscesso periapical sem fístula é a penetração desinfetante com utilização de hidróxido de cálcio como medicação intra-canal, porém, nas situações onde ocorre extravasamento de material obturador para o ligamento periodontal, o tratamento endodôntico convencional torna-se inviável, pela dificuldade ou impossibilidade de remover tal material. Desta forma, a cirurgia parendodôntica é a terapêutica mais indicada. Paciente F. G. C., sexo masculino, 42 anos, procurou atendimento apresentando sinais clínicos e radiográficos sugestivos de abscesso periapical sem fístula: dor espontânea, de média intensidade, localizada, pulsátil e contínua, edema intra-bucal e rarefação óssea periapical associada a material obturador extravasado nas raízes méso-vestibular e disto-vestibular do dente 26. Foi indicada a cirurgia parendodôntica, modalidade obturação retrógrada nestas raízes, e preenchimento da loja cirúrgica com biomaterial e membrana de colágeno como opção terapêutica. É realizado acompanhamento deste paciente há quatro anos, e do ponto de vista clínico e radiográfico pode-se afirmar que houve reparo, ou seja, sucesso endodôntico. Desta forma, parece lícito concluir que a cirurgia parendodôntica, modalidade obturação retrógrada, é a opção terapêutica mais indicada para as situações de abscesso periapical sem fístula, com material obturador extravasado para o ligamento periodontal.

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

PINTO, JULIANA GOMES*; DA SILVA, Gustavo De Jesus Pires; DE JESUS, Sulamiza Filomena Costa; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; FERREIRA, Pedro Antonio Muniz; GONDIN, Louise Aline Romão;

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: jullyslz@hotmail.com

Modalidade: Paineis

A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta contexto específico o qual expõe os profissionais à exigência física, cognitiva e afetiva importantes, as quais poderão contribuir para o adoecimento deste profissional. **Objetivo:** Avaliar os custos físicos, cognitivos e afetivos requeridos pelos fisioterapeutas com atuação em terapia intensiva. **Métodos:** Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 20 fisioterapeutas de 2 UTI's Adulto, selecionadas por conveniência, pertencentes à hospitalar privada de São Luís. Foram incluídos fisioterapeutas regularmente inscritos no conselho regional com atuação em UTI adulto há no mínimo seis (6) meses e carga horária de trabalho predominante em terapia intensiva. Para coleta de dados utilizaram-se dois (2) questionários: o primeiro criado pelos autores da pesquisa e o segundo foi a Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). Realizou-se estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. **Resultados:** Notou-se predomínio do sexo feminino (75,00%), média de idade $28,55 \pm 3,45$ anos, tempo médio de atuação em UTI $3,59 \pm 2,66$ anos, profissionais com carga horária semanal de trabalho de 30 a 60h (60%) e hegemonia de fisioterapeutas com especialização completa (65,00%). Na amostra estudada, 5 (25,00%) fisioterapeutas relataram algum dano osteomuscular relacionado ao trabalho e 4 (20,00%) mencionaram disfunção respiratória ocupacional. Dentre os 32 itens da ECHT, 4 (12,5%) apontam avaliação negativa, grave e 24 (75%) indicam avaliação moderada, crítica. Apenas nas 4 (12,5%) itens denotam avaliação positiva / satisfatória. Os 4 itens que revelam avaliação negativa estão inseridos no custo cognitivo (ser obrigado a lidar com imprevistos; ter que resolver problemas; ter concentração mental; usar a criatividade), já os 4 que apontam para avaliação positiva estão incluídos no custo afetivo. Todos os itens do custo físico indicam avaliação moderada, crítica. **Conclusão:** Constatou-se que o fisioterapeuta intensivista está exposto a um custo humano moderado a alto no trabalho, sobressaindo-se os custos físicos e cognitivos, o que favorece de forma moderada a grave o adoecimento deste profissional.

DETERMINANTES DA CÁRIE PRECOCE DA INFÂNCIA: ESTUDO TRANSVERSAL ANINHADO À CORTE RETROSPECTIVA COM ABORDAGEM HIERARQUIZADA

DA SILVA, Mariana Carvalho*; THOMAZ, Érika Barbara Fonseca de Abreu;
RIBEIRO, Cecília Cláudia Costa (falta co-orientador)

Curso: Odontologia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: mariana.cbatistadasilva@hotmail.com

Modalidade: Painel

Estudos que investigam os fatores de risco da cárie precoce da infância (CPI) guiados por um modelo teórico de forma hierarquizada são escassos. **Objetivo:** Investigar fatores associados à CPI por meio de abordagem hierarquizada. **Metodologia:** Estudo transversal aninhado a uma coorte retrospectiva de 625 crianças (24-71 meses) em São Luís (MA). Dados socioeconômicos e demográficos, hábitos de dieta e higiene bucal (HB) foram coletados por meio de questionários. Crianças foram submetidas ao exame clínico bucal. O desfecho foi o número de lesões de cárie. Análise multivariada, em regressão de Poisson, foi orientada por um modelo teórico hierarquizado em 5 níveis: 1: idade e sexo; 2: variáveis socioeconômicas; 3: dieta; 4: hábitos de HB e 5: qualidade de HB aferida. Aprovação no CEP/HU/UFMA (nº114/10). **Resultados:** Idade ≥ 36 meses (RP 2,25; IC 1,80-2,81), cor da pele não-branca (RP 1,28; IC 1,07-1,53), escolaridade materna ≤ 8 anos de estudos (RP 1,40; IC 1,20-1,64), ter ido ao dentista (RP 0,49; IC 0,42-0,58) tempo de aleitamento materno de 13-24 meses (RP 0,77; IC 0,64-0,93), e >24 meses (RP 1,48; IC 1,24-1,77), consumo de sacarose ≥ 5 vezes/dia (RP 1,26; IC 1,02-1,56), escovação tardia (RP 1,75; IC 1,44-2,13), criança realizar HB sozinha (RP 1,39; IC 1,11-1,75), não usar fio dental (RP 1,76; IC 1,32-2,34) e ter maior número de superfícies com sangramento gengival (RP 1,10; IC 1,04-1,14) mostraram-se associados com CPI. **Conclusões:** Variáveis socioeconômicas mais distais parecem ser mediadas por hábitos de dieta, os quais parecem ter seu efeito moderado.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO URUCUM (BIXA ORELLANA) CONTRA BACTÉRIAS PATOGENICAS.

ZAGMIGNAN, Adrielle*; RIBEIRO, Enzo Elder Costa; RODRIGUES, Aruanã Joaquim Matheus Costa;
ALVES, Matheus Silva; CARVALHO, Leticia Torres; DE SOUSA, Eduardo Martins; NETO, Lídio Gonçalves Lima

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Curso: Enfermagem

Email: adriellyzgmignan@hotmail.com

Produtos naturais são utilizados largamente como fonte medicamentosa, principalmente como antimicrobiana. A Bixaorellana (Urucum), tem sido usado em muitos países tropicais para tratamento de doenças infecciosas. Estudos publicados indicam seu efeito antioxidante, antifúngico, anestésico e anti-inflamatório bem como ação antimicrobiana. Devido ao amplo

uso do Urucum como antimicrobiano, é necessário investigar sua eficiência contra patógenos. O objetivo deste estudo foi investigar o potencial antimicrobiano do extrato hidroalcoólico do Urucum (*BixaOrellana*) contra bactérias patogênicas. Para isso, folhas secas e sementes da planta foram coletadas do Herbário Ático Seabra da UFMA, secado e macerado com solução hidroalcoólica. A extrato hidroalcoólico de *Bixaorellana* (BoHa) foi concentrado em um rotoevaporador e estocado a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ até seu uso. Para avaliar a atividade antimicrobiana no *Mycobacterium massiliense* foi usado a técnica de diluição em Mueller Hilton caldo. A concentração de cada extrato foi de 200, 25 e 3,125 $\mu\text{g/mL}$ e incubado a 37°C por 24 horas. Depois, foram realizadas diluições seriadas e plaqueadas em Ágar Mueller Hilton a 37°C por 72 horas para determinação das Unidades Formadoras de Colônia (UFC). A BoHa das folhas e sementes foram capazes de inibir *S. pyogenes*, (ATCC13613-zonas de inibição de 25,5 e 10mm); *S. agalactiae* (ATCC13813-zonas de inibição de 11,5 e 15,5 mm) enquanto que o extrato das folhas inibiu *S. aureus* (ATCC 25923-zona de inibição de 22mm) e *E. faecalis* (ATCC19433-zona de inibição de 12,5mm). Os extratos de Urucum estudados são capazes de inibir *M. massiliense*, *E. faecalis*, *S. aureus*, *S. agalactiae* e *S. pyogenes*.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO E CONSUMO ALIMENTAR DE JOGADORES DE BASQUETE DE UM TIME DE SÃO LUÍS, MARANHÃO

MAGALHÃES, Bruna Cruz*; DE AGUIAR, Celenia Raquel Monteiro; MARTINS, Taylanna Muniz; PADILHA, Luana Lopes; CARVALHO, Wyllyane Rayana Chaves; GAMBASSI, Bruno Bavaresco

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: brunacmagalhaes@bol.com.br

Avaliar o estado nutricional de jogadores de basquete de um time de São Luís, MA. O basquete é uma modalidade esportiva caracterizada pelo predomínio do sistema energético anaeróbio, sendo dividido em 88% de atividades aeróbias e 12% de atividade aeróbia de alta intensidade (NETO; CESAR, 2005). Testes antropométricos, fisiológicos e de habilidades específicas são implantados aos jogadores de basquete (GRECO; DENADAI, 2006). A nutrição e o treinamento são alguns aspectos fundamentais para que o jogador de basquetebol tenha bom desempenho (NETO; CESAR, 2005). **MATERIA! L E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo. A amostra foi composta por 12 atletas, todos do sexo masculino. Aplicou-se um questionário estruturado sobre condições socioeconômicas, dados antropométricos e Recordatório 24 horas. **RESULTADOS:** Os resultados revelaram que houve uma predominância de idade de 20 a 25 anos (83%), cujo os todos os jogadores tinham ensino médio completo (100%), e a maioria tinha cor negra (58,4%), quanto o resultado das medidas antropométricas 41,66% eram eutróficos e 75% eram normais, segundo o % de gordura. A alimentação se apresenta inadequada na qualidade dos alimentos ingeridos. Conclui-se que a ingestão de macronutrientes apresentou muito próxima ao recomendado para todo o grupo. No entanto, a alimentação destes atletas requer adequação das porções de frutas e vegetais. Há necessidade de uma maior intervenção nutricional nas equipes esportivas, a fim de atender as necessidades e demandas energéticas impostas, bem como garantir a boa alimentação.

PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE DE SÃO LUÍS-MA

ALMEIDA, Mônica Danielle De Sousa*; MORAES, Valkíria Kerlly Almeida; DE ARAÚJO, Maria Erivânia Alves

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: monica_danielle_1@hotmail.com

Estimar a prevalência de escoliose e fatores associados em acadêmicos de odontologia de uma Universidade. **Materiais e métodos:** Participaram da pesquisa descritiva observacional transversal 63 acadêmicos com 22 ± 2 anos de idade, que atuavam na clínica escola de odontologia, cursando entre os 4º e 8º períodos e em regime especial do curso de odontologia de uma Universidade em São Luís - MA. Os universitários foram avaliados por 6 dias consecutivos. Foi realizada uma avaliação postural para verificar a presença de escoliose e aqueles que foram detectados com tal deformidade, foram submetidos ao teste de Adams para identificar a presença ou não de gibosidade. Utilizou-se um questionário para identificação da dor mediante a Escala de dor percebida CR 10 de Borg e um goniômetro para verificar o grau de flexibilidade da cadeia muscular posterior. O tratamento estatístico utilizado foi o programa SPSS f 18.0. A análise descritiva das variáveis quantitativas assimétricas foi realizada através da mediana com valores mínimos e máximos. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e porcentagens. Para análise dos fatores associados com a escoliose foi utilizado o Mann-Whitney. Foi identificada prevalência significativa de escoliose. Pode-se verificar a identificação de escoliose, estrutural e não-estrutural, e dores associadas a escoliose não- estrutural.

RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS ALIMENTARES E O ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE

E Silva, Anne Caroline Silva*; PEREIRA, Janaina Mendonça; DE OLIVEIRA, Abrahão Limeira

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: anne_caroliness@hotmail.com

Trata-se de uma pesquisa sobre gestantes, destacando a relação entre as práticas alimentares e o estado nutricional das mesmas. O objetivo do estudo foi verificar as práticas alimentares e o estado nutricional de gestantes atendidas em uma Maternidade Pública, em São Luis/MA. A gestação é um período crítico, no qual o estado físico e mental materno influencia diretamente tanto a saúde da mãe, quanto do feto. A assistência é excelente para a saúde, com orientação em geral e dietética (GAMA, 2001). Na gravidez, a alimentação é importante, sendo previstas alterações na dieta, em função das necessidades aumentadas, vulnerabilidade biológica da mãe, extrema dependência do organismo fetal para seu crescimento e desenvolvimento adequado. Além dos cuidados médicos, um acompanhamento nutricional mostra-se essencial, pois o estado nutricional está relacionado à saúde do feto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). A pesquisa enquadra-se em bibliográfica e de campo, quanto aos fins em descritiva e explicativa. A coleta de dados deu-se no período de abril de 2010, foram entrevistadas 50 gestantes na fila de espera das consultas, individualmente, tendo as mesmas ao decorrer das perguntas de dois questionários, esclarecimentos de dúvidas sobre alimentação na gestação. Os resultados obtidos mostraram que a ingestão de alimentos mais energéticos como: pães e macarrão tiveram significância e o consumo de frutas, legumes, verduras, leite desnatado, cereais e peixe, não tiveram significância estatística em relação ao estado nutricional das gestantes. Com isto concluímos que a investigação das práticas alimentares por parte do nutricionista é relevante para prevenir carências ou excesso nutricional.

PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

MENDES, Eliakim do Nascimento*; COSTA, Caroline Feitosa; SOBRINHO, Rosione da Silva

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: eliakim.nutri@hotmail.com

Identificar o perfil nutricional de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um Hospital Particular de São Luís. Foi realizado um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, no período de Junho a Agosto de 2014, com dados das fichas de acompanhamento nutricional de pacientes internados nesse intervalo. Os resultados foram trabalhados em planilha do Microsoft Excel 2007 e analisados comparativamente de acordo com: idade, peso, avaliação nutricional, terapia nutricional enteral, valor energético total e alcance das necessidades energéticas. Foram incluídos nesse estudo pacientes com idade superior a 60 anos e em uso de nutrição enteral exclusiva. Dos pacientes analisados, 50,00% do sexo feminino e 50,00% do sexo masculino com variação de idades entre 61 e 96 anos. Em relação a posição da sonda 100,00% da amostra tinha ostomia em posição gástrica (gastrostomia). Quanto ao tipo de dieta infundida 100,00% receberam dieta polimérica administrada de forma cíclica em vinte horas. O valor energético total (VET) variou de 900 a 1760 kcal com média de 1492,7 kcal/dia para cada paciente. Considerando o Índice de massa corpórea (IMC), 56,25% dos pacientes eram eutrofos, 6,25% sobrepesos e 37,50% desnutridos. É importante avaliar todos os fatores de risco que possam levar ao agravamento do quadro clínico do paciente em UTI em uso de terapia nutricional exclusiva, possibilitando desta forma que a equipe multiprofissional intervenha precocemente. Para que as ações de nutrição obtenham resultados pertinentes é imprescindível que sejam embasadas em pesquisas científicas e nas melhores evidências possíveis e que o nutricionista conheça, avalie e utilize os conhecimentos adquiridos.

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTENSIVA: DA PRESCRIÇÃO A INFUSÃO.

MENDES, Eliakim do Nascimento*; COSTA, Caroline Feitosa; SOBRINHO, Rosione da Silva

Curso: Nutrição

Categoria: Pós-graduação / Profissional

Email: eliakim.nutri@hotmail.com

Analisar comparativamente prescrição e infusão de dieta enteral de pacientes em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um Hospital particular de São Luís. Foi realizado um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, no período de Junho a Agosto de 2014, com dados das fichas de acompanhamento nutricional de pa-

cientes internados nesse intervalo. Os resultados foram trabalhados em planilha do programa Microsoft Excel 2007 e analisados comparativamente de acordo com: idade, peso, avaliação nutricional, valor energético total e alcance das necessidades energéticas. Foram incluídos neste estudo pacientes com idade superior a 60 anos e em uso de Terapia Nutricional Enteral (TNE) exclusiva. A amostra foi composta 50,00% do sexo feminino e 50,00% do sexo masculino com idade média de 77,2 anos. O gasto energético total dos pacientes teve média de 1492,7 kcal/d. Todos os pacientes receberam dieta polimérica por gastrostomia na forma cíclica. A média de infusão das dietas foi de 83,43% das necessidades calóricas diárias dos pacientes, apenas 6,25% da amostra recebeu quantidade inferior ou igual a 50,00% do prescrito, 37,50% recebeu mais de 90,00% do que foi prescrito de acordo com seu valor energético total. Em relação as necessidades proteicas a média foi de 95,56% de adequação do prescrito/infundido, apenas 12,50% recebeu quantidade inferior a 70,00% das necessidades proteicas diárias. Os resultados constataram a importância do alcance das necessidades energéticas totais do paciente desde a prescrição até sua infusão. Havendo equivalência entre o que é prescrito e o que é infundido pode-se reduzir o tempo de internação, evitar complicações, diminuir custos, além de proporcionar uma eficaz terapia nutricional enteral.

CUSTO HUMANO DO TRABALHO DE FISIOTERAPEUTAS DE DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

PINTO, JULIANA GOMES*; DA SILVA, Gustavo De Jesus Pires; DE JESUS, Sulamiza Filomena Costa; FERREIRA, Patricia Rodrigues; FERREIRA, Pedro Antonio Muniz; GONDIN, Louise Aline Romão;

Curso: Fisioterapia

Categoria: Pós-graduação / Profissional

E-mail: jullysz@hotmail.com

A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta contexto específico o qual expõe os profissionais à exigência física, cognitiva e afetiva importantes, as quais poderão contribuir para o adoecimento deste profissional. Avaliar os custos físicos, cognitivos e afetivos requeridos pelos fisioterapeutas com atuação em terapia intensiva. Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 20 fisioterapeutas de UTI's Adulto, selecionadas por conveniência, pertencentes à hospitalar privada de São Luís. Foram incluídos fisioterapeutas regularmente inscritos no conselho regional com atuação em UTI adulto há no mínimo seis (6) meses e carga horária de trabalho predominante em terapia intensiva. Para coleta de dados utilizaram-se dois (2) questionários: o primeiro criado pelos autores da pesquisa e o segundo foi a Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT). Realizou-se estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HUUFMA. Resultados: Notou-se predomínio do sexo feminino (75,00%), média de idade $28,55 \pm 3,45$ anos, tempo médio de atuação em UTI $3,59 \pm 2,66$ anos, profissionais com carga horária semanal de trabalho de 30 a 60h (60%) e hegemonia de fisioterapeutas com especialização completa (65,00%). Na amostra estudada, 5 (25,00%) fisioterapeutas relataram algum dano osteomuscular relacionado ao trabalho e 4 (20,00%) mencionaram disfunção respiratória ocupacional. Dentre os 32 itens da ECHT, 4(12,5%) apontam avaliação negativa, grave e 24 (75%) indicam avaliação moderada, crítica. Apenas 4 (12,5%) itens denotam avaliação positiva / satisfatória. Os 4 itens que revelam avaliação negativa estão inseridos no custo cognitivo (ser obrigado a lidar com imprevistos; ter que resolver problemas; ter concentração mental; usar a criatividade), já os 4 que apontam para avaliação positiva estão incluídos no custo afetivo. Todos os itens do custo físico indicam avaliação moderada, crítica. Constatou-se que o fisioterapeuta intensivista está exposto a um custo humano moderado a alto no trabalho, sobressaindo-se os custos físicos e cognitivos, o que favorece de forma moderada a grave o adoecimento deste profissional.